



廣
總

八一
六九

八

夷果類

九

味果類

十

蔬果類

十一

水果類

地

倭譜三才圖會



李唐

總

八一

六九

AE
4
.T4
1824
V. 88-91

和漢三才圖會卷第八十八之九十一目錄

卷之八十八

夷果類



五雜俎云歷考史傳所載果木如都念猪肉子猩猩果人面樹者今皆不可得見而今之果木又多出於紀載之外者豈古今風氣不同或昔有而今無或未顯於昔而著於今也至佛手柑羅漢果之類不見紀載而山谷中可充口實而人不及知者益多矣

荔枝
木威子

龍眼肉
菴摩勒

橄欖
五斂子

榧たけのこ

大腹子おほはら

無漏子むろうし

波羅蜜ばらみ

天仙果てんせんくわ
いぬびし

都念子とねんし

人面子にんめんし

海松子かいしょうし

大腹皮おほはらひ

枕椰子たけやさん

無花果むけくわく

古度子こどし

馬檳榔うまびんろう

霸王樹さうおうじゆ

檳榔子びんろうし

椰子やし

蔴木麩こもぎ

文光果ぶんくわく

阿勃勒あはく

枳椇けいこ

番蕉ばんしやう

卷之八十九

味果類

秦椒

椒樹皮

冬山椒

崖椒

番椒

鹽麩子

蠟茶

蜀椒

柚山椒

胡椒

吳茱萸

醋林子

孩兒茶

朝倉椒

蔓椒

畢澄茄

山胡椒

食茱萸

茗

茶湯

和漢三才圖會 卷之九十 菓部 水菓

阜蘆

卷之九十

菓部類

甜瓜

附 韓食 阿吉鹿瓜

葡萄

甘蔗

饴霜

石蜜

瓜蒂

菓葉

紫饴

草蜜

西瓜

楊溪瓜

獼猴桃

冰饴

卷之九十一

水果類

蓮 イリス

荷葉 ハス

芡 ミズナギ

蓮肉 ハス

蓮花 ハス

烏芋 クマザ

蓮蓬 ハス

藕 イモ

芡 ミズナギ

慈姑 ミズナギ

蓴 イモ

芋 イモ

卷之九十一

木果類

桃

李

杏

梨

橘

柚

棗

荔枝

龙眼

枇杷

水果類

卷之九十一

和漢三才圖會卷第八十八

攝陽 城醫法橋寺島良安 尚腹編

夷果類



荔枝

唐音

リイツウ

離枝 丹荔

本綱荔枝南方多有之以閩中為第一蜀中次之嶺南為
下其木高二三丈白徑尺至千合抱木形團團如帷蓋葉
如冬青四時不凋性最畏寒甚耐久有經數百年猶結實
者花青白如橘花其實喜雙初青漸紅狀如初生松球殼
有皺紋如羅其肉生時白乾時紅漿液甘酸如醴酪其核

黃黑色似半熟蓮子精者核如雞舌香瓢肉潔白如冰雪
 凡實熟時人未采則百蟲不敢近人纔采之烏鳥蝙蝠之
 類無不傷殘之也故采荔枝者必日中而衆采之若離本
 枝一日而色變二日而香變三日而味變四五日而外色
 香味盡去矣五六月盛熟時人燕會其下以賞之取味最
 忌麝香觸之花實盡落也此樹炎方之果故不產於寒國
 也凡此木結實時枝弱而蒂牢不可摘取必以刀斧剗取
 其枝也木性至堅勁取其根作阮咸槽及彈琵琶局
 實甘酸止渴益人顏色通神益智治瘰癧瘡多食則醉以
 殼浸水飲之即解此即食物不消還以本物消之之意



龍眼肉

フーりん

龍目亞荔枝

圓眼 益智

熟卵荔枝奴

驪珠 蜜脾

鮫淚川輝子

ロシエン

本綱龍眼肉南方有之木高一二丈性最畏寒似荔枝枝葉微小凌冬不凋春末夏初開細白花七月實熟殼青黃文似鱗甲形正圓大如雀卵核若木梔子而不堅肉薄於荔枝白而有漿其甘如蜜實極繁每枚三二十顆作穗如蒲桃白露後方可采摘晒焙令乾成朶乾者名龍眼錦食品以荔枝為貴而資益則龍眼為良蓋荔枝性熱而龍眼性和平也嚴用和濟世方有歸脾湯入用之取甘味歸脾能益人智之義
△按龍眼肉自廣東廣西福建多來皆其肉正黑也但生者白焙熟如此乎多種其核遇有活生者而未有可結子木五雜組云凡荔枝龍眼核種者多不活即活亦頂二十年始令抱結子故接佳種之枝間歲即成實

龍荔

本綱龍荔狀如小荔枝而肉味如龍眼其木之身葉亦似二果故名之三月開小白花與荔枝同時熟不可生噉但

可ハニテ蒸食



橄欖

かんらん

青果 忠果
諫果

カンラン

本綱橄欖樹高丈餘大數圍葉似檉柳枝皆高聳二月開
花八月成實長寸許狀如長棗兩頭尖青色先生者向下
後生者漸高其子味苦澀久之方回甘味比之忠言逆耳
亂乃思之故名諫果其核亦兩頭尖而有稜核內有三竅
竅中有仁此亦可食其木高不可撽緣者但以木釘釘之
或納鹽少許於皮內一夕子皆自落木亦無損物理之妙
也其枝節間有脂膏如桃膠人取之扣皮葉煎汁熬如黑
飴謂之欖糖用泥船隙牢如膠漆着水益乾也食河豚魚
肝及子必迷悶至死惟此果及木煮汁解之

相傳橄欖木作取魚ヲサガフ棹ヘラ篋魚觸着即浮出乃知能治一切魚鼈之毒也



木威子

ゆい

本綱木威子生嶺南山谷樹高丈餘葉似楝葉子如橄欖而堅亦似棗削去皮可為糧食酸辛此橄欖之類也



菴摩勒

わんまろく

菴摩落迦果餘甘子

アシモウレツ


本綱菴摩勒木高一二丈枝條甚軟葉細密朝開幕欵如

夜合而葉微小春生冬凋三月有花着條而生如粟粒微黃隨即結實作蓮圓大如彈丸每條三兩子至冬而熟如李子狀青白色連核作五六瓣初入口苦澀良久飲水更甘乾即並核皆裂俗作果子噉之黃金得餘甘子則體柔亦物類相感相伏也故解金石之毒其木可製器物

五稜子陽桃

五欵子

南人呼稜為欵音此物有五稜故名之



ウ、カンツウ

本綱五欵子出嶺南及閩中其大如拳其色青黃潤綠形甚詭異狀如田家碌礪上有五稜如刻起作劍脊形皮肉脆軟其味初酸久甘其核如柰五月熟一樹可得數石十月再熟以蜜漬之甘酸而美

礪田家未見之本



榧

音斐

披子

赤果

玉榧玉山果

和名加倍
俗云加也

榧字亦作排

本綱榧生深山中，人呼為野杉。其木如榧而微軟，其理似松。有文采，堪為器用。其葉似杉，絕難長。木有牝牡，牡者華而牝者實。冬月開，莖圓，花結實，大小如棗。其核長如橄欖，核有尖者不尖者，無稜而微薄，黃白色。其仁有一重黑祖衣，中白色，嚼久漸甘，美可生啖，亦可焙收，以水而心實者為佳。一樹不下數十斛。

榧實

平

常食治五痔，療寸白蟲。小兒黃瘦，有蟲積者

宜食之。以豬脂炒榧黑皮，自脫。榧子同甘蔗食，其渣自

軟

榧子皮及葉
能殺人也

△按榧和州吉野之產最良。其木理細密，而有文采，芬香

用為棊局又能埋土水不朽用堪浴室之材熏火以可
避蚊蚊惡其香去紫蛤喜其香慕來凡好不好之異如
此者多又有不結實棊俗呼名倍倍棊凡棊子殼頭近於尖更
有小朮目以指甲押之則能破其中子有紫黑衣此與
栗子衣同味甚澀澀俗呼曰澀皮難脫連殼微焙則澀
皮易脫甘香美山人摘棊子糝灰經日販之
古今醫統云棊子陳者浸一宿以烈火烘皮皆砧其殼
食之如新六分

榧油 取中子微炒榨之以其油煎諸果麪及豆腐香味
勝於麻油然本草不言榧油何哉

梭子 神農本草以為別物汪穎為粗榧蘇恭時珍等
以為榧異名倭名抄以被訓末木異說紛紜恐以倭名
抄可為是

又倭名抄以柏為榧異名而柏與栢同字故俗多以栢
為榧訓用皆其誤起干和名抄栢即松栢之栢也其木葉似榧而異

くらまのし 新羅松子

俗云朝鮮松子

海松子

ハイソニツウ



本綱海松子樹與中國松樹同惟五葉一叢者隸內結子大如巴豆而有三稜一頭尖久收亦有油雲南亦有之而新羅國者肉甚香美當果食之但中國松子大如栢子亦可入藥不堪果食

海松子甘溫補不足潤皮膚肥五臟久服輕身不老昔仙人等好食松子者即此也

△按海松子凡出於中國外者皆稱海某如海紅豆亦然矣此松子多來於朝鮮以為果食裁其種生者往往有之葉長而與日本松大異也然結子者希也



檳榔子

如念也

賓門

仁類

洗瘡丹

實與即皆貴客之稱

本綱檳榔子生南方初生若荀竿積硬引莖直上莖幹頗似枕榔椰子而有節旁無枝柯條從心生端頂有葉如蕉條派開破風至則如羽扇掃天之狀三月葉中腫起一房因自拆裂出穗凡數百顆大如桃李又生刺重累干下以護衛其實五月成熟剝去其皮煮其肉而乾之皮皆筋絲與大腹皮同也其樹大者三圍高者九丈但其子作雞心狀正穩心不屈破之作錦文者為佳

嶺南人常食當果代茶交州廣州人凡有貴客必先呈之若邂逅不設用相嫌恨則檳榔名義取于此南方地濕不食此無以祛瘴癘也生食味苦澀與蠟蚌蚶等灰同咀嚼

之則柔滑甘美也

檳榔子

苦澀

下一切氣通關節利九竅下水腫治瀉痢

後重療諸瘧泄胸中至高之氣使之下行性如鐵石之

沉重治蛇厥腹痛其功有四一日醒能使之醉蓋食之

又則熏然頰赤若飲酒然二日醉能使之醒蓋酒後嚼

之則寬氣下痰餘醒頓解三日饑能使之飽四日飽能

使之饑蓋空腹食之則充然氣盛如飽飽後食之則飲

食快然易消

太腹檳榔 豬檳榔

大腹子

本綱此即檳榔中一種腹大形扁而味澀者不似檳榔尖
長味良耳與檳榔皆可通用但力稍劣耳

大腹皮

本綱此即大腹子之皮外黑色皮內皆筋絲如椰子皮蓋

鴛鳥多集檳榔樹上凡用此宜先以酒洗後以大豆汁煎

洗過乾入灰火煨用

大腹皮辛微溫

下一切氣止霍亂通大小腸消浮腫治胎

氣惡阻

山檳榔

蘇子

本綱山檳榔生日南在廣州之南其樹似檳榔而小與檳榔同
狀一叢十餘幹一幹十餘房一房數百子子長寸餘



椰子

ヤーを

越主頭
香餘

俗云夜之保

ヤーツウ

本綱椰子嶺南有之果中之大者其樹初栽時用鹽置根
下則易發木至斗大乃結實大者三四圍高五六丈木似

枕檳榔之屬通身無殺其葉在木頂長四五尺直聳指
 天狀如棕櫚勢如鳳尾二月開花成穗出於葉間長二三
 尺大如五斗器仍連着實一穗數枚小者如枯樓大者如
 寒瓜長七八寸徑四五寸懸着樹端六七月熟有粗皮包
 之皮內有核圓而黑潤甚堅硬厚二三分殼內有白肉瓤
 如凝雪味甘美如牛乳瓤肉空處有漿數合鑽蒂頂出清
 美如酒若久者則混濁不佳矣其殼磨光有斑縕點紋橫
 破之可作壺爵縱破之可作瓢杓如酒中有毒則酒沸起
 文此器裂破者察其裏即失用椰子之意林邑王與越主
有怨使刺客乘
其醉取其首懸于樹化為椰子其枝猶有眼故俗謂之
越主頭而其漿猶如酒也此說雖謬而俗傳以為口實
 乎



無漏子

千年棗海棗
 萬歲棗番棗
 波斯棗金果
 樹名鳳尾蕉
 又名海棗

本綱無漏子生波斯國今嶺南皆有之其木無旁枝直聳
 三四丈至巔四向共生十餘枝葉如鳳尾亦如椶櫚皮如
 鱗鱗二月開花狀如蕉花有兩脚漸漸開罅中有十餘房
 子長二寸黃白色狀如棗而大六七月熟則黑色味甘如
 飴但五三年一着子其子甘溫補中益氣令人肥健



枕椰子 鐵木

木名姑椰木


麝木 董梭

俗云太加也左牟

本綱枕椰子嶺南二廣州皆有之人家亦植之庭院間其
 木如棕櫚椰子檳榔無漏子而稍異大者四五圍高五六
 丈扶直無旁枝有節如竹紫黑色類花梨而多紋最堅重
 剛利如鐵用作鉞鋤代鎗鋒中濕更利惟中焦則易敗物
 相伏皮中有白粉似米粉及麥麩而赤黃色味甘大者至
 如此

數石彼土少穀常以牛酪食之其皮至柔堅韌可以作履其木巔頂生葉數十枚似棕櫚葉開花成穗結子綠色葉下有鬚如粗馬尾采之以織巾子得鹹水浸即粗脹而韌人以縛海船不用釘線

△按枕神即鐵樹也其標色類花梨而堅以作器或為三絃棹及胴人以貴重之畫譜有鐵樹者其形狀與枕神大異木出干高



紗木麪

穰木

字書無紗子當作莎衣之莎其葉離披如莎衣之狀

本綱紗木麪生南海高十丈許闊四五圍峯頭生葉兩邊行列如飛鳥翼皮中有白麪搗篩作餅或磨屑作飯食之輕滑甘美勝干枕柳麪



〰〰〰

安南人呼曰

曩伽結

波斯國人曰

波那波

波羅蜜

拂林國人曰

阿薩羅

ホウロロミツ

本網波羅蜜梵語也此果甘故名生交趾南番諸國樹高五六丈樹
 類冬青而黑潤葉極光淨冬夏不凋樹至斗大方形結實不
 花而實出於枝間多者十數枚少者五六枚大如冬瓜外
 有厚皮裹之若栗迷上有軟刺礪礪五六月熟時顆重五
 六斤剥去外皮殼內肉層疊如橘囊食之味甜美如蜜香
 氣滿室一實凡數百核核大如棗其中仁如栗黃煮炒食
 之甚佳果中之大者惟此與椰子而已



無花果

いちじく
たうりく

映日果阿駟

優曇鉢

俗云一熟
又云唐材

くハクコウ

本綱無花果出楊州及雲南處處南海折枝挿成枝柯如
 枇杷樹三月生葉有子如芭麻樹高丈餘五月內不花而
 實實出枝間狀如木饅頭其內虛軟采以鹽漬壓令扁日
 乾充果食熟則紫色軟爛甘味如材而無核一月而熟
 實甘平開胃止洩痢治五痔咽喉痛
 葉甘微辛有小毒治五痔腫痛煎湯頻熏洗之
 △按無花果其實似栳而本窄俗曰唐栳一月而熟故名
 一熟其樹雖似枇杷不然枝柯婆婆葉似芭麻而小背
 色淡潤文理隆明人識治五痔不知治魚毒如食魚醉
 遍身赤腫發熱者立愈無葉時用枝亦可也有二種

一種其實初青熟則紫黑色內白有脂虛軟如絲屑中無
 子味淡甘不美謂之黑一熟
 一種初青熟則白色帶微紫色內淡赤虛軟如絲屑中有
 軟小子味甘美謂之白一熟二種共八月熟
 涅槃經曰佛出世難如優曇花蓋壁無花果之開花猶白
 鳥馬角之類俗傳優曇花者一千九百一十一年開花甚妄談也
 云々

文光果

本綱文光果出景州形如無花果肉味如栗五月熟



天仙果


俗云犬枇杷

又云唐杜杞
 或云計良

見灌木類記

本綱天仙果出四川樹高八九尺葉似荔枝而小無花而實子如櫻桃ユスラムダ累累綴枝間六七月熟其味至甘

△按天仙果和州中有之冬凋春生葉似讓葉潤青未熟生ハ赤紫色內滿白細子小兒喜食俗名大枇杷



古度子

本綱古度子出交廣諸州樹葉如栗不花而實枝柯間生子大如石榴及櫛子コボケ而色赤味醋煮以爲粽食之若數日不煮則化作飛蛾穿皮飛去也

婆羅門龜莢

波斯皂莢

阿勃勒

婆羅門西域國名

波斯西域國名

西南夷國名



本綱阿勃勒樹長三四丈圍四五尺葉似枸櫞而短小經寒不凋不花而實莢長二尺中有隔隔內各有一子大如指頭赤色至堅硬中黑如墨味甘如飴可食

とけん

倒捻子

都念子



本綱都念子生嶺南隋煬帝時進百株植于西苑樹高丈餘葉如白楊枝柯長細花心金色花赤如蜀葵而大子如

小棗蜜漬食之甘美或云子如軟柿外紫內赤無核頭上有四葉如柿蒂食之必捻其蒂故名

しましんしう

馬金囊

紫檀櫛

馬櫛櫛

馬金南



本綱馬櫛櫛生南夷地蔓生結實大如葡萄紫色味甘內有核頗似大楓子而殼稍薄團長斜扁不等核內有仁亦甜凡嚼之者以冷水一口送下其甜如蜜

核仁

寒若甘

治產難臨時細嚼仁數枚

并華水送下

須臾立產

再以四枚

殼

兩手各握

二枚

惡水自下也

欲斷產者

下

常嚼二枚

以水久

則子宮冷自不發矣

又治惡瘡腫毒內食一枚

下

冷水

之外嚼盡之即無所傷

△按馬櫛櫛名義未詳亦不言葉形狀恨未得其種也



枳椇

いんぎょ

蜜核櫟木蜜

蜜屈律木餉

木珊瑚雞屎

鷄瓜子

俗云保乃奈

本綱枳椇其木名白石木

一名金鈎木一名生南地木高

三四丈葉圓大如桑柘夏月開花枝頭結實如雞爪形長

寸許紐曲開作二三岐儼若雞之足距嫩時青色經霜乃

黃實之味甘如蜜每開岐盡處結一二小子狀如蔓荊子

內有扁核赤色如酸棗仁形飛鳥喜巢其上

實甘平止渴除煩去隔上熱潤五臟利大小便功用同蜂

蜜枝葉煎能解酒毒

若以其木為柱則屋中之酒皆薄用此木誤落一片入

酒甕中酒化為水也

△按白石木今處處人家亦希有之相傳云小兒噉之能

免痘疹然未知其驗本草及證治準繩等亦謂解酒毒
不載免痘之功

みんめん

人面子



本綱人面子出廣中廣東廣西樹似含桃春花夏實秋熟
其子大如梅李無味蜜煎可食甘其核兩邊似人面口目
鼻皆具

△按人面子南方外國之產其種未入中華乎五雜俎云
猩猩果人面樹不得見之而已
大豆及豇豆亦有如人頭者皆似日本舊民當世風俗
頭髮而口目鼻不精而已



霸王樹

さくらんぼ

佐々良佐豆保

佐々保天

唐茹

伊呂倍呂

數名出處未詳

こんがて
いろへ

導生入牋云如掌色翠綠上多米點子葉生次上稱為奇樹可也

△按霸王樹今處處庭園有之無枝葉以為身則枝為枝則葉為葉則實誠奇樹也其一枚大者長七八寸階圖形如唐墨而深綠色表裏有白毛刺內白色堅重而脆易折摘一枚掉之着土處生根其根白短小而易倒不用架杖則不能自立也三四月生新葉累累次上至三十枚許高五七尺則夏兩邊生花似單葉菊花金黃色性畏雨雪喜風日故雖冬不包薦唯植南面宜置小屋可防雨霜也研末按臍帛則油垢能去

花初生



番蕉

華人呼曰鐵樹

倭云蘇鐵

桃柳木亦名鐵樹
同名異品也

五雜組云相傳此樹從琉球來云種之能辟火患其葉似鳳尾蕉而小其木麓巨葉密比如魚刺將枯時以鐵屑糞之或以鐵丁釘其根則復活蓋此樹水性金能生水也植盆中不甚長一年纔落一下葉計長不能以寸亦不甚作花余家蓄二本三十年中僅見兩度花耳其花亦似芭蕉而色黃不實

△按番者外夷之稱其狀似鳳尾蕉故名番蕉將枯者釘其根則活故倭曰蘇鐵蘇者回生之義原出於琉球而薩州多有之今處處植庭園及盆中貴重之大小皆可愛大者高丈余徑尺余而皮有鱗甲如老松皮頂上生葉如桃

椿樹之葉長二三尺深刻比比似魚刺兒樹生於根下大如拳亦鱗皮如本木然稍長至五六寸則生葉有一株七八子者性最畏寒濕冬月以藁包藏之四月將生新葉之前宜刈舊葉如中濕則朽急斫去朽處宜栽之如輪切而無根亦能活一異也雖大木其根細如絲樹中心有白麪以作餅食亦如枕相蘇木麪之白麪可救饑

○琉球久米島之產葉細小密比爲上大島爺山島之產葉粗大不密爲次

○開花者希有之有花者不實有實者不花其花初無柎而木頂上脹起白色帶微青彷彿盛佛飯狀既長則花瓣厚硬至一二尺者似土筆葉綻者而不落花落若生花宜急剪去否則新葉遲生

○結實者希有之其實生葉下有幕絲而連着之狀大小如栗有皺紋色如土朱漆而肉白中有仁乾則極堅

○冬月其根傍避尺許爲溝可澆鮮魚洗汁或糞汁古法
培鐵屑釘鐵丁者如今不用
泉州堺妙國寺有太木一株十七莖高一丈五六尺同
處祥雲寺番蕉亦次之他無比之者唯云薩州地如此
者不乏上少近年土佐亦名木多

深山崖石上有加牟カヌ曾久トコ草其莖葉畧似番蕉而株大似
番蕉椶櫚之輩トコ僞以爲番蕉トコ嫩木トコ然栽人家不活トコ石草トコ

舊唐書云：唐高祖武德元年，詔令天下諸州，凡有山川、名勝、古蹟、遺跡，並須採訪，具圖表上。其山川、名勝，須具名號、形勝、土產、物產、風俗、人情、古蹟、遺跡，並須採訪，具圖表上。其山川、名勝，須具名號、形勝、土產、物產、風俗、人情、古蹟、遺跡，並須採訪，具圖表上。

唐書地理志云：唐高祖武德元年，詔令天下諸州，凡有山川、名勝、古蹟、遺跡，並須採訪，具圖表上。其山川、名勝，須具名號、形勝、土產、物產、風俗、人情、古蹟、遺跡，並須採訪，具圖表上。

唐書地理志云：唐高祖武德元年，詔令天下諸州，凡有山川、名勝、古蹟、遺跡，並須採訪，具圖表上。其山川、名勝，須具名號、形勝、土產、物產、風俗、人情、古蹟、遺跡，並須採訪，具圖表上。

唐書地理志云：唐高祖武德元年，詔令天下諸州，凡有山川、名勝、古蹟、遺跡，並須採訪，具圖表上。其山川、名勝，須具名號、形勝、土產、物產、風俗、人情、古蹟、遺跡，並須採訪，具圖表上。

唐書地理志云：唐高祖武德元年，詔令天下諸州，凡有山川、名勝、古蹟、遺跡，並須採訪，具圖表上。其山川、名勝，須具名號、形勝、土產、物產、風俗、人情、古蹟、遺跡，並須採訪，具圖表上。

和漢三才圖會卷第八十九

攝陽 城醫法橋寺島良安 尚須編

味果類

椒紅

らんどう

花椒 大椒

檄音毀大椒

椒音標並同

今俗作音焦非也

名山椒

唐音
シツヤウ



秦椒

本綱秦椒始產于秦故名今處處可種最易蕃衍其葉對生尖而有刺四月生細花五月結實生青熟紅大於蜀椒其目亦不及蜀椒目光黑也但秦地亦有蜀椒蘇恭曰秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但味短實細爾然宗奭及時珍曰其實大於蜀椒

椒紅辛温有毒

除風邪温中堅齒髮明自久服好顏色耐老

古今醫統云花椒以帶目未開口者用碎土拌和入淨餅中密封口倒置地上於南檐有日色處晒着至春分撒畦中則粒粒皆出凡椒紅口開者有毒殺入

△按秦椒乃常名山椒者也以蘇恭之說可爲當山谷多有之也樹高五六尺不直其葉似槐葉而青綠色對生尖有冬凋落其枝多刺三月生嫩芽謂之木芽入羹及酒中有佳香四月開細花青白色五月結實積生青色謂之青山椒味辛香佳藏鹽水越冬辛味不變也六月熟黃紅色株大者曝乾純赤開口謂之椒紅藏之包黑反古紙則味不變備前瓷瓶亦可也然越冬者辛味失若生殊小顆者名平椒唯青時可食乾之不佳往昔所謂秦之地乃今陝西也

椒樹皮

剝木去麤皮曝乾取之用時浸水刮去內白肌

鹽漬或以醬油煮乾食之味辛鹹微香美僧家最賞之山城鞍馬山之產皮薄味勝丹波但馬及遠州山中野

州二荒山皆多出之

食椒

噓甚者不能言悶亂

或急令開口吹入人息於咽則安

或爐灰少許紙則佳涼水亦可

巴椒

漢椒

川椒

南椒

蜀椒

唐穀

點椒

巴蜀川漢皆地之名也



言ツヤ

和名太示留放之如美一名不佐波之如美

本綱蜀椒初出於蜀國

今號四川

今處處人家多作園圃種之

其木高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑四月結子

無花但生于枝葉間顆如小豆而圓皮紫赤色肉厚皮皺

其子光黑如人之瞳子故謂之椒且他椒子雖光黑亦不

似之

椒紅

辛溫有毒

手足太陰右腎命門氣分之藥稟五行之氣


而生葉青皮紅花黃膜白子黑其氣馨香其性下行能

使火熱下達不致上薰芳艸之中功皆不及之

凡入嘔吐服藥不納者必有蛇在膈間蛇聞藥則動動則藥出而蛇不出但於嘔吐藥中加炒川椒十粒良蓋蛇見椒則頭伏也 又能可收水銀 畏寒冬防風附

椒目チリシタ利小便治十二種水腫脹滿及腎虛耳鳴聾

△按蜀國今號四川生於彼地草木皆佳種也故川椒川芎川烏頭川黃連川楝子之名據此入藥椒紅亦宜用川椒在本朝可用朝倉椒



朝倉椒

あさくらこしあし

△按朝倉山椒始出於但馬朝倉谷其谷兩岸四五丹波間皆椒樹也丹後多接其枝今人以爲丹波朝倉近傾粟州津輕之

產亦顆大而氣味勝矣京師大坂人家雖接枝多不長
經四五年者希也山椒之名據此其樹無刺葉大而顆
亦大於他椒夏月開小花其目光黑最美其子生者不
佳可以枝接


椒紅 俗云乾山椒也常乾山椒辛味微而經月則變苦
朝倉椒正赤而甚辛越年亦味不變但忌觸人手此乃
本草所謂蜀椒也然蜀椒不華結子朝倉椒有花亦無
針蓋此一種因土地之異然耳
凡乾喜山椒樹來接反鼻蛇最然矣

椒植法

△按淹山椒六月用半熟者一升鹽三合和藏餅器入水
二升上安小木板而用小石壓之使椒不浮漂每用
取出以後亦如此否則變色味

冬山人參 俗稱


冬山椒



本綱蘘頌曰秦椒初秋生花秋末結實九月十月采之
△按有冬山椒者其葉大而冬實熟者此秦椒之別種也
人以爲珍然不如夏山椒氣味佳者時珍未見之乎蘘
頌之說以爲不然者非也


冬山人參

柚山椒



本綱蘘頌曰東海諸島上有椒枝葉皆相似子長而不圓

甚香其味似橘皮鳥上麀鹿食其葉其肉自然作椒橘香
 △按俗稱柚山椒者是也處處希有之枝葉子皆相似而
 其香氣似柚橘之類不上品但其子長而不圓者少異
 而已



蔓椒

ハぬえんす

豬椒 豕椒

兔椒 獐椒

狗椒 金椒

和名鮑波之加美
 一云保苗日本

ミツヤウ

今云以奴山椒

本綱蔓椒野生林菁間枝軟如蔓子葉皆似椒山人亦食之

實根莖 苦溫

治風寒濕痺四肢膝痛

煎湯蒸根治痔燒末服之

地椒

本綱地椒即蔓椒之小者其苗覆地蔓生莖葉甚細花作


小豕色紫白因舊莖而生其子小味微辛土人以煮羊肉食香美

實辛溫有毒

治淋瀝腫痛可作殺性蟲藥

乃人子

野椒



崖椒

俗此亦名大山椒

いぬこんまろ


本綱崖椒葉大於蜀椒不甚香而子灰色不黑無光野人用炒雞鴨食

椒紅辛熱

治肺氣上喘氣欬嗽

△按崖椒生原野其樹刺葉實皆類川椒但葉稍大色深綠不潤開細花結子大如綠豆而擯生未紅熟而開口味苦微有椒氣其目黑而不光澤此亦名大山椒凡物與某似而賤劣者皆稱大稱烏大粒蠶豆犬綠豆鴨酸豆之類也

條



粒

胡椒

こしやう

味酸支

胡椒者西戎之名雖非椒類因其辛似椒名

フツツヤウ

本綱胡椒出摩伽陀國今南番諸國皆有之其苗蔓生莖極柔弱作棚引之葉長寸許如扁豆山藥輩正月開黃白花結實纏藤而生狀如梧桐子亦無核生青熟紅青者更辣四月熟五月采收曬乾乃綴其葉晨開暮合合則暴其子於葉中今遍中國食品為日用之物也

實辛大

下氣溫中去痰除臟腑中風冷殺一切魚肉鼈

葷毒蓋純陽之物腸胃寒濕者宜之熱病人動火傷氣時珍自少嗜之歲歲病自而不疑及也後漸知其弊遂絕之目病亦止纔食一二粒即便昏澀病咽喉口齒者亦宜忌之

△按胡椒阿蘭陀商舶將來之番陀國之產最良蘇門答
刺交趾母羅加次之近頃有撒種生者其樹高二三尺
葉似番椒葉而厚不軟亦似千葉梔子葉四月開小白
花秋結子生熟與異國之產無異但枝莖雖纖弱不蔓
之屬葉亦大異也云云蓋此不胡椒小天蓼也灌木類
天蓼下可考合
胡椒辛氣入鼻則嚏故誤物入鼻孔不出者傍撒胡椒
末令嚏則隨出



畢澄茄

ひてりまや 毗陵茄子

皆番語也

本綱畢澄茄海南諸番皆有之蔓生春開白花夏結黑實
與胡椒一類二種如下大腹子與檳榔相近耳

實 辛溫 下氣消食暖脾胃止嘔吐噎逆治痘瘡入目羞明

生醫者 入鼻中三五次効

山胡椒

本綱山胡椒似胡椒而色黑顆粒大如黑豆味辛大熱破滯氣主心腹冷痛



番椒

たうから

番者南番之義也

俗云南蠻胡椒今云唐芥子

草本花詩譜云番椒叢生白花子儼如秃筆頭味辛色紅甚可觀子種

△按番椒出於南蠻慶長年中此與煙草同時將來也中華亦太明之末始有之故本草綱目未載之今立于椒

薑之右二月下種葉如柳而小亦似胡椒木葉而柔叢
 生枝脆處處多栽之或栽盆中玩賞之五月開小白花
 結子有數品如筆頭如椎子如櫻桃如枰枰或積生或
 草向上皆生青熟赤或赤有黃中子如茄子仁甚辣味苦
 或噎得火則愈烈生熟用少投羹中或和末醬食之有
 微香能進食惟人溫多食之能治行人膀胱番椒燒末
 又能治小鳥之病養樊中者或脹或糞閉不餌啄者急用
 番椒剉浸水令吞其水則治屢試之番椒近來之物誰
 人始用之耶殊不理所推
 食番椒噎者急吃沙糖則解之或吃濃末醬汁亦佳



吳茱萸

和名加波波之加美

ウチナヰイナ

和名加波波之加美

本綱吳茱萸今處處有之江淮四川猶多木高丈餘皮青
綠色枝柔肥葉長而皺似椿而闊厚紫色三月開紅紫花
七八月結實於稍頭累累成簇而無核嫩時微黃至熟則
深紫有粒大者小者二種小者入藥為勝懸其子於屋辟
鬼魅

子

辛溫有毒

浮而降陽中陰也入

足太陰經血分及少陰厥陰經氣分

其用

有三去胸中逆氣滿塞

止心腹感寒疔痛

二消痞滿

為白豆蔻之使

也皆取其散寒溫中燥溼解鬱之功

而已陳久者良不宜多用恐損元氣

九月九日折茱萸以挿頭或用絳囊盛茱萸以繫臂上

登高飲菊花酒則能辟惡氣

見風土記及續齋諧記

△按吳茱萸本朝古有之今絕無

食茱萸

越椒

欖子

辣子

藪

檄

艾子

和名於保太良

本綱食茱萸南北皆有之其木亦甚高大長及百尺者

和發三才圖會 卷之六 雜考

枝莖青黃上有小白點葉類油麻其花黃色子叢簇枝上

綠色其味辛辣蜇口慘腹音音 蜇也ヒリツク也 慘音參 酷毒也 痛也

實辛苦有毒功同吳茱萸力少劣爾此與吳茱萸一類二種也

以椒櫨薑為三香入食物中用之而今貴人罕用之

△按食茱萸亦古者本朝有之今無半



鹽麩子

五倍子 鹽膚子

鹽梅子 天鹽

鹽棗子 酸痛

叛奴鹽 木鹽

俗云双留天

本綱鹽麩子東南山原甚多木狀如椿其葉兩兩對生長而有齒面青背白有細毛味酸正葉之下節節兩邊有直葉貼莖如箭羽狀五六月開花青黃色成穗一枝鬘鬘七月結子大如細豆而扁生青熟微紫色其核淡綠狀如腎形核外薄皮上有薄鹽鹽生樹上者即是也小兒食之

詳下蟲部

其樹名沼留天西北及中國處處皆

有之信州之產爲良其花碎小成穗結實有小蟲啣汁

而結小毬於葉間大小不均狀如蓼青綠色久則黃其

穀堅脆中空有細蟲十月采之蒸穀否則腐敗其葉深

然僇者僇以僇訓奴天奴夫者效留天乎

南のすむ磯の浦多灰足後芳浪よりこれなる

分


醋林子

ツ
ヲ
、
リ
シ
ツ
ヲ


本綱醋林子生四川邛川山野林菁中木高丈餘枝葉繁

茂三月開白花四出九十月子熟纍纍數十枚成聚生青

熟赤罌櫻桃而蒂短熟時采之陰乾連核用以鹽醋收



藏充果食其葉味酸入鹽和魚鮓食云勝用醋也



茗

明音

茶

途音

檟

賈音

菱

設音

萍

外音

漢時茶字轉
途音為宅加切

今云是也

本綱茶有野生有種生種者用子其子大如指頂正圓黑
色其仁入口初甘後苦二月下種一坎須百顆乃生一株
蓋空殼者多故也畏水與日最宜坡地蔭處其木自一二
尺至數十尺木如瓜蘆葉如卮子花如白薔薇實如枳櫚
萃如丁香根如胡桃三歲可采春中採嫩葉蒸焙去苦水
末之乃可飲其葉卷者上舒者次凡雅州之產為第一建
州之茶上供御用凡茶者下為民生日用之資上為朝廷
賦稅之助其利博哉

茶之稅始
于唐德宗

採茶之候太早則味不全遲則神散以穀雨前五日為上
後五日次之再五日又次之茶芽紫者為上面皺者次之
團葉又次之元面如蓀葉者最下也徹夜無雲沍露採者
為上日中採者次之陰雨中不宜採產谷中者為上竹下
次之爛石中者又次之黃砂中者又次之

茶葉

微苦甘寒

入手足厥陰經治陰證湯藥內入此能清頭

目下氣消食去痰熱

服威靈仙土一

大抵飲茶宜熱宜少不飲尤佳空心飲茶入鹽直入腎

經且冷脾胃乃引賊入室也惟飲食後濃茶軟口去煩

臟

造茶法

新採揀去老葉及枝梗碎屑鍋廣二尺四寸將

茶一斤半焙之候鍋極熱始下茶急炒火不可緩待熟

方退火徹入篩中輕團每數遍復下鍋中漸減火焙乾

為度中為玄微難以言顯火候均停色全美

イロカキ

是茶の味をいふにけしめられしものなり

錦繡万花谷云九經無茶字但有茶字耳

△按茶東國通鑑云新羅國遣大廉如唐得茶子來王命

植智異山

唐文宗大和二年
倭淳和天皇五年

是乃朝鮮國種茶始

本朝嵯峨

天皇弘仁元年茶儀式始

先於朝鮮
其後明

惠上人入唐得嘉種歸種於梅尾山

凡本朝山家土民每旦煎茶入鹽稱朝茶多飲之而無病

長壽人多矣蓋反于本草之說與馴不馴之異乎但世

病淋病忌之夜多飲茶則令久不寢耳

凡碾茶出於山城宇治

當比中華
建州北苑

煎茶城州梅尾駿州安

部郡足久保村之產為上日向丹波蔓茶亦可江州政

所和州下市豫州不動坊並不劣其他諸國皆有之

凡種茶性畏日畏春霜故自節分後四十日至八十八

夜用蘆簾覆其樹而自穀雨後三四日摘新芽修治之

其法和漢異

倭則蒸乾
漢則焙熟

以細籠蒸之

用山茶樹或蕎麥
莖灰汁蒸之
色好

候盛繩囊紋去汁晒乾以焙籠焙之

蒸焙不
人不可成
練以此

雉羽擇品也精上者為濃茶初昔後昔

今昔

中昔盛袋數品

藏壺以最上者獻

御用次進公候

士家其次為諸茶

其極上名白

又有極詰別義詰等之品

擇取葉不卷縮者名摘摘昔

一種有鮮青色者名青不佳為淡茶

蠟茶

本綱蠟茶用建州北苑茶碾治作餅日晒得火愈良

△按今華人納蠟茶於腰壺行亦投湯吃之入藥用亦即

蠟茶也久不敗而不似新碾茶美香者故倭不用之

孩兒茶

五雜組云藥中有孩兒茶醫者盡用之而不知其所出考

本草諸書亦無載之者出南番中係細茶末入竹筒中繫

塞兩頭投汚泥溝中日久取出搗汁熬製而成俗因治小

兒諸瘡故名

茶湯

俗云數寄

茶經云茶湯如蟹眼及連珠者為萌湯直至湧沸如騰波鼓浪水氣全消方是純熟如振聲驟聲共為萌湯直至無聲方是純熟如浮氣一二縷三四縷及縷亂不分者為萌湯直至氣冲貫方是純熟

凡投茶于器有序先茶後湯謂之湯半下茶復以湯萌者

謂之先湯後茶謂之春秋中投夏上投冬下投

飲茶以客少為貴獨啜曰神二客曰勝三四曰趣五六曰

泛七八曰施

△按本朝茶儀式雖始於嵯峨朝其盛行也始于東山殿

源義政公選索和漢陶器孟盒釜爐等珍貴者請客與吃茶

謂之數寄有相阿彌者東山殿精茶湯事今人以相阿


彌為師祖而後珠光宗珠紹鷗宗易及小堀遠江守等

皆善之古田織部千利休道安守及慶首座細川二齋

瀬田掃部以上呼日以爲中興之祖其外桑山佐久間
之二士如宗古宗知宗和之輩亦皆焉干世

クンクンク 瓜蘆 苦薺

白羊蘆



カウ ロウ

本綱皇蘆生南方諸山中葉狀如茗而大如手掌換碎泡
飲味苦而色濁南番人作茗飲極重之客來先設乃加以
香茗之物如蜀人飲茶也而風味不及於茶

晉書卷之四十四 晉書卷之四十四 晉書卷之四十四

自學錄

古今事考彙編

和漢三才圖會卷第九十

攝陽 城醫法橋寺島良安尚順編

蔬果類

瓜類不同其用有二供果者甜瓜西瓜供菜者胡瓜越瓜
凡實在木曰果在地曰蔬大曰瓜小曰瓠和名多知其子
曰瓠音廉其肉曰瓠曰瓠音廉其肉曰瓠曰瓠音廉其肉曰瓠
曰瓠音廉其肉曰瓠曰瓠音廉其肉曰瓠曰瓠音廉其肉曰瓠
頭之旋毛其蒂曰臺瓜一名謂繫蔓處也



甜瓜

まぐは

甘瓜 果瓜

甜和名同音

熟阿末字里

熟和名保曾知

今云具桑瓜

唐音

ラシクハア

本綱甜瓜味甜干諸瓜故名二三月下種延蔓而生葉大

數寸五六月花開黃色六七月瓜熟其類最繁有團有長
有尖有扁大或徑尺小或一捻其稜或有或無其色或青
或綠或黃斑斕或白路黃路其瓢或白或紅其子或黃
或赤或白或黑凡瓜最畏麝香觸之即至一帶不收
瓜瓢甘寒滑止渴除煩熱解暑氣五月瓜沉水者食之
得冷病終身不瘥患反胃
脚氣人食之病永不除也
用熟瓜除瓢食之不害人瓜性最寒曝而食之尤冷凡
瓜寒於曝油冷於煎此物性之異也
凡食瓜過多但飲酒及水則消又食之入水自漬便消食
監亦良

瓜蒂

瓜下 苦丁香
甜瓜之蒂

本綱瓜蒂苦寒甜瓜蒂自然落在蔓上采得風吹乾用
之病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞噎氣
上衝咽喉不得息者此為胸中有寒當吐太陽中腸中

熱疹重而脉微弱此夏月傷冷水水行皮中也宜吐

少陽病頭痛發寒熱脉緊不大是膈上有痰也宜吐

胸上諸實鬱_レ而痛不能食欲人按之而反有濁唾下

利日十餘行寸口脉微弦者宜吐懊憹煩躁不得眠味

經汗下者謂之實煩當吐宿食在上管者當吐並宜以

瓜蒂散主之凡胃弱人及病後產後不宜用此也

之本 瓜蒂散多ね通てカクノ瓜仔りきくの垣ねと

按甜瓜出於濃列真桑村者良故總名稱真桑武列川

起尾列青鷺洛之東寺為上駿列府中羽列七浦攝列

氷野泉列堺舳松皆得名參列銀甜瓜白色而有銀筋

加列田中和列梵田白色也凡下種前一日用沙糖及

白柿肉漬水浸瓜子於其水一宿取出種之則生美味


其苗至蔓稍長鋪藁於根邊宜使瓜在藁上也甚延

長則宜斷蔓末否則莖蔓不肥也凡摘熟瓜經一兩宿

者味美也摘經久者瓢爛味不美狐及鴉喜竊食之

利濟三才圖會 卷之十 寒瓜

一種有韓瓜皮不甜而大 一種有阿古俗名 一種有鹽味誤瓜汁着刀斂則忽生鏽 瓜蔓晒乾者如鐵線截之難斷 名天久須用之為釣絲漁家最重之自中華來天蠶絲與此一類乎



西瓜

すいぐわ 寒瓜

俗云須以久波 唐音之訛也

スイクワ

本綱五代之先瓜種已入浙東但無西瓜五代時胡嶠征回統得此種始入中國名曰西瓜北地多有之今則南北皆有而南方者味稍不及也二月下種以牛糞覆而種之蔓生花葉皆如甜瓜七八月實熟有圍及徑尺者長至二尺者其稜或有或無其色或青或綠其瓢或白或紅紅者

味尤勝其子或黃或紅或黑或白白者味更劣其味有甘有淡有酸酸者為下以瓜劃破曝日中少頃食即冷如水也得酒氣近糯米即易爛貓踏之即易沙食西瓜後食其子即不噫瓜氣

西瓜瓢甘淡寒

止煩渴解暑熱利小水治血痢解酒毒有

天生白虎湯號然亦不宜多食多食終難胃弱者不可食西瓜與油餅同食損脾

西瓜子甘寒

曝裂取仁生食炒熟俱佳也皮不堪啖亦

可蚤煎醬藏口舌唇内生瘡者西瓜皮燒研噉之

△按西瓜慶安中黃檗隱元入朝時携西瓜扁豆等之種來始種於長崎然亦惡青臭氣或瓢汁赤色以為似血肉兒女特不食今則處處多有之貴賤老幼皆嗜之而武陽之產最良攝州鳴尾亦美瓢赤瓢黑者為上其瓢近皮處白色而味淡故不堪食乃連皮藏糟為香物或煮食亦佳凡熟者敲之音和如中虛未熟者音硬如中

實也

一種正圓而稍小，瓢正赤，味甚甜，其皮及白肉薄，近頃出之俗呼曰韓西瓜，然瓢沙而不如常西瓜之柔潤。西瓜與蕎麥同食，傷人至死者亦多。詳于蕎麥下。古今醫統云：西瓜懸高處收之，不壞；若當掃帚風，則壞也。東瓜亦然。

楊溪瓜

本綱：楊溪瓜，秋生，冬熟，形畧長扁而大，瓢色如臙脂，味勝可留至次年。



葡萄

あひろし
ブドウ

ぶどう

蒲桃、草龍珠

和名衣比加旦良乃美

本綱葡萄漢張騫使西域還始得此種而神農本草已有葡萄則漢前隴西舊有但未入關耳淮南不植葡萄亦如橘之變干河北也

折藤厭之最易生春月萌苞生葉頗似栝樓葉而有五尖生鬚延蔓引數十丈三月開小花成穗黃白色仍連着實星編珠聚七八月熟有紫白二色其根莖中空相通暮漑其根而晨朝水浸子中矣甘草作釘鍼葡萄立死以麝香入葡萄皮內則葡萄盡作香氣其愛憎異于他木又葡萄架下不可飲酒恐蟲尿傷人

圓者名草龍珠

長者名馬乳葡萄

白者名水晶葡萄

黑者名紫葡萄

綠葡萄熟時色綠

瑣瑣葡萄大如五

味子而無核

葡萄實

甘平

益氣倍力強志利小便痘瘡不出食之可

甘而不節酸而不


酢冷而不寒味長

屬土有水與木火

東南人多食病熱

△按葡萄甲州之產顆大而味甚佳駿州次之河州富田

林村之產亦次之北國希有之取新熟者拭淨盛桶向
 下垂不相捎密封在高處以防風濕則宜超歲
 古今醫統云葡萄樹宜濕地米泔澆之作架引蔓根旁以
 草束唯避蛇蟲怕麝香一法種近棗樹春鑽棗樹作一孔
 引葡萄枝從孔中過伺其大塞蒲棗樹竅而後截使托棗
 生實大而甘美托者斤也蓋愛麝香與怕之異說有



蓊蓊

くさやう
さびつり

山葡萄燕蓊
 野葡萄嬰舌
 藤名木龍

俗云五由美
 又云衣比豆留

本綱蓊蓊野生蔓葉花實與葡萄無異其實小而圓色不
 甚紫也冬月惟葉凋而藤不死其莖吹之氣出有汁如通
 草也其子堪作酒甘酸止渴悅色益氣
 △按野葡萄子亦熟則紫黑人好釀酒



獼猴桃

獼猴梨 藤梨
陽桃 木字

ミイ含ウタウ

本綱獼猴桃生山谷中高二三丈枝條柔弱多附木而生
葉圓有毛其實形如梨其色如桃生則極酸十月爛熟色
淡綠味甘美可食木皮堪作紙中子繁細其色如芥子深
山則為猴所食故其子少淺山傍道則有子

子酸甘
寒

解煩熱調中下氣



甘蔗

沙糖

さとうの木
かんさ

竿蔗

諸音
遷

カンサエ

本綱甘蔗江東浙江閩廣湖南四川皆有之而四川及嶺南者為勝皆畦種叢生最因地力莖似竹而內實大者圍數寸長六七尺根下節密以漸而疎抽葉如蔗葉而大長三四尺扶疎四垂八九月收莖可留凡草皆正生抽出惟蔗側種根上度出故字從度有四種

杜蔗

一作蔗名其莖粗而長皮薄味極醇厚用可作餠霜

荻蔗

一作荻名其莖細短而節疎亦可作沙餠

紅蔗

一名紫蔗其莖細短而節疎亦可作沙餠

西蔗

一作糖霜色淺

凡蔗榨漿飲固佳又不若咀嚼之味雋永也至北地者

荻蔗多而竹蔗少也

蔗漿

甘寒下氣助脾氣利大小腸消痰止渴解酒毒

煎鍊成餠則甘溫助酒為熱是生熟之異也

甘草遇火則熱


麻油遇火則冷

甘蔗煎餠則熱

水成湯則冷

如此物性之異醫者可不知乎

紫糖



糖霜



水糖



紫糖

くろさたう

煎蔗汁成
稀者為紫糖
密者為沙糖
糖者為糖餅
明者為糖霜

本細沙糖法出西域唐太宗始遣人傳其法入中國名甘

蔗汁過樟木槽取而煎成

紫糖一名蔗糖

初煎成清者紫黑色

俗云黑沙糖

復可煎化即成

鳥獸果物之狀以充席獻今之貨者又多雜以米飴諸

物不可不知

氣味

甘溫

潤心肺治口乾渴多食則令人心痛生長蟲

與棗同食病齕與鯽魚同食成疳蟲與笋同食不消成癥身重不能行也

米糖

糖霜

石蜜

石蜜則白沙糖也凝結作餅塊如石○糖霜輕白如霜

水糖堅白如冰○饗糖以白糖煎化模印成人物獅象之

形也

下名

○糖經以石蜜和諸果仁及橙橘皮縮砂蒲

荷類

作成餅塊者也皆一物有精粗之異也

氣味

甘寒

生津潤心肺燥熱消口乾渴明目治嗽消痰

解酒助脾氣緩肝氣

石蜜糖霜水糖之三品比之

紫沙糖性稍平功用相同

入藥勝之

若久食則助熱損

今人每用為調和徒取其適口而不言陰受其害也

古者惟飲蔗漿其後煎為蔗饒又曝為石蜜唐初以蔗為

酒而饒霜則自太曆間有鄒和尚者來住蜀之遂寧縣山

始傳造水糖法起焉

△按沙糖有冰糖糖霜紫糖三品

石蜜亦白沙糖之本是

一物猶生鐵熟鐵鋼鐵之異本朝雖移種之不茂盛也

資餅之佐必用之食品也自異國所來大槩記于左

白沙糖者凡二百五十万斤

分爲二百七十萬斤於長崎橫濱有八十八萬斤半

自諸國來潔白而不濕者佳其中有大塊如圓扁餅者呼曰盞盃碎之甚白凡太寬為極上交趾次之南京福建寧波等又次之咬啍吧阿蘭陀島為下

永沙糖 凡二十万斤余

玲瓏如琥珀者佳是亦自處處來太寬為上

黑沙糖 凡七八十万斤

交趾為上太寬福列暹羅次之用時煎之宜澆去石灰東補塞為下此外自

琉球亦七八十万斤來最下有且琉球未熟白米製法乎唯黑沙糖而已

刺蜜給教羅



草蜜

大明一統志云西番撒馬兒罕地有草叢生葉細如藍秋露凝其上味甘如蜜可熬為飴土人呼為達即古賓

△按本綱出諸說有異同皆西番所生草上甘露也最奇品也爲多識記之耳

和漢三才圖會卷第九十一

水果類

攝陽 城醫法橋寺島良安 尚順 編



蓮

唐音

蓮 和名波知須

蓮房似蜂窠 故名之 又畧曰波須

本綱蓮以子種者生遲藕芽種者最易發其芽穿泥成白
藕即落也長者至丈餘五六月嫩時沒水取之可作蔬茹
俗呼藕絲菜節生二莖一為藕荷其葉貼水其下旁行生
藕也一為菱荷其葉出水其旁莖生花也其葉清明後生
六七月開花花有紅白粉紅三色其花未發為蓴蓴已發
為芙蕖水華花心有黃鬚莖長寸餘鬚內即蓮也花既連

房成箭也蓮實箭在房如蜂子在窠之狀六七月米嫩者生食脆美至秋房枯子黑其堅如石八九月收之研去黑殼謂之蓮肉冬月至春搗藕食之

大抵野生及紅花者蓮多藕多藕多種植及白花者蓮少藕佳也其花白者香紅者豔千葉者不結實也其莖為荷莖乃負葉者取負荷之義箭中青心二三分為苦薏

荷梗塞孔鼠自去煎湯洗鐵垢自新物性然也

蓮產于淤泥而不為泥染居于水中而不為水沒根莖花實凡品難同清淨瀟用羣美兼得自藕落而節節生莖生葉生花生藕由茵荷而生莖生蓮生箭生薏其蓮箭則始而黃黃而青青而綠綠而黑中含白肉內隱青心石蓮子堅剛可歷永久薏藏生意藕復萌芽展轉生生造化不息故釋氏用譬妙理具存矣

有合歡並頭者有夜舒荷夜布畫卷睡蓮花夜入水

金蓮花黃色

碧蓮花碧色

繡蓮花如繡皆是異種

古今醫統云蓮萌枝淨瓮中經年移種則發花碧色芙蓉
先一夕以靛水調以紙蘸花莖上用紙裹之來日開花

亦成碧色

△按蓮生於泥而清淨性忌糞溺油膩物周茂叔之云菊
花之隱逸者也牡丹花之富貴者也蓮花之君子者也
且諸佛喜以蓮華為座亦取清淨之義耳

有倭蓮唐蓮二種倭蓮子如小榧唐蓮子稍小團二月
斫去頭尾尖用小器盛水投之中日則五七日生白髭
根候葉生移栽於瓮其葉花小艷美可愛有白紅粉紅
口紅之數品一池中不可襍栽變成其多者色

金絲蓮

紅花有金黃色理文最為珍

大紅蓮

花淡赤色形似芭蕉花而從下開上凋落亦然

五六寸為臺稍成畝有花不實

天竺蓮

花紅千葉而下列開凡蓮月午以後萎翌朝得

天日光唯天竺蓮晝夜不萎經五六月悉落焉

山海經所謂大華山

在五嶽之西

高五千仞廣十里山頂

有池池中千葉蓮華服之羽化者亦此類乎

蓮肉

苗 澤芝

蕝

石蓮子

水芝

中心青者名苦蕝蓮名

本綱蓮實至秋黑堅如石剝去黑殼謂之蓮肉以水浸去

赤皮青心生食甚佳入藥須蒸熟或晒或焙乾用之

氣味甘溫

止脾泄久痢赤白濁脾之果補中養神益氣

力除百疾

得茯苓白木良便燥者不可食大用之不去苦蕝令人作吐

藕

藕波知須乃除

器

和名波衣俗云嫩根

一名藕絲菜

本綱蓮根五六月嫩時名藕如竹之行鞭者節生二莖一

為葉一為花盡處老則為藕花葉常偶生不偶不生故曰

藕凡白花藕大而孔扁生食之味甘煮食不美紅花及野

藕生食味澀煮蒸則佳冬春掘之食皆白色有孔有絲大

者如肱臂長六七尺凡五六節以鹽水供食則不損

藕甘散留血生肌止怒解酒毒及病後乾渴煮忌鐵器

藕節澀平治吐衄欬血及血痢

凡產後忌生冷物獨藕不同生冷者為能破瘀血故藕

亦節有治產後血悶口乾腹痛之功

△按藕有二節露出於其末節七八月採藕生食之煮亦

佳得酸愈良至冬孔中絲多甚稠煮之亦不絕如蜘蛛絲

冬春掘藕燂充果食俗云食藕則三年以前古疵再發

也此大齟齬于本草之說

荷葉

蓮同

藕荷俗云

菱荷俗云

本綱嫩者名荷錢形像貼水者名藕荷生藕出水者名菱荷

者生止渴落胞破血治產後口乾心肺躁煩

△按蓮凡四月生浮葉五月生立葉六月別生一莖莖頂

生菡萏也今人用荷葉裹飯及未醬當暑不饒

潔古張先生製枳朮丸方枳實白朮二味用荷葉燒飯
 為丸荷葉生干水土之下污穢之中挺然獨立其色青
 其形仰其中空象震卦之體用此為引可謂遠識合道
 矣更以燒飯和藥與白朮協力滋養補令胃厚不致內
 傷其利廣矣時珍曰但以新荷葉煮湯入梗米造飯氣
 味亦全也

蓮花

芙蓉 芙蓉 芙蓉

蓮蕊

佛座鬚

本細蓮花

水華

鎮心益色駐顏輕身難產催生蓮花

葉書人字吞之即易產忌地黃葱蒜

蓮蕊

清心通腎固精氣烏鬚髮悅顏色益血止血

崩吐血忌同前

菱 水栗

沙角

和名比之

無角者名三河菱

菱 音岐




本綱菱落泥中最易生有野菱家菱皆三月生蔓延引葉
 浮水上扁而有尖光面如鏡葉下之莖有股如蝦股一莖
 一葉兩兩相差如蝶翅狀五六月開小白花背日而生晝
 合宵炕隨月轉移其實有三角四角或兩角無角之數種
 野菱自生湖中葉實俱小其角硬直刺入其色嫩時青老
 黑嫩時剝食甘美老則蒸煮食之野人暴乾剝米為餅為
 粥為饌為果皆可代糧其莖亦可暴收和米作餅以度荒
 歉蓋澤農有利之物也
 家菱種干陂塘葉實俱大肉爽而脆亦有兩角彎卷如弓
 形者其色有青有紅有紫嫩時剝食皮脆肉美老則殼黑

而硬際入江中謂之烏菱冬月取之風乾為果生熟皆佳
夏月以糞水澆其葉則實更肥美凡菱花開背月菱花開
向日故菱寒而菱暖

菱肉甘平安中補五臟解暑止消渴然水菱中此物最不
治病多食傷人臟腑損陽氣若過食腹脹者可暖

古今醫統云八九月收老黑子撒池中自生凡種水果只
以牛糞大忌桐油若桐油瓶罐投池中即水果絕死



菱

- 雞頭 雞雍
- 鴈頭 鴈頭
- 鴈喙 卵菱
- 蔦子 水流黃

本綱茨生池澤二月生葉貼水大干荷葉皺文如穀蹙蹙
如沸面青背紫莖葉皆有刺其莖長至丈餘中亦有孔有

絲嫩者名薦葦一名蒹剝皮可食五六月生紫花

結苞外有青刺如蠟刺及栗毬之形花在苞頂亦如雞喙

及蠟喙剝開肉有班駁軟肉裏子累累如珠璣殼內白米

狀如魚目取收食其根狀如三稜煮食如芋


芡實甘平治濕痺腰脊膝痛補中益精氣強志令耳目聰

明久服輕身不饑耐老芡實一斗以防風四兩煎湯浸過用且經久不壞

△按芡生池澤狀似落故俗名水落似落而生山谷者曰

軟冬俗名山落和名也牛蒡似落而葉大故和名曰馬

落布未布皆以和名可辨



烏芋

烏芋 烏芋

勃臍黑三稜

地栗 芍音

俗云黑父和井

用田烏子三字

本綱烏芋生淺水田中其苗三四月出土一莖直上無枝

葉狀如龍鬚，肥田栽者，粗近葱蒲，高二三丈，其根白，秋後結顆大如山查，栗子而臍有聚毛累累，下生入泥底野生者黑而小，食之多，萍種出者紫而大，食之多，毛沃田種之，三月下種，霜後苗枯，冬春掘收為果，生食煮食皆良。

根甘微

消黃疸，療五種，膈氣，消宿食，飯後宜食之。

人入腹，不可食，令善，毀銅合，銅錢嚼之，則錢化，可見其為消。

堅削積之物，故能化五種，膈疾而消宿食，治誤吞銅也。

按烏芋其根形味似慈姑而有黑白之異，故謂之黑久。

和井葉似石龍芻，葉也，又烏芋，鮭食慈姑，鮭食。

此乃其根也，其葉如小芋之葉，其根如小芋之根。



慈姑

ととら
しらとら

ツラツラ
燕尾草

藉姑、白地栗、水萍、阿鼻莊、苗名、剪刀草、箭搭草、槎丫草

本綱慈姑生_二水田中_一人亦種之三月生苗青莖中空其外有稜葉如燕尾前尖後岐每叢十餘莖內抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣蕊深黃色霜後葉枯根乃練結大者如杏小者如栗色白而瑩滑冬及春初掘取以為果須煮湯煮熟去皮食乃不麻澀_二人咽也_一嫩莖亦可燻食一根歲生十二子如慈姑之乳諸子故以名之

福州別有一種小異三月開花四時采根食

根

微甘寒

又有山慈姑者

與此不同見山草部

治百毒產後血悶攻心欲死

姓婦不可食

以生薑同煮食佳

多食發陽風痔漏崩中帶下瘡癰

△按慈姑其苗俗名於毛太加其根名白久和井開單葉

小白花

近頃有千葉者花大如指頭團白以為珍其

紅者亦希有之栽盆中賞其花

一種有小而如獨頭蘭根者煮食之味更佳攝州吹田村

多出之所謂福州之小慈姑此類矣凡慈姑燻復用醬

油煮食味似栗不須灰湯亦可

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美

小果小而味甘如蜜其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美其皮如紙其肉如肉其子如豆其味甘美



李
總

八一
六九



本
總

八一
六九

九 十 二 之 本

山草類

藥品

地
倭漢三才圖會




李
總

八
一
六
九

AE
4
T4
1824
V. 9211

和漢三才圖會卷第九十二之本目錄

草類



△按凡草始生曰苗訓音妙和蒔音牙和蒔出曰芽訓音牙和枝葉豐盛

曰茂音懋和訓花下柑曰萼音謬俗太含實曰繩音孕

花乃周禮注曰艾其繩則實不成又綴實底曰帶訓音帶

應劭曰木實曰果草實曰蒴音托又有核曰果無核曰蒴

時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成根莖柔交

于剛而成枝幹葉萼屬陽華實屬陰由是草中有木木中

有草得氣之粹者為良得氣之戾者為毒故有五形檢木

土五氣腥臭臊五色青赤黃白黑五味酸苦甘辛鹹五性寒熱溫五

用升降浮神農嘗而辨之黃帝述而著之

神農本草經一百六十四種漢魏唐宋良醫代有增益

除穀菜外凡得草屬之可供醫藥者六百一十種分類

和漢三才圖會
本草
卷九十二之本目錄

日山曰芳曰濕曰毒曰蔓曰水曰石曰苔
本草綱目所載亦如有名味用之類省之而不出
三才圖會農政全書盡譜所載者兼本朝所見者出之
然未改其功能者唯記形狀而已

藥品

凡諸藥多用草故字从艸今金石木土之劑皆為藥而
草木根梢收採惟宜秋末春初春初則津潤始萌未充
枝葉秋末則氣汁下降悉歸本根諺曰賣藥者兩眼用
藥者一眼服藥者無眼非虛語也鑒不能識藥惟聽市
人市人又不辨究皆委採送之家傳習造作真偽好惡
並皆莫測

鍾乳醋煮令白
常歸酒酒取潤
以薺花亂人參

細辛水漬使直
紫蛤朱足令赤
用木通混防已

黃芪蜜蒸為甜
古壙灰云死龍骨
首蒼根謂土黃

蝶蛸膠干桑枝

藿香米茄葉襍

麝香搗荔枝核搗

研石膏和輕粉

以薑黃言鬱金

嫩松稍為肉從蓉

批杷葉代欬冬

草仁克草豆蔻

松脂混麒麟竭

西采代南木香

驢脚脰作虎骨

番硝和龍腦香

或半夏煮黃為玄胡索

或熬廣膠入蕎麵炒作阿膠

或煮雞子及鯖魚枕為琥珀之類巧詐百般為忌畏毒

甚致殺入歸咎用藥

本草綱目本草必讀之說拾要記之

△按百草黑燒用鍋底墨陳倉米用三年米者雖不中不

遠以猿尾麋鹿茸以膠飴襍蜂蜜以黃獨為何首烏者

其用藥有何益耶

凡藥品來於中華者太君命遣識藥人于長崎悉辨正

之以聽交易出於日本藥品贗偽者嚴所禁止

藿香 黃芪 白欬 白芷 白鮮皮 桑寄生

常山 辰砂 滑石 阿膠 代赭石 爐眼石

右件倭藥不佳所以禁交易

官桂 大戟 茵陳 續斷 菊花 牛黃 白丁香

熊膽 虎膽 麝香 琥珀 阿仙藥 俗云 五加皮

右件藥贗偽多有所以禁賣偽藥

熟地黃 麴半夏 神麴 乾薑

右件藥修製宜隨古法如省略者禁賣

川烏頭偽名新附子 大風子油偽名雷丸油

倭當藥偽名胡黃蓮

右件藥自今以後用本名須賣買之

重目 輕粉 平戶人參 熊野小人參

右件藥性功不佳所以禁賣買之

明曆四年法令其詳審如之然恐詐送者嘗綿密之擇求者每等閑也蓋藥肆有言不欲價賤輒可得真者

六陳

狼毒 枳實 橘皮 半夏 麻黃 吳茱萸

陶隱居曰六種皆須陳久者良其餘須精新也

大黃 木賊 荊芥 芫花 槐花

李杲曰是等亦宜陳久不獨六陳也

名義

以時名者 迎春 半夏 夏枯草 款冬 忍冬

以人名者 杜仲 王孫 徐長卿 丁公藤 蒲公英

劉寄奴 何首烏 使君子

以物名者 淫羊藿 麋銜草 鹿跑草

以地名者 常山 高良 天竺 迦南

以形名者 虎掌 狗脊 馬鞭 烏喙 鵝尾 鴨蹠

鶴蟲 鼠耳 牛膝

以性名者 益母 狼毒 預知子 王不留行 骨碎補

以名名者 沒藥 景天 三七 無名異 威靈花

沒石子

有南北土地之異

朝廷進御常有不時之花然皆藏土窖中四周以火逼之故隆冬時卽有牡丹花計其工力一本至十數金此以難得爲貴耳其不時之物非天地之正也北方花木過九月霜降後卽掘坑塹深四尺寘花於其中周以草積密壅之春分後發不然卽槁死矣

南方攜入北地者如梅桂梔子之屬尤難過臘至茉莉則百無一存矣南方閩廣卽茉莉薔薇酴醾山茶之屬皆以編籬以語西北之人未必信也

有睡草却睡之草 醉草醒醉之草 宵明草晝暗之草 夜合草夜舒之草物性相反有如此者

藥七情

○單行 ○相須 ○相使 ○相畏 ○相惡 ○相反 ○相殺

單行者

相須者

相使者

相惡者

相畏者

相反者

相殺者

單方不用輔也

同類不可離也

我之佐使也

奪我之能也

受彼之制也

彼我交讎必不和合

制彼之毒也

相反者為害深于相惡者

然古方多有相惡相友者

此皆精微妙奧非達權衡者不能知

相反

十八種

人參

沙參

玄參

苦參

丹參

紫參

芍藥

細辛

以上藥反藜蘆逢之便殺人

半夏

白芨

白欬

瓜樓

貝母

如人參與甘草類

半夏使柴胡

黃芪惡龜甲白鮮皮

人參惡皂莢黑豆

附子畏人參甘草半夏

畏生薑得之則不為毒

今畫家用雌黃胡粉相

近便自黷如可證矣

然古方有甘草九有防己細辛

皂莢之類此皆精微妙奧非達權衡者不能知

以上反烏頭與烏喙逢之便疾反

大戟 海藻 芫花 甘遂 以上反甘草

蜜蠟與葱 石決明與雲母 並相反

黎蘆莫把酒米浸 如犯之都是苦

相畏

十九種

官桂與石脂

牙硝與三稜

川烏頭草烏頭與犀角

丁香與鬱金

硫黃與朴消

狼毒與密陀僧

水銀與砒霜

巴豆與牽牛

人參與五靈脂

忌鐵

二十四種

菖蒲 龍膽

茜根

五味子

括樓

麻黃

香附子

芍藥

知母

牡丹

石榴皮

藜蘆

商陸

桑白皮

槐花

皂莢

雷丸

桑寄生

猪苓

山藥

蒺藜

桑葚

陳子

何首烏

忌銅 いもあつねと

二種

辰砂 雄黃

忌銅鐵 いせあつねそくてつ

四種

地黃 玄參 益母草 肉豆蔻

忌火 いひ

三十二種

青黛	犀角	茵陳	茜根	柴胡	木香	羚羊角
雲母	芒消	朴消	滑石	雄黃	菊花	禹餘糧
川芎	藍葉	乳香	甘松	桂心	丁子	鐘乳石
白檀	藿香	牛黃	薄荷	紫草	沈香	薰陸香
白芷	胡椒	麝香	檳榔			

制衣法母輕忽 せいのちほうははかるそくしつ

芫花本利水無醋不能通
草菓消腫効連壳反脹胸
蒲黃生通血熟補血運通
陳皮專理氣連白補胃中
草烏解風痺生用使人蒙

萊豆本解毒帶殼不見功
黑豆生利水遠志苗毒逢
地榆醫血藥連稍不住紅
附子救陰藥生用走皮風

人言燒過用諸石火煨紅而

入醋能為末製度必須工

當歸頭止血尾破血

麻黃身發汗根止汗

蜜成於蜂蜜溫而蜂寒

油生於麻麻溫而油寒

穀屬金而糠之性熱

麥屬陽而麩之性涼

山茱萸補腎固精元

其核滑精故須去核

猪苓茯苓厚朴桑白皮之類

不去皮耗人元氣

栝子火麻益智草菓之類

不去皮令人心痞

人參桔梗常山之類

不去苗蘆令人嘔吐

遠志巴戟門冬蓮子烏藥之類

不去心令人煩燥

知母桑白皮天麥門冬地黃何首烏

犯鐵必患二消

服藥食忌

如羊犬狸肉者本朝人嘗不食故忌之藥省不記之

有白朮蒼朮

勿食桃李雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物

有荊芥

勿食河豚及一切無鱗魚蟹

有天門冬紫菀丹砂龍骨

忌鯉魚

有黃連桔梗烏梅胡黃連

忌猪肉

有土茯苓威靈仙

忌麪及茶

有茯苓茯神丹參

忌醋及一切酸

有地黃何首烏

忌蘿蔔葱

有常山

勿食生葱生菜

有甘草

勿食菰菜及海藻

有巴豆

勿食野猪肉

有半夏菖蒲

勿食飴糖

有牡丹

勿食蒜胡荽

有厚朴蓖麻

勿食炒豆

有當歸

勿食濕麪

有薄荷

勿食醃肉

有鼈甲

勿食莧菜

有檳榔

勿食橙橘

凡服藥不可多食生蒜胡菜生葱諸果油膩物

飲食禁忌

如牛馬羊犬者本朝人不食故省不記之

雞肉

忌蒜葱芥末糯米鯉野雞

沙饅

忌鯽魚笋

猪肉

忌蕎麥木耳胡桃鯽魚

蕎麥

忌猪肉猪肉

螃蟹

忌荊芥柿橘軟棗

木耳

忌猪肉野鴨

蝦子

忌雞肉猪肉

芥子

忌鯽雞蟹兔

綠豆

忌樵子殺人又忌鯉魚鮓

乾笋

忌沙饅鯽魚

胡桃

忌野鴨雞及酒

枇杷

忌熱麪

胡椒

忌魚鱸魚鮓鯽魚雞

桃子

忌蟹肉

蟹肉

忌莧菜薄荷芥菜桃雞子

銀杏

忌鰻鱺

鯽魚

忌芥末蒜饅雞雞

楊梅

忌生葱

魚鮓

忌豆藿麥醬蒜綠豆

慈姑

忌菜苳

河豚

忌煤焙荊芥防風菊花桔梗甘草烏頭附子

△按今人食雞肉多入葱蒜為臞呼名南蠻煮

又有食鯽鱠胡葱蒜和芥醋者
又有食野鴨臙入木耳椎茸之類者呼名熬鳥
本草所謂鯽與芥菜同食成腫疾雞與生葱同食成蟲
痔然則雖急不有害好食之者甚不可
相傳蕎麥與西瓜同食煩悶多至死又鰻鱺浸醋乃鰻鱺
膨脹於腹中故使人煩悶也蓋西瓜似水而速降故先
西瓜後蕎麥則無害乎今人每炙鰻鱺合蓼醋食之亦
無害多食則必損人至死者有之

百草

本綱五月五日采百種草陰乾燒灰和石灰爲團煨研傳
金瘡止血亦傳犬咬又治腋臭及瘰癧已破各有
又取百草花煮汁釀酒服之治百病或采百草花水漬泥
封埋百日煎爲丸卒死者納口中卽活也

△按北鹿銜草以飴其牡蜘蛛齧羊以磨其腹虎中毒箭
 食清泥而解之野豬中毒箭脰薺花而食及見五朝野史
 蓋三獸之事未見之蜘蛛之所為予面見之犬中馬錢
 毒則吞水解之又蛇見蜥蜴之涎則避地不到又犬鼠
 共好油而見桐油則不敢近犬誤吞桐油物猶知藥與毒
 况於人乎

○寬永十四年十二月板倉卜齋請紀伊亞相望請藥草
 根并核實於朝鮮國見于羅山文集

- | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|--------------------------------|------|-----|-----|
| 薑黃 | 鬱金 | 薤 | 射干 | 升麻 | 防己 | 沙參 |
| 漏蘆 | 商陸 | 革薺 | 馬藺 | 常山 | 白微 | 丹參 |
| <small>以上十五種
要其根</small> | 天仙藤 | 白部根 | 劉寄奴草 | 佛耳草 | 五味子 | 藁薺子 |
| | 銀花胡 | 延胡索 | <small>以上二十一種
要其核實</small> | 白頭翁 | 石楠葉 | 蜀葵花 |
| | 藜蘆 | 胡黃連 | | 黃蜀葵花 | 菴蘭子 | 葶藶子 |
| | 續斷 | 山豆根 | | 前胡 | 蜜蒙花 | 何首烏 |
| | 烏頭 | | | | | |

山草類

甘草 かんさう

尾人參 ひげあんさん

羊角菜 ひょうかくさい

和沙參

桔梗 ききやう

萎蕤 いずい

草薢蓉 そうばよう

天麻 てんま

黃芪 わうぎ

和人參 わかんさん

躍草 えつそう

長松 ちやうそう

知母 ちも

鎖陽 さやう

蒼朮 そうじく

人參 かんさん

沙參 ささん

薺芫 さいわん

黃精 わうけい

肉蓯蓉 にくようよう

惠布里古 ゑふりこ

白朮 はくじく

狗脊けんせき

觀音草くわんおんそう

仙茅せんぼう

丹參たんさん

紫草しそう

伊波奈之いばな

貫衆くわんしゆ

遠志えんし

玄參げんさん

紫參しさん

白頭翁はくとうわう

ち

已戟天いげつてん

淫羊藿えんようくわく

地榆ぢゆ

王孫わうそん

山苻菜さんぷさい

和漢三才圖會卷第九十二之本


攝陽

城醫法橋寺島良安

尚順編

山草類

上卷



甘草

かんき

蜜甘

蜜草

美草

落草

靈通

國老

唐音

カンツアモウ

和名阿末木

其大美者
名粉草

本綱春生青苗枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙
濤似有白毛七月開紫花似柰冬結實作角如相思角作
一本生至熟時角折子扁如小豆極堅齒嚙不破根長者
三四尺粗細不定皮赤色上有橫梁梁下皆細根也以大
徑寸而結緊斷文者為佳謂之粉草其輕虛細小者不及

之安南國甘草大者如柱土人以架屋不識果然否也

氣味甘平氣薄味厚

可升可降陰中之陽也此草治七十二種

乳石毒解一千二百般草木毒調和衆藥有功故爲國

老經方少有用者猶如香中有沉香也凡使須去頭

尾尖處其頭尾吐人

苦參乾漆爲之使惡遠志及大戟荒花甘遂海藻

生用則氣平補脾胃不足而大瀉心火

炙用則氣溫補三焦元氣而散表寒除邪熱去咽痛

凡甘草性能緩急而又協和諸藥使之不爭故熟藥得

之緩其熱寒藥得之緩其寒寒熱相雜者用之得其平

凡中滿嘔吐酒客之病不可用甘草甘者令人中滿



△按甘草出於南京陝西河東山西者爲上皆稱之南京

甘草出於福州者細脆帶微苦味又細而如稍者俗謂

之藁手又大者名粉草俗謂之鞭手

往昔日本有甘草延喜式云陸奥出羽常陸每年貢之

如今絕不出雖希有而細硬不佳



黃耆

ヨウギ

黃耆

戴椹

戴椹

芰草

王孫

百本

耆長也色黃為諸藥之長故名

倭名夜波良

ゲンヌウ

本綱黃耆葉似槐葉而微尖小又似蒺藜葉而微闊大青白色開黃紫花大如槐花結小尖角長寸許根長二三尺以緊實如箭餘者為良嫩苗亦可煉淘茹食其子收之十月下種如種菜法亦可有數種

白水黃耆

赤水黃耆

綿黃耆

木黃耆

土黃耆

蓋白水赤水耆共陝西之鄉名綿耆出於山西沁州綿上故名或云用其皮折之柔軟如綿耆為良乃謂之綿黃耆木黃耆者短而理橫今人多以苜蓿根假之俗呼為土黃耆但堅而脆味苦冷入瘦黃耆柔而味甘冷入肥大異用者宜審木黃耆亦勿用

氣味甘微温氣

可升可降陰中陽也人參補中黃耆實

美藥中補益呼為羊肉其用有五補諸虛不足益元

木氣二壯脾胃三去肌熱四排膿止痛活血內托陰疽為

瘡家聖藥十五也元氣弱肥白而多汗者止之虛熱無汗

則發之防風能制黃耆黃耆得防風其功愈大乃相畏


相使也伏苓為之使惡

△按今藥肆不論出處好惡皆號綿黃芪售之但擇取切

口黃色柔韌者可用是亦經年者為堅實而不佳故新

渡者良又出於倭者名富士黃耆經久則堅脆味亦不

甘疑此首蓿根矣不堪用故令售者禁止也



人參

人參

人參

人參

海腹

神草

黃參

地精

鬼蓋

土精

皺面還丹

シシ

本綱人參爲藥切要與甘草同功有人參處上有些紫氣生
光星散而爲人參實神草也根有手足面目如人者爲神
生上黨今潞州也山谷及遼東高麗乃朝鮮也者爲最上春生苗多於
深山背陰近椒樹似桐大下濕潤處初生小者三四寸許一
椹五葉四五竿後生兩椹五葉未有花莖至十年後生三
椹年深者生四椹各五葉中心生一莖俗名之百尺杵三
四月有花細小如粟蕊如絲紫白色秋後結子或七八枚
如大豆生青熟紅自落

朝鮮人參猶來中國互市亦可收子於十月下種如種菜
法秋冬采者堅實春夏采者虛軟非地產虛實也僞者皆
以沙參、薺、茺、桔梗采根造作亂之沙參、薺、茺、體虛無心而味甘淡
桔梗體堅有心而味苦人參體實有心而甘微苦近有以人參先浸取汁自爇乃
晒乾復售謂之湯參不任用
人參生時背陽故頻見風日則易蛀納新器中入細辛與
參相間收之密封可經年不壞一法用淋過竈灰晒乾罐

收亦可

凡用時宜隔紙焙之熟用則氣溫生用則氣涼並忌鐵器伏苓爲之使

反藜蘆畏五靈脂惡皂莢黑豆人參可去蘆不去則令

得升麻則補上焦之元氣瀉肺中之火人參可去蘆者頭端莖之根

得茯苓則補下焦之元氣瀉腎中之火

得黃芪甘草則除大熱瀉陰火補元氣

得麥門冬則生脈得乾薑則補氣

凡血脫者用人參益氣則血自生藥品之聖也

△按人參可用不可用之病症本草諸家之辨論區區也

共不可偏執今時亦然焉一槩有泥其功不詳虛實而

動則人參多入用者稱之人參醫師

凡人面白或黃或青驚悸者皆脾肺腎不足可用也面

赤或黑者氣壯神強不可用也

凡脉之浮而芤濡虛大遲緩無力沉而遲瀋弱細結代

無力者皆虛而不足可用也若弦長緊實滑數有力者

皆火鬱內實不可用也蓋此說可以爲的據也

朝鮮人參

朝鮮北靺鞨南境有大山名白頭山自然生

人參爲最上其葉花與和人參相似而實異初青熟赤

圓如南天實其根似胡蘿蔔而白色使甘草汁蒸乾黃

色亦益其味頭邊有橫文體重實而中亦潤黃者爲上

經年者大愈佳似人形者亦百斤中有一二本此雖有

神而不甚佳出於咸鏡道者潤白透明爲極上最鮮

妙事人參

是亦白頭山之產出於靺鞨而未知修治良

方故功稍劣

蝦手人參

右同蓋靺鞨土地水不清毒多故其富像者

常浸人參於井中用其水更採出人參販之故帶餒色

而尾端曲似蝦形所謂湯人參之類乎

唐人參

即中華之產山西之潞安古之黨北京之永平雲

南之姚安共爲上而下種植成故功不如朝鮮自然生

者其大者俗呼曰唐大

小人參 非大人參中擇出者而本自一種小者其根長一二寸許猶嬰粟與美人草近年不來俗以尾人參稱小人參者非也

凡大人參老者則大而功勝嫩者小而力劣焉體輕虛色枯白者俗謂浮虛人參無効



尾人參

ヒゲあんどん

髭人參 俗稱

小人參 俗稱

自此一類果種以為大人參之髭細根者非也

△按尾人參朝鮮中華共有之蔓生而與人參一類果種者也高一二寸葉似人參而小蔓出於莖布地至處生根如草石蠶樣取其蔓根為藥纖者似革薛髭故名髭人參每唐船皆將來之稱小人參性堅實其功勝於大人參之浮虛者



和人參

わらんちん

人參

和名加乃仁
介久佐

一名久未乃伊

△和人參往昔本朝有之而中古不用之出於薩摩者名
小人參一名節近年得唐人參種多植園礪州平野庄
多出之二月下種初生一莖三葉及長數桮皆三葉其
葉厚潤有深刻而無筋畧似銀杏葉每八月中心抽一
莖高三四尺開細白花如葢似蒲薺及胡蘿蔔花秋後
結子細小亦似胡蘿蔔霜後枯宿根亦能生也九月採
根如胡蘿蔔而淡白色以甘草汁蒸乾則能類人參但
頭無橫文蘆頭不括縮耳功能亦不及故用者鮮
和列吉野山中有自然生者又有得真朝鮮參種植者
並其葉根與朝鮮不異然甚希而未足賣買



沙參

名參

白參 知母

羊乳 羊婆奶

虎鬚 苦心

鈴兒草

サクスイ

本綱沙參處處山原有之二月生苗其葉如初生小莖葉而圓扁不光八九月抽莖高二三尺莖上之葉則尖長如枸杞葉而小有細齒秋月葉間開小紫花長二三分狀如鈴鐸五出白蓋亦有白花者並結實大如冬青實中有細子霜後苗枯其根生沙地者長尺餘大一虎口黃土地者則短而小根莖皆有白汁八九月采者白而實春月采者微黃而虛小人亦往往繫蒸壓實以亂人參但體虛輕鬆味淡而短耳

氣味甘微苦 厥陰本經藥又為脾經氣分藥惡防己味微苦補陰甘則補陽故肺寒者用人參肺熱者用沙參

代人參

人參體重實專補脾胃元氣因而益肺與腎故內傷元氣者宜人參性溫補五臟之陽

沙參體輕虛專補肺氣因而益脾與腎故金能受火尅者宜沙參性寒補五臟之陰雖云補五臟亦須

借各臟之藥佐使相引而至也

△按沙參屈曲如卷細繩或有剝瀆防風皮卷成偽之或中裏偽者之類故繙亂而賣買故近年以來皆不卷屈



了之ん

羊角菜

羊妳科

合鉢兒

細絲藤

過路黃

今云弦人參
又云倭沙參

本綱沙參下陳藏器曰羊乳根如薺苳而圓大小如拳上有角節折之有白汁人取當薺苳苗作蔓折之有白汁農政全書云羊角菜生田野下濕地拖藤蔓而生莖色青白葉似馬兜鈴葉而長大又似山藥葉亦長大面青背頗白皆兩葉對生莖葉折之俱有白汁出葉間出蒲開五瓣小白花結角似羊角狀中有白穰其葉味甘微苦

△按羊乳即沙參之別名也然陳氏所謂羊乳乃羊角菜而倭沙參也以有蔓為蔓人參又名蔓人參和州河州信州處處山中有之蔓生其蔓葉共似初生薺苳及草薺葉八九月葉間開小白花亦有淡紫者形如鈴鐸根莖有白汁但宿根未經歲者則無花九十月採根斜殺之曬乾既乾則皮黃皺有橫文理如人參文尋常用之換人參最為沙參入用藥而有功嘗以為沙參之一類故代唐沙參者無異正代人參者不可也凡用人參也特可擇之如不能得朝鮮美者可使唐參也

尾人參勝於朝鮮唐參等浮腫者其次可用倭人參

とどりくさ 浴稱

躍草



△按本草時珍所謂沙參之形狀與此能合焉此草高尺許莖微赤色葉似小葵而兩兩對生三四月葉本開小花白色帶微赤狀似人著笠躍故俗為躍草其根細長

とひねい 菰花 杏參

杏葉沙參

薺花

白薺根

甜桔梗

ツイネ

苗名隱忍



本綱其苗似桔梗根似沙參故往往以沙參齋菴通亂入
參但齋菴春生苗苗高二三尺莖色青白葉似杏葉而小
微尖而背白邊有叉牙杪間開五瓣白罌子花根形如野
胡蘿蔔頗肥皮色灰黝中間白毛又有開碧花者
凡齋菴桔梗一類而甜苦二種也齋菴嫩苗味甘燥熟可
食桔梗苗苦不可食此其異也

氣味甘寒

能解百藥毒

乃良品也而世不知用惜哉與諸

毒藥共處毒皆自然解也虎中藥箭食青泥而解野豬
中藥箭既齋菴而食物猶知解毒何況人乎


△按齋菴

和名佐木久佐奈一名美乃波

出於河州金剛山者良紀州若

山次之藝州廣島又次之峠嶽及淺山中有之

根



ききき

白藥

梗草

薺花

桔梗

和名阿里乃比布木

あいのき
キツケ

今呼字音
不日名

本綱桔梗春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長隨三四葉對生又有差互者嫩時亦可煮食夏開小花紫碧色頗似牽牛花秋後結子其根如指大黃白色

本草本經桔梗與薺花為一物至別錄始出薺花條分為二物然其性味功用皆不同根有心者桔梗無心者薺花又苗苦者桔梗甜者薺花

氣味苦辛平味厚氣輕

陽中之陰升也入手太陰肺經氣分及

足少陰腎經

凡使須去頭上尖清肺氣利咽喉與甘草

同行為舟楫之劑如大黃苦泄峻下之藥欲引至胃中至高之分成功須用辛甘之劑升之譬如鐵石入江非

舟楫不載所以諸藥有此一味不能下沉也

此乃多子之藥也

△按桔梗山野及人家多種之苗叢生無枝梗其葉似杏

葉而楸也本草綱目作隋字誤背淡白有微毛自本至

末差互生葉間開碧花凡以紫碧者為桔梗之正色又

有白花者有紫白相間者有單葉有八重皆變於子種

初無枝梗剪折莖則生枝梗其葉對生者亦有

仙節

長松

其功如松脂及仙節故有二名



子松

本綱生山谷古松下其葉如松葉上有脂根色如薺刺花長

三五寸氣味類人參清香可愛山人服其葉云長年

氣味甘微能治大風惡疾眉髮墮落百骸腐潰每以一

兩入甘草少許水煎服旬日即愈



黃精

ハシツイ

龍術 仙人餘糧

米舖 重樓

垂珠 野生薑

菟竹 救窮草

黃芝 戊己芝

本綱黃精

又名雞格 又名鹿竹

山野皆有之子亦可種其葉似竹而

不尖或兩葉三葉四五葉俱對節而生莖梗柔脆本黃末

赤四月間青白花狀如小豆花結子白如黍粒亦有無子

者根如嫩生薑而黃色又其根橫行狀如蓼根俗采其苗

煨熟泡去苦味食之

名筆管菜 忌梅實

二八月采根九蒸九曝作

果黃黑色而甚甘美

氣味

甘平

補中

益氣除風濕安五臟久服輕身延年不

飢補五勞七傷

博物志云昔黃帝問天老曰天地所生有食之令人不死

者乎天老曰太陽之草名黃精食之可以長生太陰之草名鉤吻不可食之入口立死人信鉤吻殺人不信黃精之益壽不亦惑乎

△按黃精

和名於保惠美名夜末惠美

形狀華和相似而倭者味帶苦

出於河州金剛山者良江州高島郡者次之武州耶澤又次之

今所渡者多萎薹也藥肆取肥者為黃精瘦者為萎薹又云黃色節高者黃精黃白色節低者萎薹也

救荒本草

倭



萎薹

葳薹

萎薹

女萎

萎薹

萎薹

萎薹

五竹

地節

三才圖會

ヲイスイ

和名惠美久佐一云阿未奈



本綱萎薹山中有之莖幹強直似竹箭幹有節其葉如竹兩兩相值表白裏青三月開青花結圓實其根橫行似黃

精差小黃白色性柔多鬚最難燥嫩葉及根可煮陶食
氣味甘平能外能降陽中陰也補中益氣止消渴潤心

肺補五勞七傷虛損腰脚疼痛目痛皆爛淚出

黃精萎糲二物功用大抵相近而萎糲之功更勝則二

物雖通用亦可

△按萎糲河州金剛山之產其莖帶紫色葉似竹而厚
脊不對生而向上花如風鈴狀白色本末帶青結子



知母

ラヒ

ツロモリ

知母 貨母

連母 地參

蜚母 花藩

水參 若心

兒草 薺音

本綱知母生處處山上形似薺蒲而柔潤葉如韭至難乾
掘出隨生須枯燥乃止四月開青花如韭花八月結實實
根之旁初生子根形如蜚蠊之狀故名蜚母訛為知母

氣味辛苦寒氣

味共厚

沉而降陰也腎經本藥入足陽明手太

陰其用有四瀉無根之腎火一療有汗之骨蒸二止虛


勞之熱三滋化源之陰四也下則潤腎燥而滋陰上則

清肺金而瀉火乃二經氣分藥也上行則瀉下行則清

黃柏良忌鐵黃柏則是腎經血分藥故二藥必相須而

行譬之蝦與水母必相依附

△按知母和名夜其葉忌入手鱗也花如穗而淡紫色



肉菰蓉

肉松密
黑司命

ジヨツラニヨシ

本綱肉菰蓉生河西陝西及鴈門是野馬精落地所生也

生時似肉三四片掘根長尺餘切取中央好者三四寸繩

穿陰乾皮有松子鱗甲震亨疑之曰或云大水間及土墜

垣中多生乃知自有種類爾或疑其初生於馬廐後乃滋殖如茜根生於人血之類是也

氣味甘微溫強陰益精氣命門相火不足者以此補之乃

腎經血分藥也蓋真者罕得人多以金蓮根或嫩松稍

鹽潤偽之又以草蓂蓂充之用者宜審

△按肉蓂蓂鹽漬來有如鱗甲者其真偽難辨



草蓂蓂

花蓂蓂

列當 栗當

ツアウ ツラン ヨシ

本綱草蓂蓂原州秦州渭州靈州皆有之生巖石上暮春抽苗莖圓白色其根與肉蓂蓂相類刮去花壓扁代肉蓂

蓂功力殊劣

氣味甘溫

男子五勞七傷及陽事不興者良令人有子

さやう

鎖陽




ソトヤン

本綱鎖陽生肅州生韃靼田野馬或蛟龍遺精久之發
起如笋上豐下儉鱗甲櫛比筋脉連絡絕類男陽中肉莖
落之類或謂里之淫婦就而合之得陰氣勃然怒長土
人掘取洗滌去皮薄切晒乾以為藥功力百倍於莖莖也
疑此自有種類如肉莖莖列當亦未必盡是遺精所生也
氣味甘溫
大補陰氣益精血利大便者勿服

阿加須止字
天禮面低古

惠布里古

てきあんてん



△按惠布里古生韃靼地其處名加良不止高麗名北嶺夷島之北界也生沙濱中如鎖陽之類為大塊外灰白內白色似茯苓而不濃如枯菌理其味苦蝦夷松前人傳曰積聚疝氣一切腰痛等不用諸藥止用此皆愈也然虛弱人宜斟酌

てんま

天麻

テンマ

赤箭獨搖芝
離母赤箭芝
神草合離草
定風草
鬼督卿

羊角形



瓜形



本綱春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三四尺如筍
箨狀青赤色莖中空依半以上貼莖微有尖小葉稍頭生
成穗開花葉赤色遠看如箭有羽四月開花結實如豆粒
大枝作五六枝中有肉如麴日暴則枯萎其子名還筒子
至夏不落却透塵入莖中落生土內

其根皮肉汁大類天門冬惟無心脉爾去根五六寸有十
餘子衡之似芋其根暴乾肉色堅白如羊角俗呼羊角夫
麻葉過黃皺如乾瓜者俗呼醬瓜天麻皆可用形尖而空
薄如玄參狀不堪用本草必讀云皮黃白肉明亮者佳其羊角夫麻不堪用
氣味甘暖

肝經氣分之藥肝虛不足者宜天麻川芎以

補之其用有四治大人風熱頭痛一治小兒風癇驚悸

二治諸風麻痺不仁三治風熱語言不遂四為治風之

神藥故名定風草須別藥相佐使然後見其功

△按赤箭和名乎止乎止之一乃天麻也出武州則澤者

良藝州廣島次之倭天麻者一莖一花而無枝葉為



蒼木

くさぐさ

赤木

仙木

山薊

山精

ツアシチツ

本綱昔人止稱木不分蒼白自宋以來始分之處處山中
有之茅山嵩山者為佳苗高二三尺其葉抱莖而生稍間
葉似棠梨葉其脚下葉有三五又皆有鋸齒小刺嫩葉可
茹夏開花淡紫碧色似刺薊花或有黃白色者入伏後結
子至秋而苗枯根如老薑之狀旁有細根蒼黑色肉黃白
色有油膏

陰中陽

蒼木

細無根

如老薑而膏多

氣味

甘辛烈溫而燥

白木

大有根

如鼓鼙而膏少

陽中陰

共可外可降防風地榆為之使
忌桃李菰菜
雀肉青魚

蒼木入足太陰陽明太陽五經治濕上中下皆有可用總

解諸鬱凡補中除濕力不及白木寬中發汗功過白木

又能除惡氣強災疹今病疫及歲且人家往往燒蒼木

以辟邪氣凡用時以米泔浸去其油

按中華之二木一類二種自明也倭之二木一物而宿

根如老薑蒼色者為蒼木嫩根白色者為白木然藥肆

皆誤以舊根稱白木以嫩根稱蒼木或蒼白相混不可

不擇其苗高一二尺一朶三葉葉末鋸齒而有毛四五

月開花青色秋結子大如小豆蓋生山中者葉硬有微

刺栽人家者葉軟無刺其葉及根形香氣和漢相似而

花色異且白木根形不似鼓槌然唯似謂雲頭木者耳



出備後三原者良伊豫今治次之武州江戶藝州廣島

與州仙臺者又次之

狗頭木

欽木

雲頭木



白木

びやうぶ

楊抱音山薑

馬薊

山薑

山連

抱薊

吃力伽城

和名平介良

ベツチツ

本綱白木

與蒼木

一類

二種

而其草作

極葉大

於蒼木

而有

毛根如柏

大狀似抱

抱之乃鼓

但花實無異

白木

陽明少陰

厥陰

六經

除濕益燥

和中補氣

其

用有九

溫中

一去脾胃

中濕

二除胃中

熱

三強脾胃

進

飲食

和胃生津

液

止肌熱

六四肢困倦

嗜臥

目不

能開

不思飲食

止渴

安胎

凡中焦受濕

下利者

必須白木

以逐水

益脾

非白木

不能去濕

非枳實

不能

消痞

故枳木

凡以之

為君

浙木

俗名雲

種平壤

頗肥大

由糞力

也易潤

油其大

如拳

剖開暴乾

謂之別木

亦曰

不佳

○欒木 俗名狗頭木

雖瘦小得土氣充也甚燥白勝于浙木

△按唐白木多如鼓鼹者為佳近年有川白木者即是削

木而所切片者不佳蓋古倭亦不分二木一類乎介良

石所圖者梗本草必讀之繪然圖與名義辨有齟齬焉

京師五糸天神每除夜群集祈除疫社前有賣白木者

皆求之去焉本草言歲旦服蒼木之事與此合

萬葉 系一及種々しむしゆのけらう原ふ

倭狗脊 初生芽



狗脊

じんぎん

強脊 扶筋

百枝 狗脊

俗云世牟末以

ケウスイ

本綱狗脊生山野其苗尖細碎青色高一尺以來其莖細而葉花共兩兩對生正似大葉蕨比貫眾葉有齒回背背

光其根黑色長三四寸多岐似狗之脊骨大有兩指許肉青綠色一云無花但有一二種

一種根黑色如狗脊骨 一種有金黃毛如狗形共入藥

氣味微苦

治男女腰膝脚弱或痛者利老人最堅脊利


俛仰草薺爲之使

惡敗醬

病後足腫者煎湯漬洗

△按狗脊生溪山中春月生莖如蔽而一莖無根莖末卷葉似握拳狀而小嫩莖荊取晒乾用時灑漬水一宿去苦味再煮食之淡甘脆美也羽列秋田同最上之產佳既長則葉有鋸齒似貫衆而厚面背光兩兩對生附葉生細小花老則莖褐色如漆塗筋而長三四尺其根多毛但金毛狗形者希矣用藥則金剛山之產良一種有大葉者俗呼曰兔狗脊嫩芽亦不堪食凡狗脊貫衆之圖所出三才圖會而狗脊有二圖共其形狀不似但本草綱目集解和漢無異耳

黑鬚若人家園中植之不育實山草也齒來穗長裏白
 之名皆提形狀以飾元且嘉祝之物蓋取長生不老之
 義乎一種有石長生カクシカクシ良草加豆倍形似貫衆見石草類



巴戟天

和名夜來比々良木

三蔓草

ハバキツテン

不凋草

本綱巴戟夫蜀中之產最佳多生山林內葉似茗經冬不
 枯內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實根如念珠有
 小孔堅硬但本有心乾縮時偶自落或抽去故中心空非
 自有小孔也又以紫色者為良而無紫色者采時或用黑
 豆同煮欲其色紫殊失氣味尤宜辨之又云括巴戟
 氣味辛甘微溫腎經血分藥強筋骨益精安五臟虛損病人
 加而用之覆盆子為之使惡丹參

有一種山葎根正似巴戟但色白土人采得以醋水煮之乃以雜巴戟莫能辨也但擊破視之中紫而鮮紫者偽也其中雖紫又有微白參有粉色而理小暗者真也

△按巴戟天佳昔有出於本朝今乃無之皆用唐藥也多連珠者佳俗名數珠巴戟其葉如茗也如麥門冬也其異大也三才圖會之圖亦出二種雖謂山林人家之異未審



觀音草


名義未詳

△按觀音草葉似蘭葉而狹短又似石菖蒲葉而無劍脊深青色四時不凋六月抽莖著小花作穗淡紫色蓓蕾可愛京師中元日用莖葉縛蓮飯蓋取觀音之名義乎

一種有白花者 是乃變於實生者也俗以為琉球風蘭
愛其異稱之耳



根



大葉

小葉

遠志

苗名小草
蔓繞 棘莖
細草

ユエシツウ

本綱遠志生山谷有大葉小葉二種莖葉似大青而小者
其花紅是大葉也狀似麻黃而三月開白花者是小葉也
根形如蒿根而黃色長者及一尺去心取皮一斤止得三
兩如不去心則令人煩悶
氣味 苦溫
入足少陰腎經其功強志益精治善忘
蓋精與志皆腎經之所藏也腎精不足則志氣衰不能
上通于心故迷惑善忘也能益智強志故名遠志
得茯苓龍骨良畏珍珠菰蘆



淫羊藿

レヤク

仙靈脾 枝草

葉枝草 千兩金

氣難筋 黃連祖

三枝九葉草

イシヤツホツ

剛前

本細淫羊藿生大山中一根數莖其莖粗如線高一二尺
 一莖二桎一桎三葉其葉長二三寸如杏葉及豆藿面光
 背淡甚薄而細齒有微刺經冬不凋四月開白花亦有紫
 花者碎小獨頭子五月采葉晒乾根紫色有鬚似黃連
 氣味氣溫能益精氣堅筋骨三焦命門藥真陽不足者
 宜之久服使人好為陰陽有子嘗有淫羊一日百遍合
 蓋食此藿故名

△按淫羊藿

和名宇無木奈二云夜未止里久佐

出丹波船井郡山中形狀

和漢無異但唐者莖中虛倭者中實

根



仙茅

セシム

スエンミ

獨茅茅九子
婆羅門參

本細仙茅生大山中葉青如茅而軟且畧潤面有縱文又似初生椶櫚秧高尺許至冬盡枯春初乃生四五月中抽莖四五寸開小花六出不結實其根獨莖而直大如小指下有短細肉根相附外皮稍粗褐色內肉黃白色此草始因西域婆羅門僧獻方於唐玄宗故呼為婆羅門參言其功補如人參也

氣味

辛溫有毒

治風冷癱痺不能行益陽道苦虛補三焦命

門之藥惟陽弱精寒稟賦素怯者宜之若體壯相火熾盛者服之反能動火中其毒舌脹出口至死

忌鐵器及牛乳

本草綱目卷之六 玄參 鹿腸 玄臺

根



玄參

げんごん 黑參 玄臺

正馬 逐馬

馥草 鬼藏

ヒシスシ 野脂麻

本綱玄參二月生苗葉似脂麻對生又如槐柳而尖長有鋸齒細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色又有白花者莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺其根一根五七枚有腥氣生青白乾即紫黑色宿根多地蠶食之故其中空

氣味苦微寒 足少陰腎經君藥治胃中氣氲之氣無根之

火亢腎水受傷真陰失守孤陽無根發為火病者宜壯

承以制火故玄參與地黃同功治鼻中生瘡者玄參末


塗之惡黃乾薑大棗山茱萸反藜蘆

按玄參和久往昔有出於本朝今乃無之皆用

擇之柔而中黑者佳堅而中帶赤者不佳

王鼓 酸補

根



地榆

和名阿夜女大無

三云衣比須弥

俗云

ニイイイ

本綱地榆處處平原川澤皆有之宿根三月內生苗初生布地獨莖直上高三四尺對分出葉其葉似榆葉而稍狹細長似鋸齒狀青色七月開花如槵子紫黑色根外黑裏紅似柳根其根燒作灰能爛石故煮石方用之又名時采其葉作飲亦好又可燒茹

根氣味

微苦酸微寒氣味共補

沉而降陰中陽也除下焦熱治大

小便血證止血取上截切片炒用其梢則能行血

若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使惡寒閉冬治代指

腫痛單煮地榆作湯漬之半日愈

△按地榆多用後出金剛山者良高一二尺葉似小梅葉而小夏開花紫色千瓣圓似楊梅及千日紅狀



丹參

赤參 郁釐草 逐馬木半乳 山參 奔馬草

タニシ

本綱丹參生山中二月生苗高一尺許莖方有稜青色一枝五葉葉如野蘇而尖青色有皺毛二三月至九月開小花成穗紅紫色如蛾形中有細子根皮丹而肉紫大者如指長尺餘一苗數根

此乃五參之一而五參配五臟人參入脾黃參沙參入肺玄參入腎牡蒙紫參丹參入心其苦參則右腎命門之藥也古人捨紫參而稱苦參未達此義爾

丹參氣味苦微

平而降陰中陽入手少陰厥陰之經心

與包絡血分藥也四物湯治婦人病不問產前產後經

水多少皆可通用惟一味丹參散主治與之相同能破

宿血補新血安生胎落死胎止崩中帶下調經脈其功

大類四物當歸川芎地黃芍藥故也蓋久服多服赤故應性熱其

云微寒恐謬也反畏鹹水△按丹參性昔本朝亦有之今則無之蓋調血之良藥古

方多用之今用之者罕

根



紫參

五鳥花

ろふん

牡蒙 衆戎

馬行 童腸

ツクスエン

和名知とろ波佐

本綱紫參苗長一二尺莖青而細其葉青似槐葉亦有似
羊蹄者五月開花白色似蔥花亦有紅紫而似水紅者其

本草綱目卷之二十一 王孫

根乾時紫黑色肉帶紅白狀如小紫草

氣味苦寒

入足厥陰肝臟血分藥故治諸血病及寒熱瘧痢癰腫積塊之屬厥陰者畏辛平



王孫

ぬいりく

牡蒙 黃原孫

黃昏 里葛

和名沼波利文佐

又云王知波利

ワスラン

本綱王孫生山中其葉生顛頂似紫河車葉又似及已而

大根長八餘皮肉亦紫色

牡蒙與紫參同名也黃昏與合歡木同名但古方所

用牡蒙皆為紫參後人所所用牡蒙乃王孫非紫參也不可

不辨

氣味苦平

療百疾補虛益氣主五臟邪氣寒濕痺四肢

痠疼膝冷痢疾金瘡破血生肌止痛

△按王孫丹參紫參皆有和名則往昔本朝有之明焉今

無識者惜哉特無毒之草而療病之功最大也然亦方藥中用之者希也

根



紫草

ひしこく

紫丹 紫芙

茈藁 地血

藐音 鴉街草

ツワツアウ

和名無良佐木

本綱紫草生山谷人家亦種之根紫色而可以染紫其苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白色結實白色秋月熟種之法三月逐壟下子九月子熟時刈草春社前後采根陰乾其根頭有白毛如茸未花時采則根色鮮明花過時采則根色黯惡采時以石壓扁曝乾收時忌人溺及驢馬糞並烟氣皆令草黃色

根氣味甘鹹寒 古方稀用今醫家多用入心包絡及肝經血分其功長於涼血活血利大小腸故痘疹欲出未出

血熱毒盛大便閉澇者宜用之已出而紫黑便閉者亦
可用得木香白木佐之尤為有益
 若已出而紅活及白陷木便利者
 切不可忌之

△按紫草出於薩州者最佳奧州津輕羽州秋田遠州中

泉豫州大洲河州山田皆良但家種者不入藥用蓋鑿


方雖曰紫草可用根若謂紫草草則可用嫩苗葉

漆絹帛用紫根煎汁深之浸杓木灰汁

一方用蘓方木煎汁入綠礬少許深之浸杓木灰汁成

名之厲買紫經年色變ス

本草 紫草 葉 紫草 葉 紫草 葉



白頭翁

奈何草

胡主使者 野文人

和名於木奈各佐
 一二云奈加久佐

ハツテウラヒ

本綱白頭翁生山谷及田野正月生苗作叢生狀似白微而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細毛而不滑澤近根有白茸狀似白頭老翁根紫色深如蔓菁其苗有風則靜無風而搖與赤箭及獨活同

根氣味苦溫氣厚味薄可外可降陰中陽也熱毒下痢紫血鮮

血者宜之

△按白頭翁今無識者別有翁草與此不同見干濕草之下



山芥菜

俗云草牡丹

救荒本草云山芥菜生山野間苗高一尺餘葉似野蜀葵葉稍大而有五叉又似地牡丹葉亦太葉中攏生莖又稍結刺毬如鼠粘子刺毬而小開花黥白色葉味甘

△按草牡丹^ハ高^ハ一丈葉畧似牡丹四月開白花似芍藥而單葉稍小



伊波奈之

いばな

△按伊波奈之江列三井寺山中有之苗高^ハ二三寸葉大如^ニ飄樹葉而不尖^カ揚地生^ス二月開小白花似虎耳草花三月結子^ヲ如青大豆而圓數顆攢生如楊梅據裹於葉^ハ交^ニ外色青內紫黑色小兒剥皮食^ハ味微酸耳



本居

總

八一
六九



奎
總

八一
六九

九 十 二 之 末

山草類

地
樓漢三才圖會



李
總

八一
六九

AE
4
T4
1824
V. 92:2

和漢三才圖會卷第九十二之末目錄

山草類 下卷

白及

ちりん

胡黃連

秦艽

防風

升麻

延胡索

玄胡索

三七

當藥

柴胡

獨活

苦參

貝母

えんぐり

きんぎょ

くら

黃連


黃芩

前胡

土當歸

白鮮皮

山慈姑



石蒜 いぶき

白茅 しらぼう

茅花

香茅 たすけ

龍膽 りゅうたん

及已 いっし

白微 しらび

百兩金 ひゃくらうこん

罷草 いさくさ

鐵色箭 てつしきせん

菅茅 くさぼう

芒 すすき

細辛 こしじん

鬼督郵 きとくゆう

白前 しらぜん

紅葶花 こうていか

紫陽花 むらさきざわ

水仙 すいせん

黃茅 わうぼう

絲芒 しぼう

杜衡 とけい

徐長卿 じやうちやうけい

草犀 そうし

唐松草 たうそうそう

繡線菊 しゅうせんぎく

女郎花

元日草

歪頭菜

舌頭菜

尖刀兒草

佛指甲

珍珠菜

山葱

刈萱

夾竹桃

紫雲菜

螺壓黑兒

山裏果兒

拐棗

木桃兒

羽子伊草

箱根草

草尾

匙頭菜

鯽魚鱗草

惠連牟草

風輪菜

金剛刺

山神錫杖

岐良卒草

野馬鬣

山精

金匱

木賊

金匱

補骨脂

牡蠣

風濕

決明子

山藥

遠志

赤芍

地黃

續斷

天麻

交加

草

天麻

交加

草

天麻

交加

草

和漢三才圖會卷九十二之末

攝陽 城醫法橋寺島良安 尚順編

山草 下卷



白及

白給 甘根
連及草

金光明經謂之
因達羅喝悉多

ベツキツ

俗云紫蘭
又云紫蘭

本綱白及生山谷葉似初生檉苗葉及藜蘆三四月抽一
莖開花長寸許紅紫色中心如舌十月實熟黃黑色冬凋
其根如菱有三角白色連及而生角頭生芽有臍如鳧趾
之臍又如扁扁螺紋性難乾
氣味 苦甘微寒性瀉
陽中陰能入肺止血生肌治瘡反為頭

鼻衄不止

津調白及末塗山根上

湯火傷

白及末油

打跌骨折

酒調白及末二錢服其

輒裂

白及末水調

△按白及俗云紫蔥也

其花紅紫色初蒼時如筆頭及樞

子形既開時如蘭花而中心有舌



根



三七

さんしち

山漆金不换

さんしち

本綱三七春生苗夏高三四尺葉似菊艾而勁厚有波尖
莖有赤稜夏秋開黃花蕊如金絲盤結可愛而氣不香花
乾則吐絮如苦蕒根葉味苦云是三七一而根大如牛蒡
根與南中來者不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍又其根
有黃黑色團結者狀畧似白及根長者如老乾地黃有節

頗似人參之味或云試法以末摻猪血中血化為水者乃
真用之合金瘡如漆粘物故名山漆又云其葉左三右四
故名蓋恐不然

氣味甘微苦 陽明厥陰血分之藥故能治一切血病與

騏驎竭紫鍾黃金之美者也相同近時始出南人軍中為金瘡

要藥云有奇功凡折撲傷損漆血淋漓者隨即嚼爛

之即止青腫者即消散若受杖時先服一二錢則血不

衝心杖後宜服之產後服亦良葉同功

吐血衄血山漆根一錢 赤痢血痢山漆三錢研末米

大腸下血婦人血崩三七研末調淡酒亦可也

男婦赤眼十分重者以山漆磨汁塗四圍甚妙 無名癰腫醋調塗即散

△按三七血分之藥人皆所識也又養金魚如將死時採

山漆葉入汁於魚口即活故魚也僥必植之無名瘡

搗葉敷之

本草綱目卷之九 山草 卷九 黃連

王連 支連

黃連

和名夏末久佐



ハシ

本綱黃連苗似茶叢生一莖生三葉高尺許凌冬不凋四月開黃色花六月結實似芥子色亦黃根連珠而色黃九節堅重相擊有聲者為勝漢末取蜀郡黃肥而堅者為善唐時不同如此太抵有二種

一種根粗無毛有珠如鴈雞卵形而堅實色深黃

一種根多毛而無珠中虛黃色稍淡各有所宜

氣味苦寒氣可并可降陰中陽入手少陰心經為治火

之主藥有君火相火之說其實一氣而已

治心臟之火則生用治肝膽之實火則以酒炒

治肝膽之虛火則以醋炒治上焦之火則以酒炒

治中焦之火則鹽水或朴硝炒

治氣分濕熱之火則茶燒湯炒

治食積之火則以土炒黃諸法不獨為之引導

其用有六瀉心臟火去中焦濕熱諸瘡必用去風

濕四治赤眼暴發五止中部見血六

黃連治痢為君藥然如氣實初病熱多血痢服之便止不

必盡劑虛而冷者慎勿輕用

黃芩龍骨為之使惡菊花生參白鮮中藥花白僵蠶畏款冬牛膝勝烏頭解巴豆毒

△按黃連出賀州金澤者最良越前者次之俗呼日蝦黃連佐渡越後奧州羽州因州信州皆次之

割孤露澤

根



胡黃連

フウハシレニ

本綱胡黃連出波斯國生海畔陸地今南方亦有之其性
味刃用似黃連初生似蘆乾則似楊柳枯枝心黑外黃折
之塵出如煙者乃為真其根頭似鳥嘴折之內似鸚鵡眼
者良


氣味 苦寒

主傷寒咳嗽發熱大小便赤如血補肝膽明

目理腰腎主兒疳痢鎮癰驚

惡菊花玄參白鮮皮解已
豆毒忌猪肉令人漏精

△按倭用當藥充胡黃連形狀大異不可以類也故令禁
稱胡黃連



當藥

そうや

正字未詳

俗云世年不利

たんざり

△按當藥播州三木郡多有之苗高五六寸一根數莖其
莖細而淡紫色葉似地膚草而小七月開花形似桔


花而小色黃有無花者根細長黃色

氣味大苦寒


倭方九散諸蟲積聚藥入用或有代胡黃連

用之者不可今人用深兒衫衣黃色也云能避蚤虱


條芩



片芩



枯芩



黃芩

コウキン

ハシキン

腐腸 空腸

內虛 妬婦

經芩 黃文

印頭 苦督郵

本綱黃芩川蜀河東陝西多有之苗長尺餘莖幹粗如筋葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根如知母粗細長四五寸氣味微苦而甘涼

其用有九瀉肺熱去上焦皮膚風熱風濕去諸熱

三利胸中氣消痰膈除脾經諸濕夏月頂用

婦人產後養陰退陽安胎酒炒上行主上部積血

非此不能除下痢膿血腹痛後重身熱久不能止者與
 芍藥甘草同用之凡諸瘡痛不可忍者可忍宜芍連苦寒之
 藥也 山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆
 得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蠣有子人得黃芪白欬赤
 小豆療鼠瘻得柴胡退寒熱得桑白皮瀉肺火得白朮胎安
 ○宿苓又云片苓腐腸 舊根多中空外黃內黑謂之宿苓瀉肺
 火利氣消痰除風熱清肌表之熱
 ○條苓又云子苓 新根多內實謂之條苓瀉太腸火養陰退
 陽補膀胱寒水滋其化源



秦艽

こんぎやう

秦艽

秦艽


ツインキセウ

本名都加里久佐
 一云波加里久散

本綱秦艽生山谷其根土黃色而相交斜長一尺以來粗細不等枝幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如高荳葉六月中開花紫色似葛花當月結子其根羅紋相交者佳氣味微苦陰中微陽可升可降入手陽明經兼入肝膽故手足不遂黃疸煩渴之病瀉之取其去陽明之濕熱也陽明有濕則身體酸疼煩熱也葛蒲為之使△按秦艽往昔本朝亦有之今乃無



山柴胡



銀柴胡



茈胡

同紫

地黃 芸蒿

山菜 茹草

和名乃世利
又云阿末安
加奈

本綱柴胡二月生苗甚香莖青紫堅硬微有細線葉似梓葉而稍緊小七月開黃花根淡赤色似前胡而強生丹州者結青子與他處者不類其苗有數品如竹葉者為勝如

非葉者次之如和蒿者最下也

銀州之產長尺餘而微白且軟不易得謂之銀柴胡為最上銀州即今延安府神木縣

北地之產亦如前胡而軟入藥亦良謂之北柴胡

南土之產不似前胡正如蒿根強硬不堪使用近時有

一種根似桔梗沙參白色而大以偽充銀柴胡不可用

氣味苦微寒陽也升也手足少陽厥陰四經藥也

行手足少陽以黃芩為佐在臟主血在經主氣欬上升

行手足厥陰以黃連為佐則用根以酒浸欲中及下降則用梢

治傷寒寒熱為最要之藥傷寒外亦諸有熱則加之無熱

則不加也又能引胃氣上行又諸癰以柴胡為君婦人



產後血熱必用之勿令犯火便無効半夏為之使

△按柴胡倭亦有錄倉河原之二種以錄倉柴胡為最上

唐人亦求之美稱

錄倉柴胡根縮短長者二寸許淡赤色本相州之產而

今多出於武陽者良日向薩摩肥後之產次之
 河原柴胡根稍長四五寸許紫赤色出於豐州白木者
 良阿波備前安藝紀伊能登佐渡越後次之但赤紫者
 為上純紫者次之淡白者為下



前胡

俗云美都波多佐

ムシフク

ツミフク

ぜんご

前胡

本綱前胡生下濕地有數種春生苗高一二尺青白色似
 斜蒿葉如野菊而細瘦嫩時可食秋月開黧白花類蛇床
 子花根皮黑肉白有香氣為真大抵北地者為勝故稱北
 野蒿根甚相似而味粗酸苦誤用之令人反胃不受食
 氣味苦微寒又陽中之陰降也乃手足太陰陽明之藥
 能下氣故治痰熱喘嗽痞膈嘔逆諸疾氣下則火降痰

亦降矣所以有推陳致新之績為痰氣要藥此與紫胡

治證雖同而所入所主則異以半夏為使 惡皂莢

△按前胡味始其倭漢形狀氣味有異同蓋漢之前胡亦

有數種則其中異種者乎和州金剛山之產為上防州

及藝州廣島備中平福之產次之苗高一二尺葉似桑

葉而無鋸齒兩兩對生八九月開黃花似旋覆花有白

花者並十月結實有稜似牽牛子黑色

東防風



石防風



防風

いふ

銅芸 回芸

蘭根 百枝

屏風 回草

百蜚

和名波萬須加 又云波萬仁加奈

本綱防風其莖葉俱青綠色莖澁而葉淡似青蒿而短小

春初嫩時紫紅色作菜茹五月開細白花中心攢聚作太

房似薔薇花實似胡荽子而大根土黃色與蜀葵根相類

石防風 珊瑚名珊瑚

生山石之間二月采嫩苗作菜辛甘而

香五月開白花根如蒿根而黃粗醜此乃防風一種也

氣味甘溫氣味俱薄

浮而升陽也手足太陽經之本藥治風通

用身半已上風邪用身身半已下風邪用稍治風去濕

之仙藥也風能勝濕故爾又云防風治一身盡痛乃卑

賤之職隨所引而至乃風藥中潤劑也若補脾胃非此

引用不能行

防風能制黃芪黃芪得防風其功愈大乃相畏而相使

者也得葱白能行周身得澤瀉藁本療風

凡使以黃色而潤者為佳白者不佳又頭者令人發狂

又尾者發人痼疾惡藜蘆白欬乾薑荒花畏革薢殺附子毒

△按防風初生葉形類老芥葉而淡綠一莖二三葉其莖

赤紫相抱生稍長葉圓尖有鋸齒而深青色其嫩時和

醋未醬茹之極爽口五月開花結子其花實如上說其

根入藥有削防風瀆防風二種猶唐之東防風石防風之二種

濱防風者細而微黃色ホソグサ為勝雲州ホソグサ若州最佳日向因
播次之遠列參列海濱沙地甚多有濱防風之
削防風者太而白色為次豫州之產為上日向及五島之
產次之



獨活

羌活 長生草
羌青 獨搖草
護羌使者
胡王使者

トツホ

和名宇止
一云豆知多良

本綱獨活羌活一物二種也正如川芎撫芎白朮蒼朮之
義入用藥微有不同春生苗葉如青麻六月開花作叢或
黃或紫結實時葉黃者是夾石土所生葉青者是土脉中
所生此草得風不搖無風自動故有獨活獨搖之名
古方但用獨活無羌活今方俱用以紫色而節密者為羌
活黃色而作塊虛大者為獨活今人用土當歸充獨活不

可不辨土當歸白肉黑皮氣

獨活微溫甘苦

此與細辛同用氣味俱薄浮外陽也

足少陰行經氣藥也

羌活性溫辛苦

此與川芎同用

羌活

主治

足太陽風濕相搏頭痛肢節痛一身盡痛者足少陰伏風頭痛兩足濕痺不能動止者

獨活

△

按獨活

二三月生苗似蘆荀而有節有短毛青碧色而

紫黃白微斑且有小點謂之獨活芽為蔬和酸茹之香

美可賞既長高四五尺一桠五葉有細鋸齒面背皆有

細毛六月開白花作叢婆娑如絲毛秋結實以根上近

莖帶紫處為羌活以根株塊而黃色處為獨活如白木

蒼朮之分別蓋花形色倭漢不同今將來之羌活間有

無節者是疑土當歸矣止擇用倭羌獨可也備中平福

之產佳藝州廣島者次之羽列最上獨活藥有長二二

尺者太柔可食總關東之產太長畿內之產僅五七寸

一種有削菴活久氣味不可用

土當歸

佐波字

本綱土當歸根長近尺許白肉黑皮氣亦芬香如白芷氣人亦謂之水白芷用充獨活解散亦或用之

△按此俗云澤獨活

都管草 生田野苗高一尺許葉似土當歸有重臺根似

菴活頭歲長有節按歲音正歲裏不正



升麻

周麻

和名止里乃阿之佐
云字太加久佐

本綱升麻春生苗高二尺以來葉似麻葉並青色四五月着花似粟穗白色六月以後結實黑色根如蒿根紫黑色

多鬚今人取裏白外黑而緊實者謂之鬼臉升麻蓋其葉

似麻其性上升故名升麻

氣味甘苦微寒

浮升陽也為足陽明大陰引經的藥得

葱白白芷亦入手陽明太陰引石膏止陽明齒痛人參

黃芪非此引之不能上行得柴胡引生發之氣上行得

葛根能發陽明之汗升麻葛根湯乃陽明發散藥若初病太陽證便服之發動其汗必傳

和於陽明反其害也

其用有四手足陽明引經也升陽氣於至陰之下也去

至高之上及皮膚風邪也治陽明頭痛也

△升麻和漢同而甜味微但葉似榆而長有微毛為異耳

河州金剛山者良備中平福豐前中津之產次之



苦參

くちん

苦識

苦骨

地槐

水槐

菟槐

驕槐

野槐

白莖

クウ スエン

和名久良今云末比里久左

本綱苦參生山谷田野其根黃色長五七寸許兩指粗細

三五莖並生苗高三四尺以來葉碎青色極似槐葉春生

冬凋其花黃白色七八月結實作角如蘿蔔子角內有子

二三粒如小豆而堅又有無花子者

氣味寒苦

氣沉純陰足少陰腎經君藥也最治風熱瘡

疹除心腹結破癥瘕殺疳蟲惡貝母及絲漏蘆伏承反藜蘆制雖黃煇硝

凡苦參黃蘗之苦寒皆能補腎惟腎水弱而相火勝者

用之宜若火衰精冷真元不足及年高之人不可用也

△按苦參形狀和漢同而丹波之產最良淡州豫州今治

藝州廣島次之帶黑色者不可



本草必讀所圖

三才圖會



ペツスエンヒイ

くさんび 白朮 白羊鮮

金雀兒椒

白鮮皮

地羊鮮

和名比豆之文佐

本綱白鮮其苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月
 開花淡紫色似小蜀葵花根似小蔓菁皮黃白而心實其
 氣似羊羶氣鮮者羊之氣也故名之其子累累如椒山人采嫩苗
 為菜茹采根皮為藥
 氣味苦寒 性燥善行足太陰陽明經去濕熱藥也兼入
 手太陰陽明為諸黃風痺要藥世醫止施之瘡科淺矣

惡標峭枯梗
伏苓草薺

△按白鮮皮往昔出於本朝也今亦丹波及吉野山中有
 之高三四尺葉似木槿而小六七月開單白花亦似木
 槿而小根亦似木槿而黃白色俗呼曰寒牟須伊山人

伐之為柴薪即木類也其根以充白鮮皮然和漢大異而葉花亦不相似唐白鮮皮形似筆管而細倭者如山椒木皮而濶故官令禁止賣買

根



延胡索

延胡索

避宋真宗

延胡索

諱改玄為

延



延胡索

本綱延胡索本出奚國東北今二茅山西種之每年寒露


後栽立春後生苗葉如竹葉樣三月長三寸高根叢生如

芋卵樣又如半夏而色黃立夏掘起

氣味辛微

可外可降陰中陽入手足太陰厥陰四經能

行血中氣滯氣中血滯故專治一身上下諸痛通小便



貝母

苧 薊 苦菜 苦花 空草 藥實

和名 腹个 久里

ホイ モウ

本綱貝母二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出
七月開花碧綠色如鼓子花八月采根根有瓣子黃白色
如聚貝子故名貝母此有數種而其葉或如大蒜或如韭
或如桔樓葉而細小蓋其如桔樓者多有之似韭而開白
花者罕復見之

其子在根下如羊子正白四方連累相着有分解

若團不作兩片無皺者號曰丹龍精不入藥用誤服令

入筋脉永不收惟以黃精小藍汁服之立解

氣味

平 苦 辛

能散心胸鬱結之氣乃肺經氣分藥而多愁

鬱者疎有功降火消痰清肺治煩熱咳渴療惡瘡

俗以半夏有毒用貝母代之貝母乃太陰肺經之藥也

經之何可以代乎貝母厚朴白微爲之使惡

若虛勞咳嗽吐血咯血肺痿肺癰婦人乳癰癰疽及諸

鬱之證半夏乃禁忌皆貝母爲向導猶可代也

至於脾胃濕熱涎化爲痰久則生火痰火上攻昏憤僵

仆寒瀉諸證生死旦夕亦豈貝母可代乎

貝母治惡瘡唐人記其事云嘗有商人左膊上有瘡如人

面亦無他苦戲以酒滴口中其面赤色以物食之亦能食

多則膊內肉脹起或不食則一臂痺焉有名醫教其歷試

諸藥金石草木之類悉無所苦至貝母其瘡乃聚眉閉目

因以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也

△按貝母人以小者爲佳蓋不可抱大小色正白而作兩

片有皺者佳也本朝亦潞山陰處有之葉如初生麥

花似百合而赤或白色其根子白然不鮮明故不敢用

手

根

剥皮



山慈姑

金燈 鬼燈檠 朱姑 鹿蹄草 無義草

俗云燈籠花

又云愚和

又云阿未奈

サシツラフ

本綱山慈姑冬月生葉如水仙花之葉而狹二月中枯一
莖如箭幹高尺許莖端開花白色亦有紅色黃色者上有
黑點其花乃衆花簇成一朶如絲紐成可愛三月結子有
三稜四月初苗枯即掘取其根狀如慈姑及小蒜遲則苗
腐難尋矣根苗與老鴉蒜極相類但老鴉根無毛此根有
毛殼包裹為異爾用之去毛殼但其花與葉不相見人惡
種之謂之無義草取根為藥

一種

有圓慈姑根如小蒜

氣味甘微辛

有小毒

能治粉滓面野金銀毒瘡癰疔惡瘡解諸

毒故紫金錠方中入用

△按草本花詩譜云金燈花有二種花開一簇五朶金燈色紅銀燈色白皆蒲生分種

出於藝列及四國葉根共如本草說石蒜根有皮無毛此根畧小而毛多四月開花形似梅花矢長鬚有黃與白二種不若本草謂如絲紐成形耳山慈姑甚希也



石蒜

まびくま

烏蒜

老鴉蒜

水麻

蒜頭草

漣漣酸 一枝箭

さんさろり

俗云死人花 又云彼岸花

しつろり

曼珠沙華 東國

本綱石蒜下濕地有之春初生葉如蒜秧及山慈姑葉背有劍脊四散布地七月苗枯乃干平地抽出一莖如箭幹長尺許莖端開花四五朶六出紅色如山丹花狀而瓣長黃蕊長鬚其根狀如蒜皮色紫赤肉白此花開後乃生葉葉花不相見也同山慈姑

氣味辟_{小毒}甘_溫

治便毒諸瘡，搗爛塗之，即消。若毒大甚者，

洗淨以生白酒煎服，得微汗即愈。

△按石蒜者，山慈姑之類，而中野墳墓邊多有之，故俗曰死人花，而人家忌之，不種者非也。唐人呼山慈姑曰無義草，惡葉花不相見，亦同意也。九十月生苗，似蒜葉而長，有劍脊，四散布地，紀列人用，藉蜜柑籠中。四月葉枯，徒爲空地。七月抽一莖，尺餘，莖端開花七八朵，有青節，每朵開紅花六出，狹長攢簇如深紅絲紐，每瓣著赤蕊七筋長而耑戴小子形，如年乃半土而初赤，後黃老則花緣變白，亦有之。秋分盛開，故名彼岸花。小兒取之寸折之，脫而皮不絕，畧作念珠狀，掛頸爲戲，莖汁臭。又法華經曰：摩訶曼陀羅華，曼珠沙華，乃曼陀羅花。今云朝鮮牽牛花也。曼珠沙花，此石蒜也。摩訶者大之義，共稱其美耳。其根似水仙根，而不如蒜有隔也。塗諸瘡佳，或和泥土塗壁，則鼠不敢入。又搗和繪，具書於漆器，則不繪滅。



鐵色箭

カラダのいん

俗云夏水仙

本綱鐵色箭即石蒜之一種者其葉如大韭四五月抽莖
 開花如小萱花黃白色花後乃生葉葉花不相見山慈姑
 石蒜並同根亦為藥功相似

△按鐵色箭夏開花賞其花俗不名夏水仙也凡冬生苗
 葉似水仙而厚微潤有劍脊不失水仙二月枯此葉四
 五月枯故玄花者換用水仙葉仍名夏水仙葉枯而後
 七月抽莖開花似萱草及牽牛花而白黃色一莖四五
 朵開又有黃白帶微赤色者
 又不可謂花後生葉謂葉枯後生花而可也

水仙 金盞銀臺

水仙



ニイスル

本綱水仙宜卑濕地不可缺水故名之其根似蒜及薤而
長外有赤皮累之冬月生葉似薤及蒜春初抽莖如葱頭
莖頭開花數朵大如簪頭狀如酒盃五尖上承葉心宛然
蓋樣其花瑩韻其香清幽栽于肥壤則花茂盛瘦地則無
花五月初收根以童尿浸一宿晒乾懸火煖處若不移痛
根更旺其根為藥

氣味苦微辛
滑寒

治癰腫及魚骨哽又以花作香澤塗身理


髮或入婦人五心發熱之藥

一種千葉者花綴下輕黃而上淡白不作盃狀人重之指
為真水仙蓋不然乃一物二種爾亦有紅花者

本草綱目卷之十一 蘭 一

一種出拂林國者根大如雞卵葉長三四尺似蒜中心抽
條莖端開花六出紅白色花心黃赤不結子冬生夏死
此形狀與水仙彷彿

△按水仙南面岸陰能茂生如遠列駿列向陽地則三四
尺者不多或夏土用中掘其根浸尿曬乾一宿種之則
佳大抵十一月開花近時有七八月開者蓋因培糞之
功也河州志紀郡舟橋村出早華紀列松江之產亦早
千瓣者名玉玲瓏畫見譜今有千葉淡青色者未見其紅
花者凡眼科取其根細末水飛以點突眼有效紋汁入
眼亦佳又傳ハキカニ廉瘡愈



白茅

はぐれ

根名茹根

蘭根 地筋

茅 和名香

花曰豆波奈
且與智通

ペツマ

本綱白茅田野處處有之春生茅布地如針俗謂之茅針亦可噉甚益小兒夏生白花成穗茸茸然結細實至秋而枯其根甚長白軟如筋而有節乾之夜視有光故腐則變為螢火

茅根 甘寒

服食斷穀甚良能除伏熱利小便故止諸血

噉逆喘急消渴治黃疸水種乃良物也

茅針 甘平

即初生苗也通小腸下水治消渴破血治血

及暴下血服之惡瘡軟痛未潰者煮服一針一孔二針

二孔傳金瘡生接止血

茅花 甘溫


止吐血瘀血飲傳灸瘡不令罨刀箭金瘡止

血并痛

△按茅生原野堤塘春月兒女拔茅針為野遊

俗名茅針也

本草綱目卷之二十三 雜考



菅茅

リグマ

白華野菅 爾雅

俗云智加也
翻上下之名

本綱菅茅生山上似白茅而長入秋抽莖開花成穗如荻花結實尖黑長分許粘衣刺入其根短硬如細竹根無節可入藥功不及白茅

云云

かゝる此種は茅草をいふものなり

かや

根名地筋

菅根 土筋

黃茅


俗云加也



本綱黃茅似菅茅而莖上開葉莖下有白粉根頭有黃毛

根亦短而細硬無節秋深開花穗如管可為索縷蓋白茅
黃茅二物之根狀皆如筋故共名地筋

△按黃茅其根細纖而如絲凡筋及草薺鬚束之可以磨
物呼名宇豆久利出於藝州廣島櫛挽家用之以琢櫛



香茅

たまり

菁茅

瑠茅

俗云太未保
又云菴草

本綱香茅葉有三脊其氣香芬可以包藉及縮酒

△按香茅葉似管茅而有二稜微柔軟農家用之作雨衣
蓑其穗黃赤色其他茅穗白播州多有之



芒 同 惹

芭茅 杜榮
芭茅

俗云尾花
又云須々木
俗作薄字

本細芒叢生葉如茅而大長四五尺甚快利傷人如鋒刃
七月抽長莖開白花成穗如蘆葦花於花將放時剥其穽
皮可為繩箔草履諸物其莖穗可為掃帚也

石芒 折草 生高山如芒而節短五月抽短莖開花亦如

芒花 本 亦如芒花之葉而節短五月抽短莖開花亦如

△按惹 俗用 其花作穗而翻翻似物之尾故俗呼名尾花

順和名抄引爾雅云草聚生曰薄 新撰萬葉集和歌云
花薄攝波奈須須木

此草以數莖叢生竟以薄為此草名

鬼惹 盤芒 常 葉潤於常夏冬不凋快利傷人手者也

縵惹 須木 須 葉有縱白文如縵織者也

鷹羽芒タカノハ乃太加波タカハ葉有白彪如鷹羽者也

十寸穗芒シウサウ未須保或モトメ登蓮法師問二名何是也有河列丹南郡王



絲芒

俗云伊止須須木

本綱絲芒即芒之果種葉細如絲線而長三四尺一株數百莖叢生秋抽莖作花穗以栽庭園賞之

まなすうろけのあけあけのあけあけのあけあけ

陵游

和名衣夜美久佐

龍膽

ロニタニ

一云迹加奈今云里牟告



根



本綱龍膽宿根黃白色下抽根十餘條類牛膝而短直上生苗高尺餘四月生葉如嫩蒜細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸狀青碧色冬後結子苗便枯俗呼曰草龍膽又云葉如龍葵味苦如膽因以名龍膽

氣味苦寒氣味俱厚

沉而降陰也足厥陰少陽經氣分藥也其

用有四除下部風濕一除濕熱二治臍下至足腫痛三

治寒濕脚氣也四下行之功與防已同酒浸則能上行外

行以柴胡為主龍膽為使治眼中疾必用之藥

益肝膽之氣而泄火蓋相火寄在肝膽有濕無補故龍

膽能瀉肝膽之邪熱也但大苦大寒過服恐傷胃中生

發之氣反助火邪小豆為之使惡地黃忌鐵

一種山龍膽苦瀉

其葉經霜雪不凋山人用治四肢疼


痛與草龍膽同類而別種也

△按龍膽和漢共用之藝州廣島之產良豐前中津次之

我々所産之草龍膽は、此の草と異なる。其の葉は、霜雪に耐えず、山人に用ひて四肢の疼痛を治すに用ゐる。

葉似^{ササ}笹而厚九月開花紫如^{ササ}鈴鐸形向上花中有^{ササ}荇子
又有^{ササ}正白花者名^{ササ}龍膽形狀小

遼細辛



西細辛



細辛

さいじん

小辛 少辛

和名美良乃祢

或云比木乃比太
比久佐

スエイスイ

本細細辛山谷處處有之皆不及^{ササ}華陰高麗者葉似^{ササ}小葵
莖細根直而色紫味極辛嚼之習習如^{ササ}椒而更甚於椒
大抵能亂細辛者甚多皆當以根苗色味細辨之杜衡鬼
督郵徐長卿白微白前皆能偽細辛

杜衡

葉似馬蹄莖微粗根曲而黃白色味亦辛

鬼督郵

一莖直上莖端生葉如^{ササ}纖根似細辛微粗直
而黃白色味辛微若

徐長卿

似鬼督郵而色黑者及已也葉似小桑根似

白微

白前

細辛微粗長而黃色味辛而有臊氣
葉似柳而根似細辛粗長黃白色而味苦
似白微而白直味甘

細辛氣味

大辛溫氣厚于味

陽也升也入足厥陰少陰血分爲

手少陰引經之藥頭面風痛不可缺此香味俱細故入
少陰與獨活相類以獨活爲使治少陰頭痛如神亦止
諸陽頭痛諸風通用之又治邪氣自裏之表
凡水停心下不行則腎氣燥宜辛以潤之細辛之辛以
行水氣而潤燥

口瘡喉痺蠱齒諸病用之者取其能散浮熱亦火鬱則
發之之義也辛能補肝故膽氣不足驚癇眼目諸病宜

用之

得當歸芍藥芩薤白芷牡丹藁本甘草共療婦

人得決明鯉魚膽共療目痛

惡黃芪山茱萸忌生萊菔肉畏滑石石及藜蘆

△按細辛倭漢共用之與州津輕及江州之產良阿波及
豐前小倉之產次之其葉似小葵而青有小白點夏

開小紫花，聚短根直外黃，內白，其氣畧如椒，雖辛，不_レ用。細辛藏人參，則人參不_レ性。



杜衡

杜葵 馬蹄香

土鹵土細辛

聖布太末賀三
又云豆不祿久左

トウシ

本綱杜衡春初於宿根上生苗，葉似馬蹄狀，高二三寸，莖似麥蒿，粗細每窠上有五七葉，或八九葉，別無枝蔓。又於莖葉間罅內蘆頭上貼地生紫花，其花似見不見，暗結實如豆。大窠內有碑子似天仙子苗，葉俱青，經霜即枯，其根成空，有似飯帚，密闊細長四五寸粗，於細辛微黃白色帶之，可以走馬，馬得之健走也。市人往往以亂細辛，其功雖不及細辛，而_レ溫_レ味_レ辛，能散風寒，下氣消痰。

△按杜衡性昔本朝亦有之，今則亡。

△按此草...

此草...

樟耳細辛

不...

及已

和名豆木餘人主



...

本綱及已生山谷陰濕軟地二月生苗一莖莖頭四葉隙

着白花其葉狀如樟耳其根似細辛而黑味苦有毒入口

使人吐血只煎汁傳惡瘡及牛馬諸瘡今人不知及已律

往以當杜衡却以杜衡當細辛

△按及已倭名抄載之則往昔本朝可有之今則不識

...

獨搖草

鬼督郵

獨莖而葉攢其端無風自動故名獨搖獨搖與此同名異物



クイニヨウ

本綱鬼督郵莖似細箭幹高二尺以下葉生莖端狀如金
花生葉心黃白色根橫生而無鬚與及已同類根苗皆相
似但以根如細辛而色黃白者為鬼督郵色黑者為及已


ひめうみ

鬼督郵

別仙蹤

徐長卿

和名比世加と美



あきく

ツチキキ

徐長卿人名也
常以此藥治邪
疾遂為名

本綱徐長卿生下濕川澤之間苗似小桑兩葉相對三月
苗青七八月着子似蘿藦子而小九月苗黃十月凋其根
如細辛微粗長黃色而有臊氣

氣味

辛溫有毒

治鬼物疫疾溫癰蓋鬼督郵徐長卿赤箭之

三物皆治鬼病故共有鬼督郵之名名同而物異古者

傳含有督郵之官

司鬼之官

鬼督郵及已之亂杜衡其功不同苗亦不同也徐長卿之

亂鬼督郵其苗不同其功同也杜衡之亂細辛則根苗

功用皆彷彿乃瀕近而大亂也不可不審

△按徐長卿威靈仙二物誤訓不那波羅相混宜辨之

肘後方云凡人登車船煩悶頭痛欲吐者舐之注車注

船俗云船醉也徐長卿 石長生 車前子 車下李

根皮四味等分搗碎以方囊繫半合干衣帶及頭上則

免此患疑以此船棧之義下畧稱徐長卿曰不奈波良

乎

根



角



白微

びび

薇草 白幕

骨美 薺音尾

春草

和名美那之古草

一云久呂久佐

一云阿末奈

ペウイ

本綱白微莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花八月結實其根黃白色類牛膝而短小

氣味苦鹹寒

陽明經藥古方多用治婦人後世罕能知

附子之功

杜若之功

源順

農政全書云白薇苗高一二尺莖葉俱青頗類柳葉而潤短硬毛漣開花紅色又云紫色結角中有白瓢根如牛膝根而短黃白色

△按白微往昔有出於本朝今則以



白前

ハクゼン

石藍

嗽藥

和名能加美

ハツツシ

本綱白前苗高尺許其葉似柳根似白微牛膝輩

但似牛膝粗長堅直易斷者白前也

以此別之無差

似牛膝短小柔軟能變者白微也

氣味甘微辛微溫

手太陰藥保定肺氣治嗽多用以溫藥相

佐使尤佳蓋肺氣壅實而有痰者宜之若虛而長哽氣者不可用

△按白前往昔有出於本朝今乃亡



草犀

ツア。ウスエ

本綱草犀苗高二三尺獨莖對葉而生如燈臺草根如細辛味辛一切毒氣虎狼蟲虺所傷並宜燒研服之臨死者亦得活其解毒之功如犀角故名草犀



百兩金

ひしひしと

本綱百兩金生戎州苗高二三尺有幹如木葉似荔枝初
 生背面俱青結花實後背紫面青凌冬不凋初秋開花青
 碧色結實大如豆生青熟赤
 一種河中府出者根如蔓青赤色莖細青色四月開碎黃
 花似星宿花五月采根長及一丈



紅荳花

こけり

草木花詩譜云紅豈花開一蕙十莖莖莖下豈色妍桃杏
其葉瘦如蕙亦可觀也



唐松草

俗稱

正字未詳

△按唐松草主山中春生苗苗間更生莖葉似人參而細
小面青綠背淡三桠五葉四月莖端開白花無葩瓣而
匠人如刻成松葉俗稱唐松也花落莖殘其莖青黃色
亦似花間希結莢有稜如麥穎而青色

一種有小唐松莖葉稍小而莖帶紫色其花有白有紫今
人家移種甚可愛

一種有雪黑草高四五寸葉花並似唐松草而白
又有淺紅及紫

△新編植物圖考 卷九十二 八



罌草

くぐたまう 俗稱
ちぐま

正字未詳

△按罌草溪山溪谷有之高不過尺細莖一本直立似櫛
櫛之輩而厚有尖稜七八葉相層如開蓮中心抽細莖
六月開花白色如毛狀似罌毛鞘鎗故俗名之蓋罌即
白熊也見獸部



紫陽花

わづら

紫陽花白氏文集

和名安豆佐爲

俗云安和佐爲

今云加久波奈

△按倭名抄云紫陽花出於白氏文集叢生莖葉似綉綵

葉而五月開花其形異莖頭出四五朶朶端有未開小花數百顆黃赤色既開則紫色其周匝有大白花十許形似櫻花而總体作方宛似署扁板俗呼名署扁花

相傳紫陽草葉

陰乾

煎服能治癰疾

一種有白花者其莖葉與紫陽花同而五月開花其花形大異正白色五瓣小花數百攢成大於綉毬花俗呼之為真安知佐井未審蓋謂紫陽花則紫者可為真其白者一類二種也亦為綉毬之種類不遠也綉毬者即粉團花而木類



繡線菊

とろつけ

俗云之毛豆介

△按繡線菊高一二尺葉似蒲萄葉而小五月開碎花狀

似胡蘿蔔而淡赤色可愛又有白花者
 一種樹有繡線菊其樹葉似粉團花而枝頂上開花狀似
 繡線菊故俗呼曰木繡線菊未知其本名




女郎花

和名乎美那倍之

女倭芝新撰

△按女郎花生山麓高二三尺莖有稜理而似蒿之莖枝
 兩兩對生節際生葉亦對生其葉似三七及前胡葉而
 細長七月出穗開花最細小正黃色可愛本朝文粹載
 源順詩曰花色如蒸栗俗呼為女郎者是也隨結子如粉團
 花白者名男倍芝オミナヘシ

本草綱目卷之二十四 雜考 二十四



川萱

カヲカ

正字未詳

俗云加留加也

△按此草生山原高二三尺細莖細葉每五葉兩兩對生
 八月抽莖開細花狀如景天草及胡蘿蔔花而粒粒青
 色既開則正黃是亦可謂如燕粟乎隨結子
 一云川萱者齒之類也秋出穗



箱根草

スミシロ

本名未詳

△按箱根草相州箱根山有之小草苗高六七寸細莖褐

色葉形似銀杏葉而小其根細如絲而短未知其本名
相傳云能治產前產後諸血症及痰飲
往年阿蘭陀人見之稱有良草請採得之甚以為珍



元日草

ふんぢうさう 福壽草

△按福壽草洛東山溪陰處有之冬枯春生於宿根肥莖
高二三寸葉似胡蘿蔔及石長生菜而小歲旦初開黃
花似半開菊花人以爲珍植盆稱元日草春夏長尺餘
生枝條花綻開不堪見
五雜俎云有歲蘭其花同蘭而葉稍異其開必以歲首
故名歲蘭此亦元日草一類二種乎

けりし

夾竹桃



草本花詩譜云夾竹桃花如桃花葉如竹故名然惡濕而畏寒十月初宜置向陽處放之喜肥不可乾壅

くまのこ

俗稱 本銘

草尾




くまのこ

丁名 王草
疑謂草王義孝

按草尾生石縫間葉似和人參葉而淺綠四月開小黃花結角花子共似蕪菁按葉塗爛眼傳瘡腫速効

歪頭菜



農政全書云歪頭菜出山野中細莖就地叢生葉似豌豆葉而狹長背微白兩葉並生一處開紅紫花結角比豌豆角短小匾瘦葉味甜採葉燂熟油鹽調食



紫雲菜

農政全書云紫雲菜生山野中苗高一二尺莖方紫色對節生葉似山小菜葉頗長拂梗對生葉頂及葉間開淡紫

花其葉微苦

採嫩苗葉煤熟水浸淘去苦味而鹽調食



匙頭菜

全云匙頭菜生山野中作小科苗其莖面寬背圓葉似團匙頭樣有如杏葉大邊微鋸齒開淡紅花結子黃褐色其葉味甜



舌頭菜

せうとうさい

全云舌頭菜生山野中苗葉塌地生葉似山白菜葉而小

頭頤團葉面不皺比小白菜亦厚狀類猪舌形故以為名
味苦採葉燂熟水浸去苦味油鹽調食

らまん

地桑

痢見草

螺壓黑兒



全云螺壓兒草生荒野中莖微紅葉似野人莧葉微長窄
而尖開花作赤色小細穗兒
葉甘今人用苗水煮服治痢疾甚効

くさくさ

鯽魚鱗草



中苗高二三入莖大頭花

和漢三才圖會

山

卷之五

七



尖刀兒草

全云尖_子完草生山野中苗高二三尺葉似細柳葉而細長而尖兩兩拈莖對生開淡黃花結尖角長二寸許_鹿如蘿藦角中有白穰及小區黑子其葉味甜


和等特集默經水育去等和浙鹽區分



山裏果兒

山裏紅
映山紅果

農政全書云生山野中枝莖似初生桑條上多刺其葉似
菊葉稍團開白花結紅果大如櫻桃味甜



惠連草

あまのこ

俗稱
紅字

△按惠連草在深谷中和列多武峯有之高六七寸獨
莖抄大葉唯三葉長三寸許似小玉簪葉而不光三四
月頂上開小花淡紫單葉四瓣結子中有細子淡黑色

其根如半夏陰乾以為食傷藥



佛指甲

農政全書云生山谷中苗高一二尺莖微帶赤黃色其葉
淡綠背皆微帶白色葉如長匙頭樣似黑豆葉而微寬兩
葉對生開黃花結實形如連翹微小中有黑子小如栗粒
其葉味甜



拐棗

くわいざん

農政全書云拐棗生山谷中葉似楮葉而尖鱗面多紋脉
 邊有細鋸齒開淡黃花結實狀似生姜拐又而細短深茶
 褐色味甜



櫻川草

風輪菜



風輪菜

俗云櫻川草

全云風輪菜生山野中苗高二尺餘方莖四楞色淡綠微
 白葉似荏苒子葉而小邊有鋸齒兩葉對生而葉節間又生
 子葉極小四葉相攢對生開淡粉紅花其葉味苦
 △按風輪菜俗云櫻川草也高二三尺莖中空葉似山漆
 葉而小三三抱莖生枝極三四寸莖頭開小花粉紅色
 攢生一一形似牽牛花而極小所圖和漢有小異故出

二圖

りんごのい

珍珠菜



農政全書云珍珠菜生山野中苗高二尺許莖似蒿桿微帶紅色其葉狀似柳葉而極細小頭出穗狀類鼠尾草穗開白花結子小如菜豆粒黃褐色葉味苦澀

わくとうし

木桃兒



農政全書云木桃兒生山中高五尺餘枝條上氣脉積聚為瘡狀類小桃極堅實其葉似楮葉而狹小有細鋸齒開

淡紫花結子似梧桐子而大熟則淡銀褐色味甘可食

えんどうら 老君鬚


金剛刺



農政全書云金剛刺生山野中料條高二四尺條其上多刺葉似牛尾菜葉又似龍鬚菜葉而大葉間生細絲蔓其葉味甘

やまひもろこし 隔葱鹿耳葱

山葱



農政全書云山葱生山野中葉似玉簪葉微團葉中攢莖

和漢三才圖會

山草

卷之五 五音部 (三)

似蒜薹甚長而澁稍頭結菁莢似葱菁莢微開白花結子
黑色苗味辣



羽子伊草


正字未詳

子形似羽
子改名之

くごの

又云波古乃古

△按羽子伊草生山中野州日光山及處處山中有之葉
似白蒿葉三月開白花似桔梗花而小六七月結子大
如無患子而生青熟灰白色皺三葉抽於子形彷彿小
兒所翫羽子連子葉裸食或鹽漬送他邦入暹汁食之
味不美唯賞珍菓耳



山神錫杖

或云狐錫杖

やまのけしき

俗稱

△按此草生高山嶺無葉夏開黃花秋結子形似番椒而長二三寸生青熟正紅一莖十余顆畧如錫杖樣故俗呼名山神錫杖乾則頗似麥門冬而黑色皮肉厚中有細子小於罌子粘肉山人取為藥微苦能治五淋及腹痛



岐良牟草

ぎしんそう

正字 未詳

濕草有蛇含草名岐良牟
功能亦與此似而形狀異

本草 卷之五 三十一

△按岐良牟草，山中小草也。備中及近江有之。冬枯春生，苗布地而無枝，似茶蘭葉而大，柔畧有大鋸齒而不尖，背微紫。二四月葉間開花，甚小，淡紫色。其子小而難見。取葉陰乾，黑燒用麻油塗，小兒草瘡，一二度即治。




山中小草

此草生於山陰，其葉如茶蘭而大，柔畧有大鋸齒而不尖，背微紫。二四月葉間開花，甚小，淡紫色。其子小而難見。取葉陰乾，黑燒用麻油塗，小兒草瘡，一二度即治。



李
總

八一
六九





李
盧
總

八一
六九

三 十 九

芳
草
類

地
棲
漢
三
才
圖
會



本
總

八一
六九

AE
4
T4
1824
V.93

倭漢三才圖會卷第九十三目錄

芳草類

當歸

藁本

牡丹

甘松香

杜若

草豆蔻

川芎

藤蕪

白芷

木香

山柰

山薑

草果

蛇牀子


芍藥

青木香

廉薑

良薑

白豆蔻



縮砂あやぐし

芍藥しやくやく

薑黃きやうわう

荊三稜しんさんれい

菽蓲しゆくじゆ

附 救 帳 鈎 草

茉莉もり

藿香くわくかう

澤蘭たくらん

益智いやくち

肉豆蔻にくとう

鬱金うきん

香附子かうふし

延命草えんめいそう

鬱金香うきんかう

零陵香れいれいかう

馬蘭ばらん

葦菱ゐりやう

補骨脂くはくし

莪茂がぼう

磚子草せんしそう

附 水 菖 草

耆婆草しへさう

茅香ぼうかう

孩兒菊ちやうじく

蘭花らんかう

春蘭 あゆらん

青蘭 あいらん

香薷 あけふ

薄荷 あはれ

紫薷 あざふ

薷月薷 あざふ

蕙蘭 けらん

棒蘭 ぼうらん

爵牀 あきふ

積雪草 あきふ

荏 あざふ

麝香草 あざふ

銀蘭 ぎんらん

風蘭 ふうらん

荊芥 けいふ

壺草 あきふ

水薷 あざふ

曼連樓 あざふ

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

薺草

和藻三才圖會卷第九十三

芳草類

攝陽

城醫法橋寺島良安

尚順

編

根

蒼蠹頭當歸

馬尾當歸



當歸

マミゼリ
タキ

山蘄 乾歸
文無 白蘄

和名夜末世里

唐音
タキ

本綱今諸處人多栽蒔為貨春生苗綠葉有三瓣七八月

開花似葍蘿淺紫色根黑黃色以肉厚而不枯者為勝

馬尾當歸

根頭圓尾多色紫氣香肥潤者最佳

錢頭當歸

根頭大尾粗色白堅粘者不佳止宜入

發散藥爾凡

蜀中之產為非常歸佳

氣味

甘苦辛溫
氣厚味薄

可升可降為女人要藥血受病必須用

血壅而不流則痛使氣血各有所歸故名當歸惡濕
海藻生薑其頭能破血身能養血尾能行血全用同人參黃
 芪則補氣而生血

△按當歸出於山城久世郡者最佳本和之產次之以花
 葉似芥名山蘄蘄之花即字



川芎
みんき 香果山鞠窮
 闇莫迎金明光經

有名於無奈加豆良

本綱芎藭以蜀川者為勝因稱川芎人多栽蒔深夜莖葉
 亦不萎也清明後宿根生苗分其枝橫埋之則節節生根
 葉似芥而微細窄有又文似白芷葉亦細嫩葉可燂食
 甚香七八月開碎白花如蛇牀子花八月根下始結芎藭
 乃可掘取蒸暴貨之形塊重實作雀腦狀黃黑色裏白不

油爵之微辛甘者佳

又有葉似蛇牀子葉而粗者其嫩葉亦可燂食

氣味辛苦性溫氣厚味薄浮而升陽也少陽本經入手足厥陰經

氣分上行頭目下行血海能散肝經之風治少陽厥陰

經頭痛及血虛頭痛之聖藥也

頭痛必用川芎加各引經藥太陽羌活陽明白芷少陽

柴胡太陰蒼朮厥陰吳茱萸少陰細辛是也

如骨蒸多汗及氣弱之人不可久服真氣洩而陰愈虛

△按芎藭葉似芥而山中獨生者根長人家栽者根團畧

似薯蕷而小未見別種者劉氏鴻書云日本有諸藥而

無甘草芎藭云慶長元和之比有唐川芎稍久不來

而價貴至凡一兩代銀十五六錢故重之如人參於是

間用倭之川芎因處處多移植用之既知其功勝於中

華者形狀亦無異但其微辛味甚爾

和州赤羽根之產最佳丹後山城次之豐後肥後為劣

藥肆以團者稱川芎以稍長者稱芎藭者不識名義之甚者也

薛蕪

薇蕪

蘄薺

江薺

本綱辛溫是乃川芎嫩苗未結根時也既結根後乃為芎藭乃有二種似芥葉者似蛇牀葉者並香氣相似用亦不殊其芳香可藏衣中作飲止泄瀉定驚氣辟邪惡



蛇牀

やまぐし

牆薺

蛇米

蛇粟

虺牀

馬牀

やまぐし

和名比流無之呂

せし、ちせ

本綱生田野蛇虺喜臥此草下食其子故名三月生苗高三二尺葉青碎作叢似小葉芎藭每枝上有花頭百餘結同一窠四五月開白花如碎米攢簇似織狀其子黃褐色

兩片合成亦有稜凡花實似蛇牀者當歸芎

氣味甘苦

右腎命門少陽三焦氣分之藥令人陽氣盛

不獨補助男子而能有益婦人世人捨此而求補藥於

遠域豈非賤且貴耳乎惡牡丹貝


△按蛇牀子處處山野有之攝河最多其苗花子皆如本

草之說蓋子大如蚕俗呼名數蚕蓋春意藥方中多用

之以大有益陽事之功也其他藥方用之者希

水草有蛭莖者蛭在其葉之謂也別是一種而與蛇牀

不同以蛇牀呼蛭莖之名義未詳



藁本

かきん

微莖 鬼神

藁本 鬼卿

和名佐々波曾良之

一云曾良之

カウホニ

本綱藁本深山中有之葉似白芷香又似川芎但川芎

似水芹而大。藁本葉細爾。五月有白花。七八月結子。根紫色。根上苗下似禾。藁本故名。藁本俗中皆用。芎藭根鬚其形氣乃相類。

氣味厚味薄辛溫氣

外也。陽也。足太陽經風藥。其氣雄壯寒氣。

鬱於大陽經頭痛必用之。藥顛頂痛非此不能除。與木香同用治霧露之清邪中於上焦。惡惡蘭茹畏小兒疥癬用藁本煎湯浴之。并以浣衣。

△按藁本往昔本朝有之。今乃無之。自唐來者有二種。而赤熊手者多。鬚者也最良。川芎手者少。鬚形似川芎不佳。本草所謂江南之產似芎藭而輕者是乎



白芷

白芷 澤芬 芳香 苻離

葉名蒿麻藥和名加佐毛知

ベツツツ
二云與呂比

本綱白芷處處有之。地尤多。其根長尺餘。粗細不等。白
色枝幹去地五寸以上春生。葉相對。婆娑紫色。闊三指許。
花白。微黃。入伏後結子。立秋後苗枯。凡采勿用四條一處
生者。名喪公藤。今人采根以石灰拌勻。晒收。為其易蛀。并
欲色白也。入藥微焙。

氣味

辛溫氣厚味輕

芳香能通九竅。表汗不可缺。凡療風通用。

手陽明引經

本藥同升麻則通行手足。陽明經亦入手

同辛夷細辛用則治鼻病。入內托散用。長肌肉則入陽

明可知矣。其色白。味辛。行手陽明。庚金性溫。氣厚。行足

陽明。戊土芳香上達。入手大陰肺經。肺者庚之子。所主之

病不離三經。如頭目眉齒諸病。三經之風熱也。如漏帶

癰疽諸病。三經之濕熱也。風熱者辛以散之。為陽明主

藥故又能治血病胎病。而排膿生肌止痛。當歸為之使。

惡旋復花制雄黃硫黃

△按白芷本朝處處出者有二種。而一種苗高五六尺。莖

葉似川芎而甚大花實亦似川芎大房但葉色淡於川
 芎無香氣一種苗高三四尺莖有細白毛葉似川芎而
 甚大其色淡於川芎而甚有香氣並其根形狀和漢無
 異但經久則輕虛而如朽木以不分明官令禁售之單
 用唐白芷其大輪切者俗呼名車切最良斜殺者名殺
 白芷次之細長而似吸口者名吸口手為下品吸口者
 名也



芍藥

芍薬

將離 梨食

餘容 鋌

白木 此名義
未解

芍薬

和名衣比須藥

芍薬

一云沼美父須里

本綱有白者

名金芍

藥赤者

名木芍藥

十葉者名小牡丹

十月生紅芽至春乃長夏初開花五葉似牡丹而狹長高
 一二尺有紅白紫數種其品凡三十餘種有十葉單葉樓

子之異入藥宜用單葉根結子似牡丹子而小其根之白赤隨花之色也洛陽牡丹揚州芍藥甲天下

氣味

酸而苦氣薄味厚

陰也降也為手足太陰行經藥入肝脾

血分白補而赤瀉白收而赤散其用凡六安脾經

腹痛二收胃氣三止瀉痢四和血脉五固腠理六

同白朮用補脾同川芎瀉肝同人參補氣同當歸補血

以酒炒補陰同甘草止腹痛同黃連止瀉痢同防風發

瘡疹同薑棗溫經散濕產後不可用但酒炒不効

藜蘆

△按芍藥花容焯約焯約者美好見故倭俗亦名白好草加保藥

蓋唐芍藥多內外赤色而白者鮮矣出於本朝信濃者

最佳伊勢丹波之產次之凡人家所栽者花美好也而

入藥以山中者為佳或用豆知阿介比根偽之形狀相

似矣宜辨之

近時名花之芍藥類多出凡五百有餘種不遑悉記惟

愛花者則紅白最鮮明其花形如皿而中葉如幣其幣皆黃金色者為上品凡牡丹芍藥蓮花欲插瓶早晚剪不宜至已時或申時可伐用不萎易



牡丹

牡丹人

花王 鼠姑

鹿韭 百兩金

木芍藥

牡丹

和名布加美久佐

本綱牡丹莖梗枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花五月結子黑色如雞頭子大根黃白色可長五七寸大如筆管近世人多貴重欲其花之詭異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其花有黃紫紅白數色亦有緋者深碧色者惟取紅白單瓣者根入藥其千葉異品人乃所致氣味不純不可用群花品中以牡丹第一芍藥第二故世謂牡丹為花王芍藥為花相花品數種其名或以地或以人或以

以色或以異凡栽花者根下着白斂末辟蟲點硫黃殺蟲
以烏賊骨イカカウラ其樹必枯此物性亦不可不知也
根皮微苦辛治手足少陰同厥陰四經血分伏火伏火即陰火也

陰火也故仲景腎氣丸用之後人乃專以黃蘗治相火

不知牡丹之功更勝也又能治神志不足神志不足屬

治積血及吐血衄血必用之藥也赤花者利白花者補

人亦罕悟也牡丹皮治無汗骨蒸熱絲子忌蒜胡荽

畫譜云牡丹宜寒惡熱宜燥惡濕根窠喜得新土則旺懼

烈風炎白栽宜寬廠向陽之地無廠壁屋

歐陽永叔花品錄所載二十種或云三十種姚黃千葉黃

紙牛家黃千葉比姚潛溪緋千葉獻來紅淺紅花鶴翎紅

多葉花其末白而鹿胎花多葉紫花甘草黃單葉色王版

白單葉白如鶴翎如朱砂紅倒葷檀心蓮花蕊九葉真珠

丹州紅者皆千葉紅如平頭紫葉底紫者其紫色奇品其

外畧之

古今醫統云冬至夜撥開牡丹根脚下土取水澆中石衣

五雜俎云牡丹正黃者不可得正紅者亦難得矣亦有墨
色者須苗芽時以墨水澆其根比開花作蔚藍色尤奇也
隆冬時有牡丹花計其工力一本至十數金此以難得爲
貴耳自唐以前無有稱賞至開元年中始漸貴重矣然牡
丹芍藥閩中無焉如荔枝龍眼之不過浙也

事物紀源云隋煬帝世始傳牡丹華而唐開元年中宮中及民間競尚賞之自此有數品花

陳眉公秘笈云剪牡丹花欲急急則花牀無傷世謂牡丹
近有蓋以國朝文士集中無牡丹詩張公嘗言北齋楊子
華畵牡丹極分明則知北齋已有牡丹矣

万葉
あまのうきはふかしのきとていよにけしちる

△按牡丹根皮山城大和多出之而家種者不入藥用凡牡丹芍藥花貴重也又片和藻時代同本朝聖武帝時又リ盛賞又ス

之今亦奈良多出名花諸國富家一株價以數百金移栽之歲歲出珍花故近於千品其名不枚舉焉千葉而厚徑六七寸純紅如石榴花色而形儀全備甕子小而

不綻者爲極上純白者亦以此可准知

夏月採川地晒乾

古圃土細砂

以上篩和

八九月出紅

芽後可移栽培之不可用糞溺冬月用油渣少入根傍

或灌鮮魚洗汁亦佳四月開花花落甕破結子七八莢

八月莢裂中子黑色十粒許如豆大候將落時採直蒔

之者難生

春載粒出生如豆初生五六年後初可見花

總珍花出於子種而有紫花而白縵者或本純白未紅

者或黑牡丹冬牡丹等之異品然所貴重者止純白純



紅之二耳紫者爲最下正黃者未曾見之謝肇成之言

當焉歐氏所謂姚黃牛家黃者其如何色耶

凡二十年以來人能接得之而名花流布處處蘓頌既

謂秋冬移接則太唐自昔接之矣

○二



木香

蜜香青木香

五木香南木香
經曰痺痿化香

本綱木香南番諸國皆有其根形如枯骨粉牙者為良或

川馬兜鈴根為青木香又呼為蔽根為木香愈亂真矣

氣味苦辛溫沈而降陰也三焦氣分之藥能升降氣

得橘皮肉豆蔻生薑相佐使效尤速如治中下二焦氣

結滯及不轉運須用檳榔為使治赤白痢用黃連為佐

生氣少氣不足補也安胎健脾胃補也蓋與補藥為佐

通塞氣導諸氣破也除痞癥塊破也

則補與泄藥為君則泄也凡入理氣藥只生用不見火

若實大腸宜麩煨熟用

△按木香本草圖經三才圖會草本畫譜等所載葉狀異說多或云葉似羊蹄而長大或云葉長八九寸皺軟而

有毛或云葉如牛蒡但狹長或云葉類絲瓜未審故隨
 本草必讀唯圖其根耳南番諸國有之又有出於中華
 雲南貴州者多阿蘭陀市舶將來今有軸木香株木香
 二種以軸為良倭木香葉似羊蹄而花似旋覆而深黃

ちやうめつちやう

青木香



本綱青木香乃木香也然後人呼馬兜鈴根為青木香而

木香呼畧似木香故用亂木香宜辨正之

△按倭出青木香又以為然倭無馬兜鈴故採似蘿摩而

有香氣者為青木香蓋此贗之贗者矣

其草蔓生皆似蘿摩而莖葉有香氣結子如零餘子其
 根似自然生山薯而味苦出於於畿內蘿摩出蔓草部

かんきょう 苦稱哆明金經

甘松香

カンソンキョ



本綱甘溫出於外國叢生山野引蔓葉細如茅草根極繁

密可合諸香及衰衣作湯浴令人身香ニカラ

△按甘松有蝦手エビテ藁手ワラテ二種以蝦手為上

こんな 山辣

山柰

俗云佐半柰



本綱三柰俗訛為三奈生廣州人家栽之根葉皆如生薑作樟木シロギ香氣カサ土人食其根如食薑辛溫切斷暴乾則皮赤

黃色肉白色可合諸香

酉陽雜俎云柰祇出拂林國長三四尺根大如鴨卵葉似
蒜中心抽條甚長莖端有花六出紅白色花心黃赤不結
子其草冬生夏死取花壓油塗身去風氣此乃山柰乎
治心腹冷痛霍亂辟瘴癘惡氣止一切牙痛
海上一字散治一切牙痛三柰子錢麩包煨麝香二字
為末隨左右嚙一字入鼻內口含溫水漱去神效

山人云

薑薑 簇簇



廉薑

本綱廉薑生嶺南沙石中似薑大如羸氣猛近於臭以為
釐其法陳皮以黑梅及鹽汁漬之乃成也



杜若

フミツク

杜衡 楚衡

若芝 杜蓮

櫟子薑 山薑

俗云 藪生薑

トウチヨ

本細杜若人無識者今山中時有之莖葉似薑而有文理根似旋菴根花黃子赤大如棘子中似豆蔻一種有開紫花不結子者

氣味 辛微

神農本草杜若根乃上品治足少陰太陽諸

證要藥而世不知用惜哉


△按杜若竹藪中有之葉似生薑故俗曰藪生薑者是乎其花黃或白色然以杜若為燕字花訓者甚非草之下

美草

美草

山薑


與杜若之山薑名同物異



本綱山薑生南方莖葉似薑而根不堪食花赤色似豆蔻花而小花生葉間作穗如麥粒取其未大開者謂之含胎花以鹽水淹藏入糟中經冬如琥珀色辛香可愛用為贈無以加矣其根如杜若及高良薑其子似草豆蔻今人以之偽充草豆蔻然其氣甚猛烈

根

紅豆蔻



高良薑

今界名

子名紅豆蔻

カウリヤンキヤン

本綱高良薑始出於高良郡今之高州故名之今嶺南諸州皆有之其苗如蘆其葉如薑春末始發初開花抽一幹有大棒包之棒折花見一穗數十莖淡紅鮮妍如桃花色葉重則下垂如葡萄又如火劑瓔珞及剪彩鸞枝之狀每藥有心兩瓣人比之連理也其子似草豆蔻名紅豆蔻辛溫根氣味辛大溫入足太陰陽明經噴逆胃寒者為要藥

人參茯苓佐之溫胃解胃中風邪

凡男女心口一點痛者乃胃脘有滯或有蟲也多因怒

及受寒而起遂致終身良薑以酒洗七次香附子以醋洗七次

焙研如病因寒得者薑末二錢因怒得者薑末二錢寒

怒兼有者各一錢半以米飲加入生薑鹽少許服妙

△按良薑葉似蕺荷而畧細五月開花赤色細形似蕺荷

子



山薑

山薑


山薑

山薑

漏蔻 草果

草豆蔻

ツアウ ナウネ



子

本綱草豆蔻生交趾嶺南亦有之苗似薑其葉似山薑樹若輩根似高良薑二月開花作穗房生於莖下嫩葉卷之而生初如芙蓉花微紅穗頭深色其葉漸廣花漸出而色漸淡亦有黃白色者其結實若龍眼子而銳皮無鱗甲皮中子如石櫛瓣夏月熟時采之暴乾根苗微作樟木香根莖子並辛香也

草豆蔻草果雖是一物然微有不同今建寧所產豆蔻大如龍眼而形微長其皮黃白薄而稜峭其仁大如縮砂仁而辛香氣和滇廣所產草果長大如訶子其皮黑厚而稜密其子粗而辛臭正如斑蝥之氣

本草必讀云二物主治同但草豆蔻氣味和草果氣味猛

草豆蔻辛溫

辟臭

主治心腹脹滿胃弱嘔逆霍亂煩渴香口

草果



本州必讀云草果仁生閩廣八月米收內子大粒成團外

殼堅厚黑皺九資入劑取子剉成氣每熏入

草果辛溫

消宿食立除脹滿辟山嵐瘴氣治癰疽止霍

亂悲心

△按本草以草蔻草果為一物而時珍辨所產及實之形

狀異別之本草蒙堂同必讀愈為二物甚詳焉然花葉

之形狀謂草豆蔻不謂草果似欠明矣蓋其草本一物

而因土地實異者乎實異故氣味亦有和烈之異主治
不同最不可混用之今將來之草果有外皮厚堅草豆
蔻露仁如無外皮而各別也
二物性溫能散滯氣消膈上痰若明知身受寒邪口食
寒物胃脘作疼方可溫散用之如鼓應桴或濕痰鬱結
成病者亦效若熱鬱者不可用

多骨



白豆蔻

ヘウ
テロウ
ケウ

本綱白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及番船
者其草形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋
花淺黃色子作朶如葡萄初出微青熟則變白七月采之
其殼白厚其仁如縮砂仁

氣味辛大溫味薄氣厚

止吐逆反胃除瘧疾寒熱解酒毒其用

有五專入肺經本藥散胸中滯氣去感寒腹痛三

溫腹脾胃四治赤眼暴發去太陽經目內大眦紅筋用

少許五

ちゆくやろ

縮砂密

只云縮砂砂仁

ソツス、ミツ



本綱縮砂實在根下仁藏殼內取密藏之意謂蕊歟生西戎波斯諸國今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉長八九寸闊半寸已來三四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智而圓皮緊厚而皺有粟紋外有細刺黃赤色皮間細子一團八隔可四十餘粒如大黍米外黑色內白而香似白豆蔻仁七八月採之

氣味辛溫

入手足太陰陽明太陽足少陰之七經得白

豆蔻為使入肺得人參益智為使入脾得黃蘗除霍亂

止惡心卻腰痛安胎溫脾胃下氣治虛勞冷瀉宿食不

消赤白洩利腹中虛痛

△按縮砂阿蘭陀市舶將來之東京者為上交趾者其扁

小為者又重多而為下近年碎粒者來名砂仁最良

倭縮砂出於伊豆國是乃鈿木之實也形似桑椹其皮

薄而白色實黑似牽牛子用之充縮砂者甚非也既為

草與木之異故官令禁用之

やくら

益智




イチイ

本綱益智子出崑崙國及交趾今嶺南州郡往往有之其

本草綱目卷之六 木部 藥部 益母草

葉似蕺荷長丈餘其根上有小枝高八九寸莖如竹節二月花連着實五六月熟其子如筆頭而兩頭尖長七八分但今之益智子形如棗核而皮及仁皆似草豆蔻也

其花實皆長穗而分爲三節觀其上中下節以候早中晚禾之豐凶太豐則皆實大凶皆不實罕有三節並熟者以其知歲名益智又云脾主智此物能益脾胃故名益智氣味辛溫治遺精小便餘瀝夜多小便使者益氣安神補不足益脾胃辟口臭治多唾



華菱


華菱 畢勃 阿梨訶陀

本綱華菱生波斯國胡人將來入食味用氣味正如胡椒今嶺南特有之多生竹林內正月發苗作叢高三四尺其

莖如筋葉青圓如叢菜濶二三寸如桑面光而厚三月開
花白色在表七月結子如小指大長二寸已來青黑色類
樗子而長南人愛其辛香或取葉生茹之其根名畢勃莖
似柴胡而黑硬

氣味辛大入手足陽明經走腸胃冷氣嘔吐心腹滿痛
者宜之頭痛鼻淵牙痛要藥然辛熱耗散能動脾肺之
火勿多服

△按本草必讀云葦撥子市有以芥子造之者



蒟醬

きんま

蒟子土葦菱
苗名浮留藤

キイチマン

今云木牟未
蠻語也



本綱蒟醬今夔州嶺南皆有之蔓生似瓠而厚大光澤
其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜及鹽藏而食之彼

人食檳榔者以此葉及炸灰少許同嚼食之云辟瘴癘去胸中惡氣可忌憂其根大如筋此與華撥同類而非一物草菱草生蒟子蔓生也

根葉子 辛溫

正氣溫中心腹冷痛虛瀉霍亂吐逆並治

△按蒟醬暹羅東埔寨交趾等南蠻人每嚼吃之如賞今時煙草盛之器大小不等而貴賤客至則出之如賞今時煙草盛之器大小不等而甚華美也今香盒有稱蒟醬手者乃其器而最重器也倭名抄以蒟醬為木天蓼太未太比和名者甚誤也



肉豆蔻


迎拘勒 肉果

シヨテウケウ

本欄肉豆蔻生胡國及崑崙今嶺南人家亦種之春生苗夏抽莖結實其花及實狀雖似草豆蔻而皮肉之類則不

同類外有皺文而內有斑縵紋如檳榔紋最易生蛀惟缺
乾密封則稍可也去殼只用肉油色者佳枯白瘦虛者劣
凡使須以糯米粉熟湯搜裹豆蔻
於糖灰火中煨熟去粉用勿犯鐵
氣味辛溫
入手足陽明經調中下氣痢疾用此瀉腸為
傷乳泄瀉之要藥土愛煖而喜芳香故肉豆蔻之辛溫
理脾胃而治吐利△按自阿蘭陀舶來

子



補骨脂

破故紙
婆固脂
胡韭子

フウクワツウ

本綱生嶺南及波斯國今嶺外四川合州亦有皆不及番
舶者佳廣南者色赤莖高三四尺葉小似薄荷花微紫色
實如麻子圓扁而黑所以名胡韭子因其子之狀相似非
胡地之韭子也△按自中華及外國皆少將來

氣味辛大

屬火收斂神功能使心包之火與命門之火

相通故元陽堅固

得胡桃

骨髓充實腰疼膝冷囊濕者宜明耳

目與陽事

胡麻良

胡桃屬木潤燥養血血屬陰惡燥故

油以潤之佐破故紙有木火相生之妙破故紙無胡桃

破故紙惡甘草

猶水母之無鯨

又云補腎不若補脾補脾不若補腎腎氣虛弱則陽氣

衰劣不能熏蒸脾胃

衰劣不能熏蒸脾胃

衰劣不能熏蒸脾胃

衰劣不能熏蒸脾胃

衰劣不能熏蒸脾胃



薑黃

ミヨウワリ

迷 寶鼎香

俗云馬蘭

又出于後

ミヨウハテン

本綱薑黃今江廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末花生於根與苗並出穉者不結實根盤屈黃色類生薑而

圓有節八月采根片切暴乾薑黃鬱金莪朮三物相似難辨功用稍異

以扁如乾薑形者為片子薑黃圓如蟬腹者為蟬肚鬱

金並可浸水染色莪朮形雖似鬱金而色不黃

薑黃性熱不冷治心腹結積下氣破血又治氣脹產後

敗血攻心其片子薑黃能入手臂治痛

○蒙筌云鬱金薑黃兩藥實不同種

鬱金味苦性寒色赤似蟬肚形圓狀然鬱金最少薑黃

多今市家惟取多者欺人指大者為薑黃小者為鬱金

○本草必讀云今辨之甚詳也曰

薑黃形禿色深黃氣甚辛作生薑氣味

鬱金有兩種一種形如蟬肚有橫紋色雖黃而淡氣不甚

辛惡又一種小而形瘦兩頭尖細通身皆極細縐紋氣

不辛而微作清香色黃而白如天麻之色

莪朮形大而色兼黃中之青也切片其中邊皆似老薑之

狀但無薑之氣味

△按三物葉花及根形狀氣味各別也而以相近互擇出於其中詭之（三）本朝藥肆尚然焉而自中華來薑黃中擇出皺洞而小者為鬱金稍脹肥者為薑黃故薑黃却少




鬱金

馬迷

イユツシ

本綱鬱金生蜀地及西戎今廣南江西亦有之然不及蜀中者佳（九）四月初生苗似薑黃花白質紅末秋出莖心而無實嶺南者有實似小豆不堪噉其根大小如指頭長者寸許體圓有橫紋如蟬腹狀外黃內赤人以浸水洙色亦微有香氣胡人馬藥用之破血而補名馬迷（又詳右薑）氣味（若寒）性厚（氣）純陰主治血積下氣生肌止血破惡血血淋金瘡（產後血氣上衝心痛欲死鬱金燒存性為末一二錢米醋下調灌服）

△按古菴自暹羅多來故今自廣東及南京福州少來亦皆稱暹羅鬱金又自琉球多來其佳者名御物色濃黃也故紅帛下漆可用暹羅漆櫛紙筆可用琉球丸鬱金漆黃色加酸少許良宜陰乾如直見日則不鮮既為衣後亦不可中於日變色



莪茂

ガゴロ

蓬莪茂
蓬藥

俗為莪朮

本綱莪茂生西戎及廣南今江浙或有之在田野中三月生苗其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸以來頗類藁荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似鷄鴨卵大小不常九月采削去粗皮蒸熟暴乾凡使以醋炒或煮熟入藥取其引入血分也蓋茂在根

下並生一好一惡惡者有毒取之先放羊食羊不食者棄


之

氣味溫若辛


與荆三稜同用之良婦人藥中亦多使

△按自中華處處來又自琉球亦來擇出皺周者為薑黃

荆黑



草石



荆三稜

京三稜

鵝爪三稜

草三稜

黑三稜

石三稜

キンサリン

和名美久里

本綱三稜生陂澤濕地春時叢生葉似莎草極長高二四尺又似芡蒲葉而有三稜夏秋抽莖莖端復生數葉開花六七枝花皆細碎成穗黃紫色中有細子其莖莖花實俱有三稜並與香附之苗葉花實一樣但長大爾其莖尤滑三稜如稜之葉莖莖中有白穰剖之纖物柔韌如藤其苗

下卽魁初生成塊如附子大或有扁者其有根橫貫一
根則連數魁上亦出苗其魁皆扁長多黃黑鬚削去其

鬚皮乃如鯢狀體重者荆三稜也

鷄爪三稜 根之端鈎曲如爪者一名草三稜

黑三稜 形如烏梅而不生細根體輕大小不常其色

黑去皮卽白者

石三稜 形如釵股黃白色葉緣如蒲苗高及尺亦有

三稜四月開花白色如蓼蓼花者

因其形爲名如烏頭烏啄雲母雲苗之類但力有剛柔

各適其用

氣味平苦甘 破血中之氣肝經血分藥而能破氣散結故

能治諸病其功可近於香附而力峻故難久服真氣虛

者勿用

△按三稜多出於土佐紀伊蓋稜嶺四方木也或作稜俗
作木者非也以有三稜名之



香附子

加

莎草雀頭香

候莎水香稜

莎結草附子

地毛水巴戟

地賴根。夫須續根草

本綱香附子古止云莎草不言用苗用根後世皆用其根
 名香附子而不知莎草之名也其草可為笠及雨衣疎而
 不沾故字從草從沙生田野如老韭葉而硬光澤有劍脊
 稜五六月中抽一莖三稜中空莖端復出數葉開青花成
 穗如黍中有細子其根有鬚鬚下結子一二枚轉相延生
 子上有細黑毛大者如羊棗而兩頭尖米得燎去毛暴乾
 切忌鐵

氣味甘平微苦

辛故能散苦故能降其故能和乃足厥陰

肝手少陽

三焦氣分主藥而兼通十二經氣分凡氣病

之總司女科之仙藥也能推陳致新炒黑則止血

生則上行胸膈外達皮膚
童便浸炒則入血分補虛

青鹽炒則補腎氣

酒浸炒則行經絡

得芎藭蒼朮則總解諸鬱

得梔子黃連則能降火熱

得木香則流滯和中

得檀香則理氣醒脾

得沉香則升降諸氣

得伏神則交濟心腎

得茴香破故紙則引氣歸元

△按香附子處處多有之而西國之產細小不佳攝州住

吉之產為上近時京師坂陽以鐵杵確搗碎出之呼曰

砂利香附子以製方簡便人喜求之然所犯鐵杵宜製

其葉不過七八寸非可為雨衣者與水莎草混註者矣

熟則下走肝腎外徹腰足

鹽水浸炒則入血分潤燥

醋浸炒則消積聚

薑汁炒則化痰飲

得參朮則補氣

得歸芩則補血

得紫菀葱白則解散邪氣

得艾葉則治血氣暖子宮

得厚朴半夏則化痰壅積

得三棱莪朮則消磨積塊

水莎草



磚子草



磚子草

せんしき

關子苗

未考何草

附

水莎草

救荒本草云磚子草生水邊苗似水葱而龐大內實稍開碎白花結穗似水莎草穗紫赤色其子如黍粒大根似蒲根而堅實

△按水莎草

和名抄莎草名具具香附苗同名故加水

又似絲莖而不垂刈為雨衣繖甚強秋出小穗似續根草而長二三尺

蚊帳鈎草



菽蓿

麩碌碌

附

未考何草

蚊帳鈎草

救荒本草云救護救護生生水邊下濕地其葉就地叢生似蒲葉而肥短背如劍青樣葉叢中間攢葶上開粉淡紅花攢開如傘蓋狀結子如韭葉莖莢其根如鷹爪黃連樣色如堊泥色其花皆六瓣

△按有俗名蚊帳鉤草者葉穗大共續根草無異但根細髭而無子引易拔其莖三稜小兒裂中間引擴以此鉤蚊帳為戲蓋此可謂香附子草之雄者乎以上四種雖非芳草皆莎草之類故附出于此



延命草

ひきとじ

延命草

俗字

俗云比木平古之

引起之義回生起死之謂歟

△按延命草和州河州及西國山麓有之叢生高二三次方莖葉並似狗齒麻六七月枝杈開小花作細穗結子

其花實似紫蒸而有香其葉味甚苦能治蟲積腰痛
 相傳有行人於山中腰痛垂死者時遇弘法大師登山
 令此草吃之即立瘥後亦試之皆有驗因名延命草



老波安草

芸草音

俗云留字太
 蠻語也

能治瘡疥避惡虫
 俗呼者波安草耳

△按天正年中蠻人此草將來名留字太春生苗似雞腸
 草及蒿類而有刺齒甚臭香至秋不花生穗實似帚草
 莖穗能治瘡疥拆傷惡腫及惡蟲被螫者擣葉傳之置
 床褥下避蚤虱納書篋中蠹不生字彙曰芸香草也可
 避書蠹採寘席下能去蚤虱西雅翼曰仲冬月芸始生
 似邪蒿而香可食者恐此草全沈括曰芸類豌豆作小
 香間微白如粉今謂之七里
 香但此說不當耳可考

ナリ

柰花 秣利

茉莉

沒利 未麗

未利、本胡語、無正字



モツリ

本綱茉莉原出波斯國其性畏寒弱莖繁枝綠葉團大初夏開小白花重瓣無蕊秋盡乃止不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芳香可愛

狗牙

一名雪瓣

似茉莉而瓣大其香清絕者

素馨

一名野悉密花

似茉莉而小其花細瘦四瓣者其

枝幹袅娜黃其花壓油澤頭甚香滑也

畫譜云茉莉千瓣者初開時花圓如珠單瓣者喜肥以米

泔水澆之則花開不絕或皮屑浸米澆之亦可但加土壅

根為妙

五雜俎云北方至吳楚始貴重耳茉莉在三吳地一本千

錢入齋輒三倍酬直而閩廣家家植地編籬與木槿不殊
 古今醫統云以雞糞壅茉莉根則花盛也又將搗雞毛并
 湯沃之冬至放煖房不見風烟則不死畏寒喜日也一云
 不可安床頭引與松



鬱金香

草麝香
 紫迷香
 茶矩摩

與義迷鬱金
 同名異物

本綱鬱金香苦溫出於西域漢貢於鬱林郡今廣西貴州
 葉似麥門冬九月花開狀似芙蓉其色紫碧香聞數十步
 花不實或花已正黃者有之但花色不同種或不一也


くわくわく

噓尸羅

香麻

茅香

ニウ ヒマン



本綱茅香陝西河東州郡有之三月生苗似大麥其莖葉黑褐色五月開白花亦有黃花者有結實者有無實者其根如茅但明潔而長可作浴湯

白茅香

與茅香不同

生安南廣南合諸名香甚奇妙

排草香

出交趾

今嶺南亦或蒔之草根也白色狀如細

柳根

芬烈如麝香人亦用以合香無及之者

迷迭香

出大秦國魏文帝時自西域移植庭中其草修

幹柔莖細枝弱根繁

花結實嚴霜弗凋摘去枝葉入袋

佩之

芳香甚烈也

按以上

香草雖為別種附于此



藿香

兜婁婆香經 恒羅香明金經 迦算香經 鉢多摩羅跋香法華經

本綱藿香嶺南多有之人家亦多種二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六七月須黃色乃可收蓋豆葉曰藿此葉似之故名

氣味辛微温

可升可降入手足太陰經止霍乱心腹痛脾

胃吐逆為要藥開胃口進飲食温中快氣

△按藿香多自廣東來他處亦少有之

青葉藿香

近間將來有葉微青者稱青葉藿香其芬香


甚用合香具但採葉未黃者陰乾製之

倭藿香

今有得真藿香種栽之者春生苗其高二三

尺節節生葉似木芙蓉葉而小長開紫花似夏枯草花

其香有在氣而烈摘葉用糝泥一宿乾武列多種之與
唐藿香無異



零陵香

黃零草

香草

燕草

薰草

薰草

薰草

又有草零陵香見濕草之下

本綱古人祓除以此草薰之故名薰草生零陵地今在湘水
之源山谷故名零陵香今湖廣諸州省有之多生下濕地
葉如麻兩兩相對方莖七月中旬開赤花至香黑實氣如
藤蕪土人以其草編席薦性煖宜人今合香家及面脂澡
豆諸法皆用零陵香婦人浸油飾頭香無以加氣味甘上
達心腹惡氣齒痛鼻塞皆用之多服耗散真氣作喘
△按零陵香廣東交趾咬嚼吧其外南京寧波福州等之
船皆少將來



孩白菊

らんらん

蘭草。香水蘭

女蘭。燕尾香

蘭。暗大澤蘭

水香蘭。澤草

香草。煎澤草

本細蘭草有數名

又名省頭草又名都梁香

生水旁下濕處二月宿根

生苗成叢紫莖素枝赤節綠葉葉對節生有細齒微似菊

葉八九月後漸老高者三四尺開花成穗如雞蓀花紅白

色中有細子是古所謂蘭草也與澤蘭一類二種也今所

謂蘭花乃葉似麥門冬者也世俗至今猶以非蘭為蘭

葉

辛平或云甘寒

辟不祥久服益氣輕身不老通神明

△按蘭草古未有本朝廷寶羊中大寧國姓俞始渡之其

形狀如上說而葉似茗葉而厚故俗謂之茶蘭四五月

開花如蓼穗而不悉開初青後黃色一枝甚香盛止一

日而餘枝亦追開故花盛至數日常好水畏寒如冬月

被紙袋以令不中風寒或時破油蓋漫水其水可灌根



澤蘭

ツエツラン

水香都梁香

虎蘭孩兒菊

虎蒲龍棗

風藥小澤蘭

根名地笑

本綱澤蘭有數名與生澤旁下濕地二月生苗高二三尺

莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶

紫白色草通紫色亦似薄荷花三月采苗陰乾其根紫黑

色如栗根此與蘭草太抵相類

大澤蘭即蘭草也生水旁葉光潤根小紫色五六月盛也

小澤蘭即澤蘭也生水澤葉光微有毛不光潤方莖紫密

葉氣味溫平微婦人方中最為急用足太陰厥陰經藥也

脾喜芳香肝宜辛散雖是一類而功用稍殊正如赤白

茯苓芍藥補瀉皆不同也蘭草走氣道利水道除痰癖殺蟲毒為消渴之良藥

澤蘭 走血分 治水腫消癰毒破瘀血為婦人之要藥

△按澤蘭 一名佐波阿良良木 一云阿加末久佐

倭馬蘭

漢馬蘭

いんらん

紫菊



馬蘭

いんらん

本綱馬蘭湖澤里濕處甚多二月生苗赤莖白根長葉有
刻齒狀似澤蘭但不香爾入夏高二三尺開紫花花罷有
細子其葉似蘭而大其花似菊而紫俗稱物之大者為馬
故名馬蘭及紫菊

△按倭有馬蘭者形狀稍異高二三尺莖一尺以上生一
葉似蓀葉而大長一二尺有光澤叢生根下有花小出
於地上如菊世赤色花葉皆不香近年自琉球國多來

是薑黃也前見于蓋本草所謂馬蘭未見之稱紫菊則
 菊之類此云越前菊雖稍似而其越前菊評見十濕草
 三桠三葉畧似三七草葉而不澤背有細紋微帶紫色
 而與孩兒蘭等之葉大異者也



蘭花

和名不知波加末

本綱近世所謂蘭花非古之蘭草蘭草乃今其葉如麥門
 冬而潤且軟長及一二尺無枝無莖四時常青花黃綠色
 中間雜上有細紫點春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭
 色淡開時滿室盡香與他花香又別但花香葉乃無氣質
 弱易萎不可刈佩真蘭草必花葉俱香而燥濕不變有枝
 故可刈佩

五雜俎云蘭最難種太密則疫太疎則枯太肥則少花太瘦則漸萎太燥則葉焦太濕則根朽久雨則腐久曬則病好風而畏霜好動而惡潔根多則欲剷葉茂則欲分根下須得良壤髮實之以防蟲蝎清晨須用櫛髮油垢之手摩弄之得婦人手尤佳故俗謂蘭好淫也須置通風之所竹下池邊稍見日影而不受霜侵又有別種

歲蘭

其花同而葉稍異其開必以歲首故名

木蘭

去皮不死又有鶴蘭木蘭朱蘭賽蘭玉蘭則各種徒冒其名耳

△按蘭花最不忍寒暑風雨故多鉢植之唯豫州大洲紀州若山及遠列作圃畦種之能茂盛長二三尺者多秋芳者即真蘭花也春芳者即春蘭也

黑蘭

長尺許葉花並似秋蘭而小其花黑赤色

南京蘭

葉一二尺濶七八分花似秋蘭而香淺

白蘭

葉似秋蘭而弱秋開青白花香太深

隱蘭

葉端緣限白其花似秋蘭而香太深

新云 乃衣子之類也中多香條臨前以之無の形式



春蘭

わろり

俗云保久利

△按春蘭葉似蘭而細短長不過七八寸春月開花亦似秋蘭香稍淺冬月采其根似慈姑能治戰瘡



蕙蘭

けいらん

紫蕙 黄蕙

△按零陵香異名爲蕙草與此不同

あらん

紫蕙即紫蘭

△按蕙蘭立莖生葉似秋蘭而潤薄色淡青有縱理三四月
月莖端開白花不香其根團扁多鬚

黃花者俗呼名黃蕙以愛其花

紫花者名紫蕙又曰紫蘭

此乃山草之白及乎可考

草本花詩譜有朱蘭蕙蘭之二種形狀稍似雖得蘭名
無芳香但花莖狀以畧似蘭後人稱之耳




銀蘭

きんらん

△按銀蘭葉似小玉簪葉而莖長三四月抽莖開白花似
蘭花又有紫花者其葉陰乾以清油傳小兒草瘡

そん

青蘭



△按青蘭葉似帚草而莖梢葉間生青花似蘭而不香

がらん

正字未詳

棒蘭



△按棒蘭圓莖無葉頗似箸故名棒蘭五六月枝杈之間生花似蘭花而小有微香

ふうらん

挂蘭

仙草



風蘭

三才圖會云風蘭不土而生小籃貯掛樹上人稱仙草細花微香

五雜俎云風蘭根不着土叢蟠木石之上取而懸之簷際時為風吹則愈茂盛其葉花與家蘭全無異也


△按風蘭深山有之根板等幹間多有之葉形似万年青而細小其長二三寸六月抽一莖開小白花末曲微香

奈吾蘭 風蘭之類形相似葉長三四寸亦不着土能活開黃花香自薩摩出之曰有深谷難採

琉球風蘭 葉長尺許似蘭而柔抽莖開小白花微有風蘭之狀蓋此觀音草之白花者也

香菜 香葉 香草 蜜蜂草

香薷 音 秉



ヒマ ジウ

本綱香薷有野生者有家蒔者三月種之以充蔬品方莖
尖葉有刻缺頗似黃荊葉而小九月開紫花成穗有細子
有大葉小葉二種丹溪惟取大葉者為良而細葉者香烈
更甚今人多用之其細葉者即石香薷也

石香薷 山中石上多有之莖葉更細如落帚葉莖僅高
數寸乃一物但隨所生再生厓石故葉細可通用之
氣味溫辛微有微上徹下之功解暑利小便又治水種甚

捷治暑病以香薷飲為首藥

凡暑有乘涼飲冷致陽氣為陰邪所遏遂病頭痛發熱
惡寒煩躁口渴或吐或瀉或霍亂者宜用此藥以發越

本草綱目卷之六 香薷

陽氣散水和脾

若飲食不節勞役作喪之人傷暑大熱大渴汗泄如雨煩躁喘促或瀉或吐者乃勞倦內傷之證必用東垣清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火益元可也若用香薷之藥是重虛其表

△按香薷今有長刀香薷葉香薷二種有實如穗莢者謂之長刀惟葉而已謂之葉香薷是所謂大葉細葉如二種之差皆用後



爵牀

香薷

爵麻 香薷 赤眼老母草

本綱爵牀原野甚多似香薷而大或如荏苒且細方莖對節與大葉香薷一樣但香薷搓之氣香爵牀搓之不香微臭

以此為別

氣味鹹微辛

治腰脊痛不得攣牀倪仰艱難可作浴湯

又能療血脹下氣


赤車使者一名小

錦枝

爵牀之類但根紫赤如檮根以之別

けいぐい

假蘇 薑芥 鼠糞



荊芥

キレキマイ

本綱荊芥原是野生今為世用遂多栽蒔二月布子生苗炒食辛香方莖細葉似獨帚葉而狹小淡黃綠色秋開小花作穗成房如紫蘓房內有細子如葶藶子狀黃赤色連穗收采用之

氣味辛苦

俱薄浮外陽也肝經氣分藥也其功長於祛

風邪散瘀血破結氣消瘡毒風病血病瘡病為要藥最

產後聖藥
及一切無鱗魚



薄荷

ホホウ

くみく

菰蔴 吳菰蔴

蕃荷菜

南薄荷

金錢薄荷

本綱薄荷古方稀用近世治風寒為要藥故人家多蒔之
二月宿根生苗清明前後分之方莖赤色其葉對生初時
形長而頭圓及長則尖其莖葉似荏而尖長經冬根不死
凡收薄荷須隔夜以糞水澆之雨後乃悉刈收則性涼不
爾不涼也

貓食薄荷則醉故治貓咬取其汁塗之有效又曰薄荷貓
之酒也大虎之酒也桑椹鴈之酒也茵草魚之酒也皆物
相感醉爾

氣味 辛凉

俱薄浮而升陽也故能去高巔皮膚風熱又

能引諸藥入營衛故能發散風寒入手大陰肺足厥陰

肝頭痛頭風眼目咽喉口齒諸病小兒驚熱及瘰癧瘡

疥為要藥又治骨蒸勞熱

△按薄荷多出於山城又一種有葉稍厚香甚者今人刻

薄荷葉以代煙草吃烟為咽喉口齒藥

かきとゆ

胡薄荷

地錢草

連錢草

海蘚

積雪草

ツイレヌ、ツアラ

加岐止平之



本綱積雪草宮院寺廟磚砌間有之葉圓似錢尤潔微尖

葉葉各生故今謂之連錢草莖細而勁引蔓搏地香如細

辛不見開花

氣味 苦寒或平

治大熱惡瘡癰疽丹毒搗汁傳之又治小

兒寒熱腹內熱結擣汁服之

△按積雪草無枝朶圓葉一光潔引蔓可潛籬俗名籬通也本草必讀積雪草之圖有枝朶者非也亦倭名抄以之訓豆保久佐者非也



壺草

此草

正字未詳

豆保久佐

△按壺草生田家溝際葉圓一莖一葉而無枝蔓及花實高六七寸葉大一寸頗似落而小者也今人用積雪草壺草共入小兒方藥中云能治胎毒蓋以積雪草誤為壺草之訓竟二物混用矣

赤蘓 桂荏

紫蘓



ツウツウ

本綱紫蘓以二三月下種或蒔子在地自生其莖方其葉
 團而有尖四圍有鉅齒肥地者面背皆紫瘠地者面青背
 紫其面背皆白者即白蘓乃荏也紫蘓嫩時采葉和蔬茹
 之或鹽及梅酒作菜食甚香五六月連根采收以火煨其
 根陰乾則經久葉不落八月開細紫花成穗作房如荊芥
 穗九月半枯時收子子細如芥子而色黃赤亦可取油如
 荏油打燈甚明又云蘓子油能柔五金入石凡地畔近道
 可種蘓以遮六畜

氣味辛溫

近世要藥也味辛入氣分色紫入血分

同陳皮縮砂則行氣安胎

同藁香烏藥則溫中止痛

本草綱目卷之九

卷之九

卷之九

卷之九

同香附麻黃則發汗解肌

同當歸川芎則和血散血

同木瓜厚朴則散濕解暑

同枳殼桔梗則利膈寬腸

同杏仁萊菔子則消痰定喘

不可同鯉魚食生毒瘡

今人朝暮飲紫菀湯甚無益其久則泄人真氣焉若

脾胃寒人多致滑泄往往不覺

紫菀子

氣味辛溫與葉同功發散風氣宜用葉清利

上下則宜用子能下氣除寒溫中

回回菀

一名花紫菀

並與紫菀無異

其葉細齒密紐如剪成之狀香色莖子



荏

音

魚


白菀

俗云惠

本綱荏，形狀與紫蘓無異，但面背皆白者，即白蘓，乃荏也。其子可取油。

△按荏，關東多種，蒔用子，搾油為燈油，又引傘挑燈，雨衣等不黻，而能凌雨，又煉代漆。

造法：密色僧大滑石中，枯礬少入油，以文火煉用，以燈心寸許，植之不倒為度。髹物、白粉、辰砂、綠青等，和調其色鮮明。



水蘓


雞蘇 香蘇
芥蘓 芥苺
龍腦 薄荷

シイソウ

本綱水蘓，三月生苗，方莖，中虛，葉似蘓，葉而微長，密齒，面皺，色青，對節生，氣甚辛烈。六七月開花，成穗如蘓穗，水紅色穗，中有細子，形如荏芥子，可種，易生，宿根亦自生，伏地。

本草綱目卷之二十一 菜部 薺薺

者苗高四五尺好生水旁故名
 氣味溫_{辛微}專於理血下氣清肺辟惡氣治口臭止吐血
 衄血咳血唾血下血血淋



薺薺

くささいい 臭薺。青白薺

本綱薺薺與水薺一類二種處處平地有之其形似水薺
 而臭似白薺而青但水薺葉有鴈齒氣香而辛薺薺葉稍
 長其上有毛氣臭山人茹之

本草綱目卷之二十一 菜部 薺薺
 其干也取新
 本綱薺薺與水薺一類二種處處平地有之其形似水薺
 而臭似白薺而青但水薺葉有鴈齒氣香而辛薺薺葉稍
 長其上有毛氣臭山人茹之



麝香草


びんがくし

俗稱 未詳

△按麝香草高尺餘葉似馬薊而厚潤微有麝香氣而甚於茴香葉之香三月開花單葉淺紅色而小

しんれんろ

俗稱 紅字



曼連樓

△按曼連樓高尺有餘枝極多葉纖小似青蘭葉畧似橘木葉而有香三四月開小白花最繁多



李處總

八一
六九

九十四之本

濕草類

倭漢三才圖會



本居

總

八一
六九

AE
4
.T4
1824
V.94:1

和漢三才圖會卷第九十四之本目錄

濕草類

菊きく

濱菊しんきく

著めど

茵陳いんちん

白蒿しろくさ

馬先蒿ばせんこう

野菊のぎく

紫衣菊あざきく

艾い

青蒿せいこう

角蒿かくこう

益母草やくもそう

佛頭菊ぶつとうきく

菴蘭いんげん

千年艾せんねんい

黃花蒿わうかう

牡蒿むかう

薇銜いけん



夏枯草 なぐさ

旋覆花 せんぷく

鴈來紅 えんらいこう

白粉草 はくふくさ

苦芙 くふ

苧麻 しよま

胡蘆巴 ころふ

藁耳 かみみ

劉寄奴 りゅうきよ

青葙 せいぎやう

鷄冠 けいこ

薊 あざみ

漏蘆 ろうろ

苘麻 しやうま

馬藺 ばりん

稀莶 せせん

曲節草 まげくさ

桃朱術 とうしゆ

紅花 べいか

續斷 ぞくだん

飛廉 とれん

大青 だいせう

牛蒡 ごやう

天名精 てんめい

箬おれわー

芭蕉こせを

蘘荷わうか

石龍芻いりゅう

地黃ぢこ

女苑にょえん

禪庭花ぜんてい

鴨跖草もろゑ

蘆あし

美人蕉いじんせう

麻黃まわう

粽心草ちやう

牛膝ごうせつ いのち

麥門冬ばくもんとう せうがひけ

翁草おんそう

葵あひ

萩はぎ

檀特花だんとく

木賊もくさく

燈心草とうしん みたぬ

紫苑しえん みのり

萱草くわんそう こすき

淡竹葉たんちやく

蜀葵しやくゐ

錦葵 こきんぎ

龍葵 りゅうき

蜀羊泉 しやくやうせん

迎春花 いんしやうかう

地雷草 ちがいのくさ

巨辨草 こべんさう

菟葵 うみぎ

龍珠 りゅうしゆ

鹿蹄草 りくたいさう

鼠麴 しゆく

常盤石菊 とこひしききく

黃蜀葵 わうしやくき

酸漿 せんしやう

敗醬 はいしやう

决明子 けつめいし

仙靈草 せんれいさう

のこり

あひす

和漢三才圖會卷第九十四之本

攝陽 城醫法 寺島良安 尚順編

濕草類



菊

同 薊

節華 女華 女節
日精 女莖 更生
金盞 治癰 固盈
陰成 傳延年

唐音
キヨ

本綱菊凡百種宿根自生其莖葉花色品品不同有千葉
單葉有心無心有子無子黃白紅紫間色深淺大小之別
其莖有株蔓紫赤青綠之殊其葉有大小厚薄尖禿之異
又有夏菊秋菊冬菊之分嫩葉及花皆可燉食菊之無子者
謂之牡菊燒灰撒地中能死龍蛇大抵惟以單葉味甘者

入藥苦者不為藥

氣味甘平

凡菊得金水之精英能益金水二臟補水所以制火益金所以平木木平則風息火降則熱除用治諸風頭目黃者入金水陰分白者入金水陽分紅者行婦人血分皆可入藥至末悶不香有功力最為上品宜乎前賢比之君子

古今醫統云菊夏間分栽不宜太密密則花頭小宜栽黃白二種可入藥秋後開花者尤佳家庭中植之甚有逸趣且兆吉祥以其晚節凌霜之操非群花之可得而班也種菊有六要第一向陽遮護第二水雪冬養其根第三春苗乃苗第四高其畦寬其溝歲易其地第五加新土去舊土第六治其苗用小竹杆立其傍以草寬縛之其莖不曲第七培乾土於久雨防爛其根第八削傍枝以植正幹第九朝灌清水沃其根而後用糞澆培以厚本又黃白二菊各去其半幹而合之則花黃白相半第十云春分種時去舊根可嫩根栽而如留舊根則生菊皆敗

畫譜云俗曰二月十二日百花生日之候分種以肥土壅之令枝梗壯茂花象乃大

△按仁德天皇七十三年始渡異朝青黃赤白黑菊種也

異朝者百濟國也其黑色者未審今亦有紺菊此乃近年所出之一種也

今有稱五菊者鵝毛玉牡丹並御愛色醉楊妃京太白

共白色是等唐種始於苑前博多栽之今處處移種而帶微赤

甚難育不茂盛凡菊子極細或不見故古者分根挿枝


爾近年覺仲春蒔花瓣而生出數多珍花今得名者徑

尺許為尺我け...

皆味苦一種有全甘者而鮮藥肆唯用野生者出於河列

乃

苦蕒



野菊

丑、キヨ

本綱野菊處處原野極多與菊無異但葉薄小而多尖花小而蕊多如蜂窠狀菊甘而是苦語曰苦如薏者是也

氣味苦辛溫有小毒

治癰疔瘰癧煎酒服以渣傳之

△按野菊雞兒腸草二物相似而葉畧薄小多尖味甚苦

其花有單葉有千葉色黃者野菊也

雞兒腸草葉不甚尖無切紋而味不

苦其花白微帶紫色採藥人用金剛山野菊花之真菊花者非也

醫擇家種單葉黃菊花可藥入用張果醫說亦論此事用者宜擇取真菊花

其二葉形



佛頭菊

俗云達磨草

△按佛頭菊直莖無枝桠葉團有段刻淺綠色厚柔而不潤文理如皺異常數十葉叢叢抱莖生狀似濱菊九月開白花單葉頗似菊

くまざく

俗稱本名詳

濱菊



△按濱菊莖葉共似佛頭菊而葉狹長有刻齒深綠色甚潤滑九十月開白花似菊而大厚

あゑざく

加賀菊

かぎざく

越前菊

紫衣菊

貴布襦菊

以上皆俗稱

本名夫以詳

或云之字女伊



△按紫衣菊莖不高葉似菊而不似

此菊葉長向內外稍垂三

極尖勁八月開花八重淡紫色賀州越州及城州貴布

襦社邊谷多有之俗呼曰紫衣菊

此菊或以芳草部馬蘭為非也葉大異



菴蘭


ひこしきとふ 覆間

菴蘭蒿

俗云比木與毛木

アニリニイ

本綱菴蘭葉似菊葉而薄多細了面背皆青高者四五尺
 其莖白色如艾莖而粗八九月開細花淡黃色結細實如
 艾實中有細子其老莖可以蓋覆菴間故名極易繁衍
 子氣味溫微入足厥陰經血分治瘀血及產後血氣痛
 △按菴蘭原野有之用莖為帚耐久



著

尸音

めいしき

和名 女止

本綱著神草也蒿屬草多壽者而所生之處獸無虎狼
無毒螫龜千歲而靈著百年而一本生百莖也滿百莖者
其下必有神龜守之其土常有青雲覆之天下和平王道
得而著莖長至丈叢生滿百莖方今取著者八十莖已上
長八尺者即已難得但得滿六十莖以上長六尺者即可
用矣天子著長九尺諸侯七尺太夫五尺士三尺如無著
揲卦或蒿或荆可以代之其六十莖者亦不常有也今蔡
州上蔡縣白龜祠旁有之如蒿作叢高五六尺一本十二
十莖至多者五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有
花出於枝端紅紫色形如菊花結實如艾實苦酸平益氣
充肌膚明目聰慧先知

實氣味

平苦酸


益氣明目聰慧先知久服不饑不老

△按著和州吉野丹波龜山及比叡山等靈地山谷有之
太抵一二十莖而五十莖者亦希有

胡枝花

下卷於莖葉畧相似故著呼曰女止波木

本草綱目卷之四 艾



艾 育 凝

冰臺 繫草

黃草 艾蒿

和名與毛木 俗云毛久左

入俗用蓬字蓬蒿乃總名類多

本綱艾生中原田野二月宿根生苗成叢其莖直生白色
高四五尺其葉四布狀如蒿分爲五尖極上復有小尖面
青背白有茸而柔厚七八月葉間出穗如車前草穗細花
結實累累盈枝中有細子霜後始枯其莖可代著策及作
燭心皆以五月五日連莖刈取暴乾收葉用灸百病陳久
者最良治令細軟如綿謂之熟艾一灼謂之一壯以壯人
爲法也以蘄州者爲勝天下重之謂之蘄艾相傳他處艾
灸酒壘不能透蘄艾一灸則直透徹爲異也
荆楚歲時記云五月五日采艾爲人懸於戶上可攘毒氣
博物志云削冰令圓舉而向日以艾承其影則得火

葉

苦而辛生
溫熱熱

可升可降陽也入足太陰厥陰少陰之經

香附子為之使春月采嫩艾作菜食或和麵作饅飽如

彈子吞三五枚以飯壓之治一切鬼惡氣凡作煎止崩

漏凡入丸散難為粉古今醫統云用糯米濃飲揉艾葉

乾一成餅晒乾或瓦炕研成粉或入白茯苓少許同碾

即時可作細末亦一異

△按艾江州騰吹山及下野標地原之產最佳此與中華

蕪州之艾相比者手凡貯印信朱及墨者搗艾千杵去

粉查令白如綿用和印肉則經久不乾


此艾之功用甚多如治一切瘡毒腫痛如瘡口不斂者用艾末和油塗之即斂如治一切風濕骨痛如腰痛膝痛用艾末和酒塗之即愈如治一切瘡毒腫痛如瘡口不斂者用艾末和油塗之即斂如治一切風濕骨痛如腰痛膝痛用艾末和酒塗之即愈

今摘艾嫩葉和米粉作草餅上巳日為恒例和漢共同

蓋此始於周幽王者恐附會也但據避一切惡氣之事

而已

本草綱目



タニシクンギ


千年艾

本綱千年艾生山中小莖高尺許其根如蓬蒿其葉長寸餘無尖極回青背白秋開黃花如野菊而小結實如青珠丹頃狀葉不似艾而作艾香揉之即碎

んらん

茵陳蒿因塵

茵陳



イン

チ

本綱茵陳蒿生丘陵坡岸上此雖蒿類經冬不死至春又更因舊苗生其莖如艾其葉如淡色青蒿而背白葉岐繁

細而扁整九月開細花黃白色結實大如芥子花實並與芥

蔕花實相似亦有無花實者

莖葉

微寒

入足太陽經主治風濕寒熱邪氣熱結黃疸

又治遍身風痒

生瘡疥用茵陳煎汁洗之瘡

△按茵陳畿內多小石河原有之然茵陳與青蒿混雜用

之甚誤也

茵陳葉面青背白

有細小岐而有香氣

細無岐而有臭香



青蒿

蒿音

いゝゝ

草蒿

方漬

香蒿

佩蒿

ツイ ハアロ

俗云臭クサミ又云臭クサミ胡コ藿ホ蒿蒿

本綱青蒿生川澤二月生苗莖粗如指而肥軟莖葉色並

深青其葉微似茵陳而面背俱青其根白硬七八月間開

細黃花頗香結實大如麻子中有細子此葉色深青如松

新編本草綱目卷之六 雜草類 黃花蒿

檜之色至深秋猶青其氣芬芳

葉莖根子

若寒

少陽厥陰血分藥主治疥癬痂疥惡瘡殺

蟲治留熱在骨節間明目治骨蒸熱勞凡使子勿使葉

使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾用葉使宜製

按青蒿處處河原多有之六月六日採之調神麴




黃花蒿

俗云河原文

かりくろき 臭蒿

ハシ ハア ハアウ

本綱此蒿與青蒿相似但色綠帶淡黃氣味辛臭不可食
人家采以罨醬黃酒麴者是也




白蒿

繁
商音
萋蒿

ヘツハアウ

本綱曰蒿最易繁衍故名蒿有水陸二種其形狀相似但陸生辛薰不及水生者香美再鹿食九種解毒之草白蒿其一也二月發苗葉似嫩艾而岐細面青背白其莖或赤或白其根白脆采其根莖生熟菹曝皆可食益嘉蔬也或調酸滷萋蒿為壅不沾不薄而甘美甚益人


ほのふり



角蒿

キヨハアウ

本綱角蒿葉如青蒿花如瞿麥紅赤大約徑三四分花
 罷結實長二寸許微彎似蔓菁青黑而細秋熟能治口齒
 瘡絕勝不拘大人小兒以角蒿灰塗之有汁吐出一宿效



牡蒿

齋頭蒿

ノロハナ

本綱牡蒿三四月生苗其葉細薄而無光澤扁而本快末
 參有充岐嫩時可茹鹿食九草此其一也秋開細黃花結
 實大如車前實而內子微細不可見故人以為無子乃牡
 之名以此也諸蒿葉皆尖此葉獨參而充
 葉甘微充子肌膚益氣令人暴肥不可久服血脉滿盛

マシカ

馬新蒿


馬矢蒿

馬先蒿

練石草

爛石草

虎麻



本綱馬先蒿生川澤其氣如馬矢故名矢字誤為先又為新二月始生七月開花似胡麻花而紫赤八月生角似小豆角銳而長也

氣味平苦治女子帶下利小便又治癰病墮落身體痒痛此草炒壽末每服方寸匕食前溫酒下

子形



益母草

貞蔚 猪麻

摧推野天麻

火秋 鬱臭草

苦低草 夏枯草

マムソウ

老蔚 益明

本綱近水濕處甚繁春初生苗如嫩蒿入夏長三四尺莖
方如黃麻莖其葉如艾葉而背青一梗三葉葉尖岐寸許
一節節節生穗叢簇抱莖四五月間穗內開小花紅紫色
亦有微白色者每莖內有細子四粒粒大如同蒿子有三
稜隅色夏至後即枯故多夏枯草別有夏枯草療婦人有功極名
子甘微莖葉辛微花微苦根甘手足厥陰經藥
也白花者入氣分紫花者入血分治婦女經脉不調胎
產一切血氣諸病妙品也時珍常以之同四物香附諸
藥治人獲效甚多

若治厥陰經血分風熱明目益精調女人經脉則單用芎
藭子為良

若治腫毒瘡瘍消水行血婦人胎產諸病則宜莖葉根並
用為良蓋其根莖花葉專于行而子則行中有補故也
有濟陰返童丹能治胎前產後諸疾危證神效忌鐵器
△按益母草莖似胡麻而葉似麻俗云女木其葉梗兩兩對

生而一層指東西一層指南北更為十字節節著小花

びわん

鹿銜

麋銜

承膏

鹿胎

薇銜

吳風草無顛
無心草



ワイエン

本綱薇銜其葉似茗藋有毛叢生莖赤其花黃色根赤黑
色此草有風不偃無風獨搖則吳風亦當作無風乃通也
鹿有疾銜此草即瘥也

莖葉

若平

主風濕痺歷節痛

婦人服之

乃素問所用治

風病自汗藥而後世不知用之誠缺畧也

△按薇銜葉莖能似益母草其黃花既散則白而如絮其
子小長而黑色有刺其中子細小

三才圖會



本草必讀

夏枯草

かごそう

燕面 乃東

名 鐵色草

和名 宇流木

今云 宇豆保草

ヒマ、タウツナリ

本綱夏枯草原野間甚多苗高一二尺許冬至後生葉其葉對節生似旋覆葉而長大有細齒背白其莖微方三四月開花作穗多故莖端作穗長一二寸穗中開淡紫小花一穗有細子四粒此草夏至後即枯蓋稟純陽之氣得陰氣則枯也嫩苗瀹過浸去苦味油鹽拌之可食

莖葉

苦辛寒

大治瘰癧散結氣補養厥陰血脉退寒熱治

目珠疼至夜則甚者神効

兩點苦寒藥反甚者夏枯草二兩香附子二兩甘草四錢為

調服

△按夏枯草出攝河州者最良丹波次之穗形似矢筒之故俗曰宇豆保草



本草必讀



三才圖會

劉寄奴

金寄奴
烏藤菜

リウキイノヤ

本綱劉寄奴一莖直上葉似蒼朮尖長醜澀而深青背淡
 共莖似艾蒿九月莖端分開數枝一枝攢簇十朶小花白
 瓣黃蕊如小菊花狀花罷有白絮如苦蕒花之絮其子細
 長亦如苦蕒子莖葉花子皆用入藥
 氣味苦溫能破血下服多服令治產後餘疾止金瘡血

極效風入瘡口腫痛細末搽之即止

南史云宋高祖劉裕小字寄奴微時伐荻新州遇一大蛇射之明日往聞杵臼聲尋之見童子數人皆青衣於榛林中搗藥問其故答云我主為劉寄奴所射今合藥傳之裕曰神何不殺之曰寄奴王者不可殺也裕叱之童子皆散乃收藥

而及每遇金瘡傳之即愈人因稱此草為劉寄奴草




曲節草

六月淡
綠豆青
六月霜
蛇藍

キヨツヅツツア

本綱曲節草四月生苗莖方色青有節葉似劉寄奴而青
軟秋着花似薄荷結實無角
莖葉甘平
治癰腫發背拔毒同甘草作末服

三才圖會葉如菊



本草必讀葉如柳

旋覆花

金沸草 夏菊
金錢花 益庚
滴滴金 戴堪

ツシヘウハ

俗云平久留末

本綱旋覆花近水下濕地有之二月以後生苗大如紅藍而無刺長一二尺以來葉似柳莖細六月開花狀如金錢菊小銅錢大深黃色水澤邊生者花小瓣單人家栽者花大莖簇蓋壤瘠使然其根細白極易繁盛或云葉如大菊又云葉如艾蒿花氣味鹹溫有毒手太陰肺手陽明大腸藥其功行水下

氣通血脉

△按旋覆花葉似柳花似菊而黃色大如錢人家栽者花大數花攢開又有千葉者以野生單瓣者可藥入用也攝州之產最佳江州者次之

太平廣記云筋斷須續者取旋覆根絞取汁以筋相對以汁塗而封之即相續如故蜀兒奴逃走多斷筋以此續之百不失一

のけいこ


野雞冠 葦蒿

崑崙草 草蒿

雞冠 莧

青箱

子名 草决明



ツイシ

和名 宇未佐久
云阿萬佐久

本綱青箱生田野間嫩苗似莧可食長則高三四尺苗葉花實與雞冠花一樣無別但雞冠花穗或有大而扁或圓者此則稍間出花穗尖長四五寸狀如兔尾水紅色亦有黃白色者子有穗中與雞冠子及莧子一樣也

青箱子

寒 苦 微

足厥陰肝經藥治熱毒衝眼赤障青盲翳

腫今人多用治眼故本經稱草决明

別有决明子與此非一物

蒙筌云青箱子名草决明功專治眼特假別名以美之非

真爲决明子也猶沙參一名知母

一名龍眼一名益壽一名同而實異

也且別條所載决明子藥粒狀稍大主治尤優此草决明

△按青箱俗云野雞頭也攝和二州田野多有之

たうろとあつ 陶朱術

桃朱術



本綱桃朱術者青菴之一種生園中細如芥花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日乃收子帶之令婦人爲夫所愛色黃花

△按桃朱術初生似青菴而葉似野蜀葵其花黃或白或紫似百合花而小子作角中子白

かきつりのか 老少年

十樣錦

鴈來紅

俗云加未豆加乃花



かきつりのか

本綱馬來紅莖葉穗子並與雞冠同其葉九月鮮紅望之如花一種六月葉紅者名十樣錦

畫譜云枝頭亂葉有紅紫黃綠四色故名十樣錦其鴈來紅以鴈來而紅老少年已秋深脚葉紫而頭紅老少年頂黃而葉綠收子撒於熟肥土中加毛灰蓋之恐防蟻食二月中即生

花葉

加毛灰蓋之恐防蟻食



雞冠

けいこ

俗云雞頭

キイクン

本綱雞冠三月生苗入夏高者五六尺矮者纔數寸其葉青柔頗似白莧菜而窄解有赤脉其莖赤色或圓或扁有筋起六七月稍間開花有紅白黃三色其穗圓長而尖者

如青蒨之穗扁卷而平者如雄雞之冠花大有圍一二尺者層層卷出可愛子在穗中黑細光滑與莧實一樣花最耐久霜後始焦

畫譜云有掃帚雞冠有扇面雞冠有紫白同蒂名二色雞冠扇面者以矮為佳掃帚者以高為最然下子時撒高則高撒低則低也若三色雞冠一聚同蒂色分紫白粉紅亦奇種也俱收子種

苗子花甘涼主治痔及一切血病如赤白下痢赤用紅

花白用白花煎酒服

△按雞冠有數種絳雞頭花縮如紅線矮雞纔五寸花大

色いのち 紅藍花黃藍

俗云々禮奈伊

紅花

吳藍之界言



ホヲハア

本綱紅藍花漢張騫始得種於西域今處處有之人家場
園所種二月八月十二月皆可以下種雨後布子于熟地
如種麻法初生嫩葉苗亦可食其葉如小薊葉至五月開
花如大薊花而紅色花下作株彙多刺花出株上入晨乘
露采花采已復出至盡而罷株中結實白顆如小豆大其
花暴乾搗熟以水淘布袋絞去黃汁又搗以酸粟米泔漬
又淘又絞袋去汁以青蒿覆一宿晒乾或捏成薄餅陰乾
收之以染布帛為真紅又作燕脂可飾婦人面色
花平而甘
苦溫肝經血分藥入心佐當歸生新血多用破留
血行血少用養血

紅藍

紅藍花俗傳云申日下種能茂盛羽州衣上及山形之

產為良伊賀筑後次之豫州今治及攝播二州之產又
次之衣上紅餅大如錢西國紅餅圓徑三四寸許深工
家用二三日漫水能碎盛布袋去黃汁五七次以所去

黃汁爲絹布下染之用。五六日正紅能漫後盛布袋入
早稍藁灰汁少許絞則真紅悉出。和米醋用染着干太
布謂之屬布。乾收用時和灰汁少許絞出則悉脫出。冰
器更放梅醋少許。卽濃紅凍成。俗云加臘月製者最佳
以剥毛塗磁器貯之。爲婦人飾唇之用。或染絹布色甚
鮮明。謂之寒紅。大優于燕脂。

燕脂

一名輕赭

本綱燕脂其始起自紂以赤花汁凝作之調脂飾女面。本
產燕地故名。爾但有四種。

一種以紅花汁染胡粉而成。飾婦人面色。

一種以山燕脂花汁染粉而成。蓋山燕脂山間有花叢生
其葉類藍正月開花似蓼如紅花者也。

一種以山榴花汁作成者。

一種以紫釧深綿而成。謂之胡燕脂。又落葵子亦可取汁。

和粉飾面

落葉子
見菜部

大抵皆可以入血病藥用

飾女面輕粉
詳干容飾



白粉草

正字未詳
於之呂
以乃木

△按白粉草春生苗冬枯高二三尺叢生葉淡青柔似白雞頭葉微小團其花朝以後萎至夕陽開深紅色五出單葉莖長一寸余亦紅花中出紅莖細如絲葉結子灰黑色皺如胡椒而中滿白粉抹之塗婦人面光澤優於鉛粉俗呼曰白粉草其葉揉汁傳折傷及疥癬小瘡皆良蓋剥皮取用白粉數泥齊佳



かきあき

薊

計音

刺薊 山牛蒡

雞項草

千針草

野紅花

和名阿佐美
俗云冒作

本綱有大薊

一名馬薊 又名虎薊

小薊

一名貓薊

之異二月生苗二三寸

時佛根作菜茹

食甚美雖有微芒不害人四月高尺餘多

刺心中出花頭如紅藍花而青紫色又花狀如鬚其莖似

雞之項其根似牛蒡根但大薊高三四尺葉綴小薊高一

尺許葉不綴以此為異

氣味甘溫

能破血止吐血崩中下血但大薊兼療癰

腫小薊專主血而不能消腫也

△按薊花蒼紫色人家種之今有正白正紅正紫者或白

而末紅或紅而者以為珍人所愛也其異品出於子種

蓋野生之者春月採之煮熟而拌糠堪飼馬



續斷

くぐん

屬折 接骨

龍豆 南草

和名波美

又云於仁乃夜加良

本綱續斷三月以後生苗幹四稜似苧麻葉兩兩相對而生四月開紅白花似益母花根如大薊赤黃色今所用以色赤而瘦折之有烟塵起者為良

氣味微苦平

向裏有硬筋去之刻以酒浸一伏時焙乾用

地黃為之使惡雷丸

主治金瘡癰瘍折跌續筋骨故名之治婦人

產前後一切病

硬作寒作熱續斷皮一握水三升煎

無所忌此藥救產後垂死

又令平胃散能止血痢

△按續斷多出於攝州者佳

めはるみ

鉤英 苦苣

苦苣

和名加萬奈
一云加美於
古之奈



多 八石ウ

俗名阿佐美

本綱苦苣濕地有之凡物種曰苣此物嫩時可食故以
名之其莖圓無刺大如拙指中空莖頭有臺似薊有白毛
清明節采其嫩苗食之云一羊不生瘡疥亦搗汁和米爲
食其色清久留不敗入夏抽莖有毛開白花甚繁結細實
其無花實者名地膽草汁苦如膽也

苦苣苗 苦微寒

燒灰傳之療金瘡甚驗治丹毒洗痔甚良

△按苦苣原野濕地多有之花淺紫似薊而瘦葉亦色淡
不繁並無刺稱女阿左美以薊名鬼阿左美

一種有薊薊者莖葉似苦苣而莖有白汁至秋高二四尺
開黃花似八重小薊而美 花似薊故多薊薊

本草綱目卷之四 木部 飛廉 漏蘆



三才圖會

農政全書



レウロウ

漏蘆

野蘭 莢蒿

鬼田麻

和名久魯久佐

一云阿里久佐

本綱漏蘆因山產土地形狀有異同凡蒿之類也莖葉似
白蒿花黃而花綻莢端色黃子類油麻作房莖如筋大秋
後枯黑如漆異於衆草根似牛蒡細黑
根苗 鹹寒 足陽明本經藥下乳汁消熱毒止血生肌治

癰疽及痔又治蛇蟲久服輕身延年



飛廉

木末 飛雉

飛輕 伏兔

伏豬 天齋

和名曾曾木

一云布保保

天久佐

細是乃漏蘆之一種花紫色花萼下及根旁有白茸者

附莖有皮如箭羽氣味功用俱與漏蘆不遠

根及花平苦鹹單服可輕身延壽良藥而後人不知用

△按漏蘆飛廉攝州田野間有之而識者用者共希也唐漏蘆頗似遠志而不似細牛蒡近年不來



苧麻

苧音除紵音紵麻

凡麻絲之細者為紵在者為紵

子イニ

俗云真苧

本綱苧麻苗高七八尺葉如楮葉而無叉面青背白有短

毛夏秋間着細穗青花花如白楊而長成穗每一束數十

穗青白色其根黃白輕虛人剥取其皮以竹刮其表厚處

自脫得裏如筋者煮之用緝布其子茶褐色九月收之二

月可種宿根亦自生此即家苧也開蜀江漸之地多有之

又有山芋野芋也有紫芋葉面紫白芋葉面青背皆白

芋根甘滑大能補陰而行滯血安胎治產前後心煩將

芋麻與產婦枕之止血運產後腰痛以芋安腹上即止

芋葉甘寒甚散血五月五日收取和石灰搗作團晒乾

收貯遇有金瘡折損者研末傳之即時血止且易癒

△按芋麻大麻共剥皮為絲通稱芋故以芋麻曰真芋羽

州最上之產為良名青絲線芋織奈良瀑布者是也賀

越之產亦佳乃織越後縮布信濃之產最勁強為網繩

不劣於鐵線故名鐵引凡使時浸熱湯得冷和米糠揉

合之日乾去糠用其大繩為海舶組呼曰加賀芋


凡芋麻初下種後每歲再三薊取宿根生第一薊者長

三四尺去枝葉用莖浸河水取出覆簾庭蒸之故名虛

蒸芋剥麤皮採肌皮青白色者以竹篦刮淨晒乾用之

者稍短其性不如初薊者奈良芋曾者與第二次薊

九州土產



苧麻

いんぴ

苧音

苧同

榮同

白麻

俗用市尾字
猶以知此

本綱苧麻多生卑濕處人亦種之苗高四五尺葉大似桐葉團而有尖六七月開黃花結實如半磨形有齒嫩時青老時黑中子扁黑狀如黃菜子嫩時小兒亦食之其莖輕虛潔白北人取其皮以績布及打繩索又以莖煎硫黃作燂燈引火甚速

△按苧麻西國有之日向薩摩多種之四國亦少有之九州之土產其葉微似胡麻葉大有鋸齒然本草綱目似桐業者未精乎其以下如上說剥皮織布脆於麻易裂打大繩為碇紐海船必用之具以亞加賀草亦為蘭席之繼甚勁強而難截斷



大青

いぬすき

和名波止久佐
一云久流久佐

タアツイン

俗云狗苧麻
又云紀面上

本綱太青春生苗高二三尺莖圓葉長三四寸面青背淡
對節而生八月開小花紅色成簇似馬薊亦似芫花結青
實大如椒顚九月色赤根色黃此草莖葉皆深青故名大
青

莖葉

鹹微苦
鹹寒

三四月陰乾用古方治傷寒黃汗黃疸等

小兒卒然肚皮青黑乃血氣失養風寒乘之危惡之候

也以大青為末納口中以酒送下


△按大青藪澤竹林間有之根似苧麻根故又充大戟

一種有小青生福州三月生花其葉生擣傳癰腫瘡癤

甚效蓋其形狀未詳

苦豆

胡盧巴



フクロバク

本綱胡盧巴此種出南番蓋其國蘆菔子也唐已前未有
之舶客將種蒔亦生今出嶺南廣州然不及南番來者春
生苗夏結子子作細莢至秋采

氣味溫大

右腎命門藥暖丹田治元臟虛冷得附子硫

黃

治腎虛冷腹脇
脹滿面色青黑

得懷香桃仁

治膀胱甚效

いん

劇草 象蟻實

豕首 早蒲

馬蘭

馬帝鐵掃帚

馬薤馬棟子

荔實 三堅



本綱馬蘭生荒野中就地叢生一本二三十莖苗高三四尺葉似薤而長厚硬馬牛亦不食三月葉中抽莖開花紫碧色五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取其根以為帚

子甘平

能治寒疝諸疾皮膚寒熱利大小便金瘡產後


血運良消一切瘡癰止吐衄消酒毒

△按馬蘭

音略俗云

葉長一二尺似薤水仙及蘭葉而甚

勁硬三四月開花淺紫色六瓣三小三小可愛人家種者根可為帚者未見之倭名抄為燕ハナツバ子花之訓者誤也



牛蒡

鼠粘大力子

惡實莖葉菜

便牽牛

蝙蝠刺

和名岐大岐須
一云宇末不岐

本綱惡實種子以肥壤栽之剪苗汙淘為蔬取根煮曝為
脯食之甚益人三月生苗起莖高者三四尺葉大如芋葉
而長四月開花淡紫色結實如楓林而小莖上細刺百十
攢簇之一株有子數十顆其根大者如臂長者近尺其色
灰黯色此實殼多刺故名鼠過之則綴惹不可脫鼠故名
子苦平明目除諸風利小便又其用有四治風濕癰疹
咽喉風熱散諸腫瘡瘍之毒利凝滯腰膝之氣是也吞
一枚出癰疽頭

△按牛蒡俗用牛房字

蓋自古以牛字為牛訓者山列八

幡武列岩築同國烈豫列管澤之產味美同大泐莢後
久留米雖大長中空不佳大抵長者三尺許大周可六
七寸也其細而長尺許似薊根者曰薊牛旁共刮去黑
皮則色白急宜漬米泔否則變黯也茄之香脆無渣者
為良主治牙齒痛諸風脚弱癰疽及惡瘡婦人月水不
通結成癥塊腹脹大者煎汁服



蒼耳

蒼耳

胡蒼耳 卷耳

常思爵耳 猪耳

耳瑞地葵 野茄

羊負來 道人頭

進賢菜 繅絲草

本綱蒼耳

一名施

音施

又名喝起草 昔有人

驅羊入蜀 此草

子多刺粘

羊毛

遂至中國 故名

羊負來 其葉青白 似粘

糊菜葉 細莖叢生

如盤白花 秋間結實 比桑椹短小而多

刺其子正如婦人耳瑞

子

甘溫有毒

治頭風四肢拘攣肝熱明目

猪肉馬肉

用葉

耳子七枚

燒灰

投酒中飲之 即嗜酒人向後不嗜

莖葉

苦辛微寒 有小毒

治中風傷寒頭痛

萬應膏治


一切癰疽發背無頭惡瘡腫毒疔癰風痒癩

瘡杖瘡牙疼喉痺

五月五日采蒼耳根葉數搗洗淨晒

文火熬稠攪成膏貯封每以敷貼愈極有效

△按萵耳和名奈毛美俗云於奈毛美蓋稀莨與此比雄雌多
出於攝州リ



稀莨

喜

希仙火欬草
虎膏豬膏母
狗膏粘糊菜
俗云女奈毛美
今以喜ナ歛シ音

ヒイケン



本綱稀莨素莖有直枝兼有斑點葉似蒼耳而微長似地
菰而稍薄對節而生莖葉皆有細毛肥壤一株分枝數十
八九月開小花深黃色中有長子如同蒿子外萼有細刺
粘入呼吸猪為稀呼吸草之氣味辛毒為莨此生搗汁服則令
人吐故云有小毒九蒸九暴則補人去痺ヲ

稀莨丸唐成訥進稀莨丸方表畧云臣有第訥年二十一
中風伏枕五年百醫不瘥有道人鍾針授此方依

法修治令訥服之至二十丸
所患愈至四十丸即得平復ヲ

△按稀莨處處有之攝州之產良豫州之產次之

鶴虱



天名精

テニミツイ

麥句薑

いぬりくさ 豕首 天蔓菁

地菰 罌粟藍

天門精

坐松 蟾蜍蘭

玉門精。蚬蛸草。治鹿草。劉憶草。皺面草。母豬芥。和名波末

一云波萬實名鶴虱。根名杜牛膝。

本綱天名精春生苗嫩苗綠色葉皺似紫蘊大而尖長不

光莖高二尺許七月開小黃花如野菊花八月結實極尖

細乾則黃黑色其根白色如短牛膝

葉微辛甘有小毒吐痰止血殺蟲解毒止牙疼傳蛇咬良

鶴虱苦辛有毒殺蟲方中為要藥治疥蟲心痛鶴虱研末

以肥肉臠汁服之或大腸蟲出不斷斷之復生行坐不

得者鶴虱末水調半兩服之自愈

△按天名精俗云為乃出於紀攝二州者良竹林藪叢中

有之

一種有類鼻草生田中高地上其葉似天名精其功主痿痺
一種有羊尿柴一名牛尿柴生山野中葉類天名精四月開白花其葉主癰疽發背搗傳之



箬

音若

いろう

箬與箬葉

雲於加阿之

レヨツ

本綱箬生平澤其根莖皆似小竹其節籜皆似蘆菔而葉
之回青皆淡柔而軟新舊相代四時常青南人取葉作笠
又裹茶鹽包米糲女人以襯靴底

葉甘寒

治男女吐衄嘔咯下血並燒灰服之又治咽喉

閉痛箬葉燈心草燒灰等分吹之甚妙

△箬若生堤岳平澤似蘆故俗呼曰岡葭フカアノト



蘆

音 盧

葦音偉 葭音加
 花名蓬蘽芳
 筍名蘆音拳

和名阿之

本綱凡葦之初生曰葭スラ未秀曰蘆ス長成曰葦コヒト生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖テ生無枝花白作穗若茅カヤ花根亦如竹根而節疎蓋有數種其長丈許中空皮薄色白者蘆也葦也短小於葦而中空皮厚色青蒼者菼也荻也蘆其最短小而中實者簾也簾也根甘寒治消渴客熱反胃嘔逆

おのをもたすくそりくろの葉のさへこの後荻

△按蘆アミ和名青アヲシ之和訓中畧也葦長高二三尺其葉大似

馬籐而莖葉皆蒼蒼ササ用可裏粽者攝州難波之產得名

葦ヨシ俗云弱之和訓中畧也蘆既成長四五尺至丈許其葉

亦老衰，纖莖筠帶白色，似竹而弱也。山坡鵝毀之，產得名，用之作簞，簞之簞佳也。近頃武家用葦，乾枯作松明，燒象馬之首毛，布留勝於破竹之松明，又多作筆，勃葦筒中白皮曰葦，籍甚輕薄者也。

葦花一名蓬蘽，說文云：葦花曰牙，油條搖遠生華而無葦葦。

今人取以為帚，曰牙帚是也。

琉球國有大葦，其周匝尺許，厚四五分，以為器物。



荻

音敬

荻

荻音楊

荻音蘭

荻音進

荻音適

荻音名乎木

本綱短小於葦，而中空，葉亦小，皮厚，色青蒼，至秋堅成。

秋風の吹くもこの葦はたけなわたりて

兼

兼

一名兼

浴天須大禮與之

本綱似荻而細長高數尺中實者也

△按兼多出於豫州以編駕窓之簾甚美也



芭蕉

甘蕉

芭蕉

天竺

和名發勢
半波

本綱此草望之如樹株大者一圍餘葉長丈許廣尺餘至

二尺其莖虛軟如芋皆重皮相裹根如芋魁青色大者如

車轂三年已上即有花自心中抽出一莖止一花大如酒

盃形色全如蓮花瓣亦相似但色微黃綠中心無蕊悉是

花葉也花頭常下垂每一朵自中夏開直至中秋後方盡

凡三葉開則三葉脫落也子各為房實隨花長每花一圍

各有六子先後相次子不俱生花不俱落也出嶺南者子大味月北間

者但有其子有數種未熟時皆苦澀熟時皆甜而脆其味

如葡萄南番諸國無米穀惟種芭蕉椰子取實代糧也

一種子大如拇指長六七寸銳似羊角兩兩相抱者名羊

角蕉剝其皮黃白色

一種子大如雞卵有類牛乳者名牛乳蕉味微鹹

一種子大如蓮子長四五寸形正方者味最弱也

蓋品類亦多皆其莖解散如絲以灰湯練治紡績為布

謂之蕉葛

一種有極大者凌冬不凋中抽一條長數尺節節有花

花根有實四季恒實去皮取肉軟爛如綠柿味極甘

令名牛蕉

一種小於牛蕉亦四季實者名鷄蕉

此山蕉在峽中其味甚佳

葉主治腫毒初發研末和生薑汁塗之

利三
卷之四
三

△按芭蕉薩摩多有之畿內寺院希有之人家忌之不植
凡經三歲者剥皮織布綯繩自琉球多出芭蕉布光白
色美於練絹而弱於麻布其子呼名比牟奢吾
今俗陰囊腫者用芭蕉葉裹之亦有據矣

鎌倉淨密法師庵優曇花開遠近群集二位禪尼使左近
將監見之曰芭蕉花也蓋芭蕉以花開希有人以為優曇
花也按優曇花者乃是無花東之名也無花果樹見東果部



美人蕉

ハズンセウ 紅蕉

本綱美人蕉葉瘦類蘆荻花色正紅如榴花日折一兩葉
其端有一點鮮綠可愛春開至秋盡猶芳
畫譜云紅蕉有二種自東粵來者名美人蕉其花若蓮而

色紅若丹，中心一朵曉生，甘露其甜如蜜，食之止渴。五雜俎云：閩廣有數種有美人蕉，樹葉皆似芭蕉而稍小，華而不實，其花殷紅鮮麗，千葉如穗，經數月不凋謝，摘置瓶中，以水漬之，亦可經一兩月也。此蕉最佳。

△按美人蕉近來自琉球來，而往往栽之，最畏寒，難茂盛。



檀特花

△按檀特草高三四尺，葉似芭蕉而小，不甚柔，又似薏苡而大，不甚硬，長尺餘，闊三四寸，冬枯春生。七月抽莖開花，深赤色，形如穗，最可愛，結子圓黑色，甚硬，用作念珠。本西南外國之草，性最畏寒，如值霜雪則失種，故防北向南之地可種，冬則覆稻或稻藁等以禦寒濕，其子爲

念珠形色如作成而良



藁荷

めりか

覆箱

傳直

藁草

藁草

喜草

和名木加
作茗荷非也
茗乃茶名

イヤン
ホウ

本綱藁荷春初生葉根有赤白二種似薑牙而肥其葉冬
枯根堪為茹人家種之辟蛇其子花生根中花未敗時可
食久則消瀾矣宜陰翳地依陰而生不須鋤耘但加糞耳
八月初踏其苗令死則其根滋茂十月中以糠覆其根下
則過冬不凍死也

根辛微

使藥用白藁荷以銅刀刮去粗皮一重細切入

砂盆中研如膏取自然汁鍊作煎新器攤令如乾膠狀

刮取用之如稻麥芒入目中不出以汁注目即出赤眼

凝痛擣汁點之瘡擣汁服其勿用華牛草真相似
 按蘘荷似薑之莖葉及外葉嫩時莖亦可啜味微辛俗
 稱茗荷竹其子畧似竹笋而二寸許淺紫色俗曰茗荷
 笋細切和酸食之眼科取其根修治稱蘘荷石所謂石
 者隱語非實石之謂能治揆眼



麻黃

龍沙 卑相
 卑鹽

和名加豆祿草
 云阿萬奈

本綱麻黃春生苗至五月則長及一尺以來梢上有黃花
 結實如百合瓣而小

又有似皂莢子味甜微有麻黃氣外皮紅裏仁子黑根皮
 色黃赤俗說有雄雌雌者於三四月內開花六月結實雄
 者無花不結子凡有麻黃之地冬不積雪也性熱可知

莖

微苦而辛性熱

輕清而浮升也肺經專藥

入足太陽經兼治走手少陰陽明

無汗傷寒用麻黃有汗傷寒用桂枝如自汗表虛之證

用麻黃則脫人元氣不可不禁凡用麻黃佐以黃芩則

無赤眼之患厚朴為之使惡辛夷石黃用之折去節根水煮十餘沸


以竹片掠去上沫沫令人煩

根節

能止汗效如影響莖發汁之氣駛不能禦物理

之妙不可測度如此別有雲花草狀如麻黃而中堅實者也

△按麻黃處處有之攝州及丹波之產佳



木賊

和名度久散

モツツエツ

木綱木賊近水地有之苗長尺餘叢生直上似鳬莖及悵心草而中空寸寸有節色青凌冬不凋每根一幹無枝華

其莖面糙澀治木屑者用之磋擦則光澤猶云木之賊

莖甘微苦溫

陽中之陰升也得也與麻黃同形同性故亦能

發汗解肌散火鬱風濕治眼目退翳膜止淚止血

△按木賊磋物如砥故稱砥草矣多出於丹波

新和撰 石龍芻のわきを種わけてふくらむ草なり

はくも


龍鬚 龍華

龍修 茸續斷

龍珠 緇雲草

懸菟 方實

西主母 簪



石龍芻

本綱石龍芻凡刈草束束曰芻此草生水石之處可以刈束養馬故名芻叢生狀如棕心草及鳧茈苗直上夏月莖端開小穗花結細實並無枝葉多栽織席

莖微

治心腹邪氣小便不利淋閉久服補虛聰明

△按和名抄云石龍芻和名宇太江浦草和名久毛一

以爲二物今謂豆父毛者即本草所謂石龍芻形狀能
 似也似鳧茈苗而長四五尺太如箭籜中肉白而不空
 開小穗花結細實今人取其實充海金砂可辨之莖纖
 筵多出於紀州熊野稱太蘭席然比莞席脆弱也疑江
 常草石龍芻一物矣而牛額和名之物未知



粽心草

龍山草

蘭音各

倭名抄

きりくすま

和名爲俗云野苳

ツラニスイーンツアウ

本綱粽心草生河水旁纖細似龍鬚可爲席蓋是石龍芻
 之小者爾俚俗五月采繫角黍之心呼爲粽心草角黍者粽也
 △按蘭玉篇云似莞而細堅宜爲席今原野叢生似燈心
 草而微扁長一尺餘中空而無白瓤一抹布地叢生中
 長者起莖生板葉如絲以指凡拔葉則音爲莎雞聲

どうらん

虎鬚草


燈心草

碧玉草

莞和名抄音官

テシスイツクウ

和名於保井



本綱燈心草生澤地叢生莖圓細而長直此即龍鬚之類
 但龍鬚緊小而艸實此草稍粗而艸虛白折取中心白穰
 為燈炷以草織席及蓑外丹家以之伏硫砂但燈心難研
 以粳米粉漿滌過晒乾研末入水澄之則浮者是燈心也
 晒乾入藥行義云入藥宜用生草
 莖及根甘淡五淋生煮服貶席煮服更良治急喉痺燒
 灰吹之甚捷降心火行水散腫

本草

川芎藭の根や川芎藭の葉すもあまじつふく

治喉

△按燈心草用小刀按指以裂皮取白穰凡剥六斤得白
 穰半斤者為上武列之產肥大為最上江列之產次之

凡貯燈心零蘘熟湯晒乾則經久不瘦以每十一月子
 日貯之味知其據也備後備中者白穰少堪織席



地黃

地黃
 芋音戶
 芭音起

チイハニ

李綱地黃二月生葉布地便出似車前葉上有皺文而不
 兜葉面深青色似小芥葉而頗厚不又了高者及尺餘低
 者三四寸葉中攢莖上有細毛莖稍開小筒子花其花似
 油麻花而紅黃色亦有黃花者結實如小麥粒根長四五
 寸細如手指皮赤黃色曝乾乃黑其生者以水浸驗之浮
 者名天黃半浮半沉者名人黃沉者名地黃入藥沉者良
 生芋甘微入手足少陰厥陰及手太陽經諸經之血熱
 病人虛而多熱者宜加用之得清酒麥門冬良惡貝母畏麻黃

忌葱蒜蘿蔔令人營衛忌銅鐵器令人腎消并髮白能

生血而胃氣弱者服之恐妨食酒炒則不妨胃

熟地黃微溫以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木甑

於瓦鍋內蒸令氣透眼乾如此九蒸九眼乃止蓋地黃

性泥得砂仁之香而竄今市中惟以酒煮熟售者不可

用生則涼血血熱者須用之熟則補腎血衰者須用之

仲景六味丸以之為諸藥之首湯液四物湯治藏血之

臟以之為君痰飲多者服熟芋恐泥膈薑汁炒則不泥膈


按地黃和州之產良山州次之有白花者稱白地黃最

為上但肥大者佳和州高市郡地黃村相傳往昔始出

勝他處者良

雄

雌



牛膝

のくつ

ニウ スエツ

牛莖山莧菜

日倍對節菜

和名以乃父豆知

俗云以乃古豆知

本綱牛膝春生苗方莖暴節高二三尺青紫色有節如鶴
膝及牛膝頭葉尖圓如匙頗似莧葉而長且尖兩兩相對
秋月於節上開花作穗結子甚細狀如小鼠負虫有濡毛
皆貼莖倒生其根極長大至三尺柔潤者為佳有雌雄以
雄者為勝雄者莖青節細根長大柔順雌者莖青節細根小多岐
根平苦酸能引諸藥下行筋骨痛風在下者宜加用之乃
足厥陰少陰之藥大抵得酒則能補肝腎生用則能去
惡血惡龜中陸英良自前忌牛肉妊婦最忌之
△按牛膝攝河二州之產最佳婦人良方云生胎欲去者
牛膝一握搗以無灰酒一盞煎七分空心服仍以獨根
牛膝塗麝香挿入牝戶中蓋賤婆間有用此方為業者
不仁之甚者也

あや人

青菀 夜牽牛

紫菀

紫菀 返魂草

和名能之

俗云之平迹

又云於余乃

之古久佐



ツウワル

本綱紫菀三月布地生苗其葉二四相連五六月開黃白

紫花本有白毛結黑子其根作節紫色潤軟者佳

氣味苦溫療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足治兒


驚癇欬久為之使惡天雄瞿麥

△按紫菀葉似羊蹄葉而不軟一根叢生抽莖開花細小

數朶淡紫白色人家庭園種之

本草 紫菀 三月布地生苗其葉二四相連五六月開黃白紫花本有白毛結黑子其根作節紫色潤軟者佳氣味苦溫療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足治兒驚癇

本草綱目卷之六
 女苑
 白苑織女苑



白苑織女苑
 女復節

本綱紫苑之色白者也其根辛溫功與紫苑相似蓋紫苑治手太陰血分白苑手太陰氣分藥也故治肺熱人面黑



麥門冬
 忍凌鳥韭
 愛韭
 馬韭
 秦

本綱又名忍冬和名夜木須介叢生葉如韭青似莎草長及尺餘四時不凋其根黃白色似麥而有鬚四月開淡紅花如紅藥花冬月作實碧而圓如珠四月採根於肥沙地栽之其

根

甘微寒
微苦

入手太陰經氣分

地黃車前爲之使畏
苦參木耳惡欬冬
治肺

熱之功爲多，但專泄而不專收。若氣弱胃寒者，禁服治肺中伏火脉氣欲絕者，加五味子、人參二味爲生脉散。

麥門冬須抽去

心不爾令人煩

△按麥門冬俗云尉之鬚也出於河州石川者最良紀州

者次之藝_三州者又次之今人家栽檐下可以受雨滴墮
前草據此_三乎近年藥肆去其心售_三



萱草

人子

忘憂療愁

丹棘
鹿葱

妓女鹿劍

宜男草

ヒア
ツ
ア
ウ

禮和
久名
佐和
須

本綱萱草冬月叢生葉如蒲蒜輩而柔弱新舊相代四時
青翠五月抽莖開花六出四垂朝開幕至秋深乃盡其
花有紅黃紫三色結實三角內有子大如梧子黑而光澤
其根與麥門冬相似最易繁衍肥土所生則花厚色淡有
班文起重臺開有數月瘠土所生則花薄而色淡開亦不
久也萱呼淵切本作諼諼忘也樹之背玩味以忘憂也鹿食
九種解毒之草萱乃其一故名鹿葱懷妊婦人佩其花則
生男故名宜男其苗花甘涼作茹食利胸膈安五臟令人
好歡樂無憂

△按萱草有數種並立春布猶蒙於根則二月苗葉盛

鬼萱草

葉廣其花黃褐色千葉

姬萱草

葉狹而花黃褐色單葉形如百合花

黃萱草

似姬萱草而花厚色黃

筋萱草

葉大如鬼萱草而有白縱線

畫譜云萱花有三種單瓣者可食千葉者食之殺人色如

蠶者香清葉嫩可作高齋清供可作蔬食不可不多種春
可食苗夏可食花比他花更多一事

三葉切之炒之食之其味清香是後世之



禪庭花
俗稱本名

△按禪庭花高二三尺葉似萱草而纖六月開花黃色帶
微赤單葉似百合花蓋萱草之種類乎



翁草
俗稱
別有白頭翁
出干山草類

△按山谷及人家有之初春生苗葉似麥門冬而純白頗如白髮故俗呼曰翁草二四月及長葉皆變青色中心抽一莖生小花淡紫色秋冬枯死



淡竹葉

根名碎骨赤

タシチヨツエツ

本綱此草處處原野有之春生苗高數寸細莖綠葉儼如竹米落地所生細竹之莖葉其根一窠數十鬚鬚上結子與麥門冬一樣但堅硬爾秋抽莖結小長穗俚人採其根苗搗汁和米作酒麴甚芳烈

葉甘寒

去煩熱利小便清心

根名碎

墮胎催生

△按八九月結子青色而大如豆子中有細白子加味五淋散有淡竹葉入者是也以爲尋常淡竹者誤也

ちくさ
あともろ
苓雞舌草

鴨跖草

碧竹子 竹雞草
竹葉菜 碧蟬花

かやあめん

淡竹葉 巨環草



キマシチツアウ 藍姑草

本綱鴨跖草處處平地有之三四月生苗紫莖竹葉嫩時
可食四五月開花如蛾形兩葉如翅碧色可愛結角六曲
如鳥啄實在角中大如小豆豆中有細子灰黑而皺狀如
蠶屎巧匠採其花取汁作畫色及糝羊皮色青碧如黛也
苗苦大治喉痺腫痛其草汁點之治五痔腫痛其花按
軟納患處即効

按鴨跖草和名都岐久佐俗云知久佐處處多有之用其花汁
濃者浸染紙呼曰青花為畫具自勢州出之江列多作出

ちゆ
あやれんをほきまのうしやひくあふ

翠胡蝶 昂鴨跖草之一類手 見末卷



葵

露葵 滑菜

葵

音達

和名阿布比

クイ

本綱葵有紫莖白莖二種以白莖為勝大葉小花紫黃色其最小者名鴨脚葵其實大如指頂皮薄而扁實內子輕虛如榆莢仁四五月種者可留子六七月種者為秋葵八九月種者為冬葵經年收採正月復種者為春葵然宿根至春亦生古者葵為百菜之主種為常食今人不復食之其葉傾日不使照其根自守之甚易生不抱肥瘠地皆有之凡被狂犬咬者永不食食之即發也天行病後食其苗令人失明

冬葵子滑寒胎死腹中者為末酒服方寸匕若口噤不開者灌之藥下即甦又乳婦氣脉壅塞乳汁不行及奶房

脹痛留蓄作癰毒者用冬葵子炒香縮砂仁各等分爲末熱酒服二錢極驗



蜀葵

俗云加良阿希比

かろゝあひ 戎葵 肩音堅

シヨクイ

本綱蜀葵春初種子冬月宿根亦自生苗嫩時亦可茹食葉似葵菜而大亦似絲瓜葉有岐又過小滿後長莖高五六尺花似木槿而大有深紅淺紅紫黑色單葉千葉之異其實大如指頭皮薄而扁內仁如馬兜鈴仁及蕪荑仁輕虛易種其摺剥皮可緝布作繩

苗甘微寒滑

不可久食鈍人志性若被狗齧者食之永不瘥

根莖

治小便淋痛煎服如神又治小兒吻瘡經年欲

腐者葵根燒研傳之其花陰乾治婦人帶下

畫譜云其種類似不可曉地肥善灌花有五六十種奇態
而色有數品花形千瓣有五心五月繁華莫過於此
枕雙紙云

人亦方人

日の影を落て

△按淮南子曰聖人於道猶葵之與日云其花五月自
下開初徐至上稍開盡時為梅雨之終每歲大抵如此



錦葵

こゝろへ 荆葵 荻音喬

本綱錦葵即蜀葵之一種小者其花大如五銖錢粉紅色
有紫縷文功用與蜀葵相似

△按畫譜云錢葵其花葉如葵稍矮而叢生花大如錢止
有粉間深紅二色開亦耐久蓋錦葵與錢葵一物矣



菟葵

天葵 苾希
雷丸草

和名以富余禮



トウキ

本綱菟葵狀如葵菜葉大如錢而厚面青背微紫其花白似梅生於崖石

苗甘寒

治五淋及諸瘡能解毒止痛塗瘡亦可凡丹石

類得此而後能神也取自然汁煮未則堅五月五前齋戒看桑下有菟葵者至五日午時至桑下咒曰繫繫乎侵當蘇婆訶咒畢乃以手摩桑陰一遍口齧菟葵及五葉草嚼熟以唾塗手熟措令遍再齋七日不得洗手後有蛇蟲蠍蟻咬傷者以此手摩之即愈也古有咒由一科此亦其類但不知必用菟葵又何義也

△按倭名抄葵菟共入野菜水菜之部則古者本朝亦以

手澤三才圖會 卷之四 菜部 葵

葵為蔬明焉今則和漢共不常食

山州賀茂山中有二葉葵毛呂波布地生其葉團而微

尖面青其帶紫色賀茂神事着葵於桂木枝掛簾及器

謂之葵祭每年四月中酉日被行之獻葵於北山中村

葵
いふは葵のつゝの葵祭毎年ふれは二葉葵
りかひふれは葵のつゝの葵祭毎年ふれは二葉葵

ころみ 側金盞花



黃蜀葵

俗云止呂呂


ハアシヨシイ

本綱黃蜀葵二月下種或宿子在土自生至夏始長葉如
 芭麻葉深綠色開岐子有五尖如人爪形旁有小尖六月
 開花大如碗我鳥黃色紫心六瓣而側且開午收暮落隨即
 結角大如梅指長二寸許本大末尖六稜有毛老則黑色

其核自縱內有六房如脂麻房其子累累在房內狀如苧
 麻子色黑其莖長者六七尺剥皮可作繩索
 花寒治淋病及催生研末為瘡家要藥惡瘡久不愈者為末傳之

子亦同功無子用根

△按黃蜀葵葉花莖形狀頗似草繩冬采根打碎漬水取
 黏汁用和楮皮汁造紙



龍葵

ニクイ

ロクイ

天泡草

老鴉酸漿草

老鴉眼睛草

水茄天茄子

苦葵 苦菜

本綱龍葵四月生苗嫩時可食柔滑漸高二三尺莖大如
 筋似燈籠草而無毛葉似茄葉而小五月以後開小白花
 五出黃蕊結子正圓大如五味子上有小蒂數顆同綴其
 味酸中有細子亦如茄子之子

苗莖葉根

苦微甘 滑寒

消腫補益男子元氣


△按龍葵

和名古奈須比

莖葉似葵而子似茄子而小故有龍葵

天茄之名蓋其生青熟時黑者龍葵也生青熟時赤者

龍珠也



龍珠

わさびなごみ 赤珠

本綱龍珠似龍葵而熟時正赤色但生青熟時黑者為龍

葵生青熟時赤者龍珠其苗

苦寒 變白髮冷黑 子赤 同功

△按龍珠葉似三七葉而色淺夏開小花結實七月熟正

赤儼如酸漿子植盆翫賞之

洛神珠皮并苦

醋漿燈籠草

苦歲大泡草

苦耽王母珠

酸漿

ソワツヤン

俗云保字豆木



本綱酸漿與龍葵一類二種也酸漿與苦蕒一種二物也
 但大者為酸漿小者為苦蕒以之為別敗醬亦名苦蕒與
 此不同其龍葵酸漿苗葉一樣龍葵莖光無毛五月入秋開小白花五出黃蕊結子
細葉生青熟紫黑酸漿同時開小花黃白色紫心白蕊
 其花如盃狀無瓣但有五尖結一鈴殼凡五稜一枝一顆
 下懸如燈籠之形殼中一子狀如龍葵子生青熟赤中復
 有細子如落藕之子食之有青草氣其外殼老則如絳囊
 苗莖葉根苦寒利濕除熱清肺治咳化痰
 子酸平定志益氣利水道治黃病難產吞之立產七益
 小兒治疳瘦熱結

△按酸漿五月開小花純白莖亦白色蒂青武州江戶豐
後平家山河州茨田郡多出之宿根自生小兒盤去中
白子爲虛殼含之於舌上壓吹則有音復吹攢則似搥
燈其外皮五稜生青熟赤似絳囊文理如蜻蛉翅而不
柔脆鹽漬可久貯



蜀羊泉

俗云字留之介之

シヨヤン ツヅミ

能治漆瘡故名

漆始草

羊泉 羊飴


本綱蜀羊泉生平澤陰濕地葉似菊花紫色子類枸杞子
根如遠志無心有糝又黃蜂作窠啣漆始草汁爲帶卽此
草也
氣味苦微寒
能治漆瘡疥癬齒又治黃疽

くたいまう

秦王試劍首

鹿蹄草

小秦王草



ロツテイツノウ

本綱鹿蹄草生平陸及寺院荒處苗似莖菜而葉頗大背紫色春生紫花結青實如天茄子又云葉象鹿蹄形能合金瘡故名試劍草

倭

漢



敗將酉

人ころと
らめくさ

苦菜

苦蕒

澤敗

鹿腸

鹿首

馬草

和名知女久佐

ハイツ

俗云羽衣
又云鋸草

本綱敗將原野有之春初生苗深冬始凋初時葉布地生

似松菜葉而狹長有鋸齒綠色面深背淺夏秋莖高二三尺而柔弱數寸一節節間生葉四散如繖顛頂開白花成簇如荇花蛇狀子花狀結小實或簇其根白紫頗似味胡作陳敗豆醬之氣故以名

氣味微苦帶甘

手足陽明厥陰藥也善排膿破血故仲景治


癰及婦人科古方皆用之後人不知用

△按敗醬葉大如柳而闊鋸齒深六片開花白色巔有黃點又有純白者其根氣惡臭葉晚萎折合宛似錫形然漢餅圖之形不合本文

夏月葉時



倭云黃梅



春花時

ニヤニヤニヤハア

迎春花

本綱迎春花人家栽挿之叢生高者二三尺方莖厚葉如初生小椒葉而無齒面青背淡對節生小枝一枝三葉下

月初開小花狀如瑞香花黃色不結實

葉苦澁

腫毒惡瘡

陰乾研末

酒服二三錢出汗便瘥

按迎春花莖有微稜節節繁枝餘勁而不立如蔓非蔓傍起竹扶之正月開小黃花形似梅花故呼曰黃梅遠望之似連翹花枝其花罷生葉一桠三葉兩兩對生倚莖繁亦如狗黃楊枝葉樣而葉不扁

畫譜云迎春花春首開花放時移栽土肥則茂燐性者此如用魚鳥洗汁之類久則花蕃二月中旬分種也燐性者此如用魚鳥洗汁之類以湯沃之毛令脫曰燐燐也

漢

和



鼠麴

香茅無心草
鼠耳黃蒿

耳母

雲波古久佐

子子

本綱鼠麴草原野間多二月生苗莖葉柔軟葉長寸許白茸如鼠耳之毛開小黃花如麴色成穗結細子取花雜擗

皮染褐至破猶鮮荊楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和為粉謂之龍古粹以壓時氣粹音板

氣味酸熱

調中止洩除痰去寒嗽嗽冬花為之使宜少食之過則損目

一萬三奇散治一切效嗽佛耳草五十文效冬花二百文熟

地黃兩焙研每用二錢於爐中燒之以筒吸烟嚥下有

涎吐去

△按鼠麴俗云母子草和名抄以菴蘿子訓洩故古者非也今患痰咳人採

其花代煙草亦本於三奇散方意矣又上巳日用之和

粹近世多用艾粹用鼠麴者少

决明子



决明子

けつめいし 馬蹄决明

和名衣比須又佐

俗云波天禮以草

馬蹄草之訛

キヨ ミシツ

本綱處處有之馬蹄夫明芒芒夫明有二種

馬蹄夫明莖高三四尺葉大於首蓿而本小末參畫開夜

合兩兩相帖秋開淡黃花五出結角如初生細而長五

六寸角中子數十粒參差相連狀如馬蹄青綠色

氣味

苦甘微寒

治青盲眼赤淚出肝熱風眼

每目取一匙接淨空心吞之百

日後夜見物光

園中種之蛇不敢入

以有毒蛇之功也

芒芒夫明

名山扁豆

苗莖似馬蹄夫明但葉之本小末尖

正似槐葉夜

生

亦不合秋開深黃花五出結角大如小指長

二寸許角中子成數列狀如黃葵子而扁其色褐味甘

其嫩苗及花角子皆可瀹茹及點茶食

但馬蹄夫明苗角皆苦不食也

△接夫明子

即此馬蹄夫明

草夫明

即青石夫明

即鮑氏有明目

之功故得夫明之名勢州山州之產良俗稱草夫明者

非也唯稱夫明子可也蓋其葉兩兩相對本草謂兩兩

相帖之帖字未解疑帖字訛字粘相著也



地膚

何々々

地葵獨語地葵

落帚王帚王簪

掃帚涎衣草

益明千心妓女

白地草鴨舌草

テイコ

本綱地膚草田野間多有之初五六寸時根形如蒿莖赤葉青大似荊芥嫩苗可作蔬茹一科數十枚攢簇團團直上開小黃花結子其子微細青白色子落則老莖似藜可為帚

子甘苦

治膀胱熱利小便明目虛而多熱者加之

苗葉甘苦

搗汁服治赤白痢及泄瀉以通小便

△按地膚

和名迹波久佐云未木久佐

出於攝河者佳其莖似藜莖而

帶赤色

葉似柳葉而小深蒼色有豎理老則高二三尺

其葉瘦小其子細小數千顆如穗而子落堪作帚

ヨキハナ

不斷菊

常磐菊

エシメイ
淵明草

共皆俗稱




△按常磐菊變於夏菊種近年出於江戸其莖葉似菊而甚瘦細^{シボク}叶^{ハナ}無切^{キレ}又畧似同蒿^{カクサイ}葉五月開花似野菊花而小外單白內八重帶微青黃色遂純白^{ナリ}逐日生枝梗至秋開花故名常磐菊

スサナ

仙靈草

正字未詳

世無利也



△按仙靈草高二三尺叢生葉長一寸許尖有鋸齒開小

白花結子似藪柑子而五七粒攢生淡紅色而可愛種
 子能茂盛而怖日惡霜雪近頃出白子仙靈蓋變於子
 種者也冬間春宿根亦能生葉



巨辨草

こべんさき

正字未詳

△按巨辨草高六七寸無枝條而葉抱莖有鋸葉五月著
 小細花正黃色攢開甚美



本居

總

八一
六九



李
總

八一
六九

九十四之末

濕草類

地
倭漢三才圖會



本
店
總

八
一
六
九

AE
4
T4
1824
V. 94:2

和漢三才圖會卷第九十四之末目錄

濕草類

款冬花 くわんとうけ

剪紅羅 せんこうら

金盞草 きんさんそう

車前子 しやぜんし

蛇含草 へいがんそう
根名 女青

鯉腸 りちやう
へんじんそう

豆和 とうわ

附り
太加良古

眼皮 がんぴ

金錢花 きんせんか

狗舌草 くしつそう

鼠尾草 しそくそう

連翹 れんしやう

瞿麥 くわくま

王不留行 おうりゆうぎやう

苧薺 しよさき
いぬあつな

馬鞭草 ばべんそう

狗尾草 くしそく

倭連翹 われんしやう

蒴藋そくとう

蓼れう

葎草いぬとく

三白草さんぱくそう

篇蓄へんちく

穀精草くくさ

蜈蚣草しんぐくさ

紫花地下ちく、ちうい

藍あい

藍澱あいろ

水蓼みづれう

毛蓼けうれう

虎杖こざ

附リ
蛇薺草

蓋草かりやま

海金沙かいさんしゃ

碎米薺せんげんか

鬼針草きしんそう

附リ
狼把草

青黛せいだい

馬蓼ばれう

火炭母草くわたんぼそう

藕みそい

蒺藜子じりし

水楊梅すいやうばい

附リ
柳草

半邊蓮はんぺんれん

見腫消けんしやう

草綿くさわた

焚噲草ふんかいそう

翠蝴蝶すいこて

鷺草さぎ
附リ連鷺草

草列珠くされいしゆ

泡盛草あわもりそう

九葉草くえふそう

贊波丁子さんびていし

秋海棠あきあひだ

岡萍蓬おかへいほう

蝴蝶草こてふさう

絲綵草いとくろそう
あだま

草蓮花くされんけ

山萵苣くろもんそう

澤桔梗さへききやう

吉野靜草のろぐら

免兒傘やふれさ

紫羅襪むらさきろく

鶴子草くろくろそう

善界草ぜんがいそう

淡雪草あわゆきそう

櫻草さくらそう

丁子草ていしそう

二人靜草ふたりしやうさ

千日紅 せんみちこう

綖摺草 もろずりそう

牡鵪草 もろぞうそう

玉毬花 たまひしき

熊谷草 くまがうそう

夏雪草 なゆきそう

碇草 いかりぐさ

潮風草 うしなぐさ

粉條兒菜 こなすげ

亂菊 らんぎく

螢草 やぶろうそう

雉子竈 けしきぐし

董董菜 やぶどう菜

梅鉢草 うめぼし草

華鬘草 けまん草

有馬草 ありま草

藁荷草 めうが草

水引草 みづひき草

虎尾草 とらのこ

猩猩袴 きんぎょく

風樓草 ふうろう草

鹽竈草 しんがく草

曼陀羅花 まんだらけ

逢坂草 あさか草

日向堪ひがし

白絲草しろいとくさ

望江南ぼうきやうなん

雨點兒菜うでんじさい

千屈菜せんくつさい

剪刀股せんりょうこ

野茴香のいさぎ

火燄菜くはえんさい

藤袴ふぢはかま

野鶴草のたつさき

風花菜ふうかさい

星宿菜せいしゆくさい

草零陵香くさりやうきやう

蠟子花菜ろうしはさい

香菜かさい

遏藍菜あいらんさい

礮邊草いさばくさ

鰾蓬けんぽう

白屈菜しろくつさい

毛連菜もうれんさい

委陵菜いりやうさい

婆婆婆指甲ばばばしやう

牻牛兒ぎのせうこ

胡枝花こけざい

結縷草

矢苦草

堇

角觥草

牙切草

菅

和名三才圖會

本草

卷之二十四

金

和漢三才圖會卷第九十一之本

攝陽 城醫法橋寺島良安 尚順 編

濕草類



款冬花

虎鬚

菟葵

豪吾

款凍

氏冬

鑽凍

クハントシ

俗云布木乃之宇止女

本細百草中惟此不顧冰雪最先春也葉似葇荑十二月
開黃花青紫萼去土一二寸初出如菊花萼通直而肥實
無子根紫色須微見花者為藥或云似葵而大叢生
又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗
呼為蜂斗葉又名水共春時人採以代蔬其腹裏有絲

氣味 辛 溫

純陽入手，太陰經治。欬逆古方用，為溫肺治。

嗽之最

杏仁為之，使得紫苑、良惡、皂莢、冬參、畏麻黃、黃芩、黃芩、連翹、青葙子。

△按崔禹錫食經云：落布，名布，葉似葵而圓，廣其莖煮可。

噉之欬冬

和名也，未布收。

據此則欬冬即山落豆，今云至冬亦葉。

不凋落，本草二物不分別，然所圖落也。

入藥欬冬可，用落姑也。

落初生，葉似葶藶而無叉尖，大者似牛蒡葉而圓莖長。

一二尺有溝，青白色，根本帶紫，有微白色皮肉，間有絲。

剥皮煮食，春時常用之。其花臘月出於土，如薤荷等，大。

如梅指，淺青色，採之切片塗豆醬炙食，味極苦。然本草。

為辛者非也。嗜酒人賞之，或謂治痞積。至春稍長，外皮。

綻舒為葉，抽莖四五寸稍開，花白帶黃，無莖無子。與州。

津輕之產，肥大莖周四五寸，葉徑三四尺，以代傘防暴。

雨，南方人聞之不信，但未聞有紅花者耳。

根

苦平

倭方海人草，欬冬草根甘草，三味浸水湯煎以。

用初生兒云能去胎毒。本草不載，根氣味切。

豆和

款冬

和名夜末布岐

豆和

對落謂山路乎
今以捷棠花同
名俗曰豆和



△按豆和即款冬而落之一種莖葉形狀相似而花大異

落 青白有溝韌薄軟淺青不潤秋冬枯死

款冬 莖 灰紫無溝脆厚硬深青先澤冬亦不凋

落 花 出於根下一二寸如蘘荷笋開舒淡白無藥

款冬 花 秋抽莖作朶二三尺如菊花萼開單正黃有藥

採莖葉煤淘去苦汁為蔬其葉解魚毒中河豚魚毒者

生噉之屢有效又飼馬良不劣於薊葛之葉也九列人

今亦每為蔬菜食之

太加良古 在山中葉似落而花似豆和三月開花連根

莖葉用入洗藥中洗折傷及麻痺但葉本莖有穢

藤瞿麥



瞿麥

石竹 蘧麥
天菊 大蘭
南天竺草
巨勾麥

キヨイ モツ

和名太奈天之古
一云止古奈豆

本綱瞿麥葉似地膚葉而尖小又似初生小竹葉而細窄其莖纖細有節高尺餘稍間開花田野生者花大如錢紅紫色人家栽者花稍小而嫵媚有細白粉紅紫赤斑斕數色俗呼為洛陽花並二月至五月開七月結實作穗如燕麥內有小黑子其嫩苗焯熟水淘過可食

一種 葉微大花邊有叉極

一種 葉莖相似而有毛花晚而甚赤

畫譜云石竹二種單瓣者名石竹千瓣者名洛陽花二種俱有雅趣亦須每年起根分種則茂

穗 苦寒

利小便明目

使只使用蓋敷不用莖葉若一時同氣噎小便不禁也

八正散用瞿麥今人爲至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣

△按瞿麥ナゲシホ即石竹也。今以爲二種。共葩周圍有刻齒。而有

切又似剪紅紗者爲瞿麥無切又者爲石竹並出於豫

州者良丹波紀伊次之

莖葉細弱花有紅紫白赤斑斕單葉千葉數種

南京瞿麥ナキンキマク株太莖細而葉大於倭其花單瓣紅

莖大高尺餘葉厚形似匙首而深青色抱節兩

兩對生其花數朶小形似桔梗而白帶紫萼長淺青

倭石竹
莖葉細柔其花有數品從春至秋皆變於子種

而異品ニ者爲珍賞ト

阿蘭陀石竹

株莖大^ク葉硬^{ユハク}強^{ハク}花^モ亦大有數品也^{名阿無之}
閉伊流


剪紅紗

本草說



剪秋羅

剪羅



剪春羅

剪秋羅

剪刀紅羅

剪紅紗花

俗云仙翁花

今云世罕

ツシフキシロウ

本綱剪春羅二月生苗高尺餘柔莖綠葉其葉對生抱莖
 入夏開花深紅色花大如錢凡六出周迴如剪成可愛結
 實大如豆內有細子人家多種之為玩治火帶瘡遠腰生者花葉密調塗之
 剪紅紗花莖高三尺葉似旋覆夏開花狀如石竹花而
 稍大四圍如剪鮮紅可愛結穗亦如石竹穗中有細子
 剪秋羅花畫譜云剪秋羅花有五種春夏秋冬羅以時
 名也春夏二羅色黃紅不佳獨秋冬者紅深色美亦在
 春時分種喜肥則茂
 △按剪紅羅總名而有數種皆夏月開花稍遲者至秋耳
 冬乃枯死宿根春生苗故未見春冬開花者畫譜之說

不是也相傳嵯峨仙翁寺始出之仍名仙翁花今此
五鳳集云吾邦有一種奇花每歲以六七月着紅謂之仙
翁花世傳自嵯峨仙翁寺所出也太唐詩文之中論花甚
夥未聞有此名

蓋此仙翁花乃剪紅羅花也疑僧裔然取得種於中國
者矣仙翁寺舊地在太覺寺西今為村名今愛宕山傍
有小堂號當時所賞翫者記于左

剪紅羅仙翁寺

葉形似梅葉而無鋸齒裏有微白毛對生

六七月開花正紅色大如錢有刻齒周迴如剪成今時

又有白花者

剪秋羅俗云松

莖葉與常剪羅相似而五六月開花深

紅色其周迴如剪成之處不峻今時有數色紅白及裏

朱曙紅櫻色等變於子種

剪紅紗俗云小

葉細長而五六月開花淡紅色形如石

竹花其刻齒亦深而美今又有白花者

ぐんひ 俗稱

眼皮花



△按眼皮草與剪羅一類異種也春生苗柔莖青綠葉厚於剪羅而不圓末尖六七月開花似剪羅花而刻齒其色肉赤也俗說達磨太師九年面壁時欲不眠自剪上下眶棄之地生此草其花肉赤色以爲似眶因名眼皮矣一種有逢坂草者見于後

かきくさ

金盞銀臺

禁宮花

王不留行

剪刀金花



キンフツリウヒ

和名如左久佐

本綱王不留行，多生麥地中，苗高者一二尺，三四月開小
 花如鐸鈴，狀紅白色，結實如燈籠草子，殼有五稜，殼內包
 一實大如豆，實內細子大如菰子，生白熟黑，正圓如細珠，
 可愛其功能，金瘡止血，出竹下刺，性走而不住，雖有王命
 不能留其行，故名。

氣味 甘苦

能走血，分下乳汁，利小便，治癰疽惡瘡，又竹

木鍼刺在肉中，不出疼痛者，為末熟水傳即出。

△按王不留行，花似藤瞿麥花，而蓋此治惡瘡，故和名為
 瘡草。



金盞草

杏葉草
 長春花

俗云幾至世在花

本綱金盞花苗，高四五寸，葉似初生萵苣，葉厚而狹，抱莖

而生莖柔脆莖頭開花大如_ニ指頭金黃色狀如_ニ盞子_ノ四時
 不絕_ニ夏月結實在_ニ莖內_ノ宛如_ニ尺蠖蟲數枚蟠屈之狀_ノ其葉
 味酸煨熟水浸過油鹽拌食有_ニ治_ノ腸痔下血之功
 △按盞_音杯也其花形也近時出白花者為珍俗以為金
 錢花誤也



金錢花

夜落金錢

子牛花

和名抄俗云
 古無軟
 今云午時花

畫譜云出自外國梁時外國進花朵如_ニ錢亭_ノ可愛
 倭名抄云梁簡文帝有金錢花賦

△按金錢花葉狹長有_ニ鋸齒_ノ五六月開花深紅色形圓如

錢其色狀甚可愛日午盛夜子落俗呼曰午時花以金
 為金錢花者甚誤也



葶藶

丁歷 葶藶
狗薺 大室
大適

和名波末太加奈
一云阿之奈豆奈

本綱葶藶叔世利初春生苗葉高六七寸似薺根白色枝
莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色
月令云四月靡草死注曰靡草薺草藶之屬是也蓋有甜
苦二種其甜者不藥入用
子苦寒降氣以導腫氣其氣味俱厚不減大黃以洩陽
分肺中之閉亦能洩太便輔以大棗其苦者下泄之性急
既泄肺而易傷胃病人稍涉虛者宜遠之
△按葶藶俗云狗薺豆奈奈出於攝州者良播州者次之
然是非真葶藶子多用薺子偽之薺子出干



車前

當道車輪菜

茅茨堅墓衣

馬為牛遺

牛舌地衣

子五ツエ

和名於保波古

本綱車前草好生道邊及牛馬跡中故名之春初生苗葉
 布地如匙面累年者長及尺餘中抽數莖作長穗如鼠尾
 花甚細密青色微赤結實如葶藶赤黑色

子甘寒

利小便而不走氣

與茯苓收難產

又治目赤痛

大抵須佐他藥如六味地黃丸之用澤瀉可也非單用
 久服之物

△按車前子

子大葉

出於藝州者良攝州丹州次之今人取

其葉傳

一切腫物初發者然未

知的搗瘡血出者車前

葉可耳

其子能治內障明目今治疳眼灸八目鰻車前

子少糝和令吃之者有據

狗舌草



本綱狗舌草生渠塹濕地似車前葉而無文理抽莖開花

黃白色四五月採莖暴乾

氣味小苦寒有毒

治蟲疥瘙瘡殺小蟲爲末和塗之即瘥


いんげんそう

龍牙草

馬鞭草

鳳頸草

和名久末豆々良



ミア、ペンツァウ

本綱馬鞭草春月生苗方莖葉似益母對生夏秋開細紫

花作穗如車前穗又類鞭鞘故名馬鞭其子如蓬蒿子而

細根白小

苗葉寒苦微

破血行血活血治金瘡通月經治水腫鼓脹


太腹水腫

馬鞭草鼠尾草各一斤水一斗煮取五升去滓再煎令稠以粉和丸大豆大每服二三丸

加至四五丸神功

男子陰腫大如升核痛人所不能治者搗塗之

△按馬鞭草處處有之攝州之產良陰囊腫痛者用馬鞭草鼠尾草煎汁洗之佳



蛇含草

さぐらんそう

威蛇 蛇銜

紫背龍牙

小龍牙

俗云岐良牟草

セビエ ハアツアウ

本綱生土石上或下濕地其葉似龍牙而小背紫色一莖

五葉或七葉當用細葉有黃花者上但有二種細葉者名蛇

銜大葉者名龍銜

氣味苦微寒 傳蛇虺蜂毒及丹毒瘡腫即愈人家種之亦

令無蛇只用葉晒乾勿犯火根莖不用其根名女青

異苑云有田父見一蛇被傷一蛇銜一草著瘡上經日

傷蛇乃去田父因取其草治蛇瘡皆驗名曰蛇銜草

勿誤用有蘗尖葉者號竟命草味酸誤服令人吐血不止

速服知時子解之

女青

一名雀瓢

本綱女青即蛇銜根也

氣味辛平有毒人卒暴死者搗女青屑一錢安咽立活也又

辟穰瘟疫正月十一日寅日搗末女青盛

一種有藤生者生平澤葉似蘿摩兩相對子似瓢形大如

棗許故名雀瓢根似白微莖葉並臭也然則女青有草

生藤生二種矣

△按岐良牟草生山中移三種濕地葉花異峴草

みそくさ

勤音山陵翹

鳥草

水青

鼠尾草

和名美益月波木

俗云水掛草

チノイダツソ



本綱鼠尾草下濕地有之葉如蒿莖端夏生四五穗若車
前又似鼠尾花有赤白紫三種莖葉俱可以染皂四月採

葉七月採花陰乾

花葉苦微寒

古方療痢多用之

久痢

時止時作
名休息痢

搗末飲

服一錢

治連年下血

鼠尾草地榆二兩水二升煮取一升
升頓服二十升者不過再服亦

可為末服

反花瘡

生惡肉如飯粒破之血出隨生反
鼠尾草根切同猪脂搗傳

△按鼠尾草多出自攝河州干蘭盆聖靈祭用鼠尾草供

水因稱水掛草無別意但穗花長

俗傳鼠尾草莖葉浸

醴投陰地不日蛞蝓化生亦一異也海帶浸雨水則化

蛭之類矣

芳 酉 光明草

阿羅漢草

狗尾草

和名惠泥乃
古久佐
俗云波久佐



ケウタイツネウ

本綱狗尾草原野垣墻多生苗葉似粟而小其穗亦似粟
黃白色而無實又穗形象狗尾故名又秀而不實故字從
秀為秀凡赤眼拳毛倒睫者翻轉目瞼以一二莖蘸水戛
去惡血甚良

△按狗尾草原野多有之小兒用之鉤蛙戲者

倭

漢



體腸

うまきじ
かんけんさう

蓮子草 墨煙草
金陵草 旱蓮草
黑頭草 糊孫頭
猪牙草 黑莖菜
和名字未本多之

リイ チヤシ

本綱鱧腸草葉似柳而光澤莖似馬齒莖高一二尺開花

細而白其實若小蓮房鱧魚也其腸亦鳥此草柔莖斷之有墨汁出故名鱧腸

一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃紫色實亦作房而圓是乃

小連翹折其苗則皆有汁出須臾而濕

鱧腸草甘酸治血痢灸瘡血出不止傳之立已塗眉髮

生速而繁烏髭髮傳一切瘡止血排膿繫臂截瘡此草

男左女右置寸口上以古文錢壓定帛繫

△按鱧腸草旱蓮草田野濕地多有之折苗莖則出黑汁

葉似柳而小花落生而小正白不攢



レニキヤウ

連音旱蓮子

正形



中觀形



連翹

異翹三廉

蘭華根名

連軛又竹根

和名以多知久佐一云以大知波熟

本綱連翹其子折之片片有大小二種子亦有二種

大翹生_三下濕地或山岡上_三青葉狹長如榆葉水蘊輩莖赤
色高_三三四尺獨莖稍間開花黃色秋結實似蓮內作房
瓣根黃如蒿根

小翹生岡原之上花葉實皆似大翹而細南方生者葉狹
而小莖短纔高一二尺花亦黃實房黃黑內含黑子如

粟粒亦名旱蓮

出於蜀中者子似椿實之未開者殼小堅而外完無附莖

剖之則中解氣甚芳馥其實纔乾振之皆落不着莖也

出於江南者子如茵蔯殼柔外有附莖抱之而無解脉亦

無香氣乾之雖久着莖不脫此甚相異蜀中者為勝

連翹苦平氣味俱薄其用有三瀉心經客熱一也去上

焦諸熱二也為瘡家聖藥三也入手足少陽手陽十二


經瘡藥中不可無此乃結者散之義

△按連翹本朝古有之今無也而今有稱連翹者與以上

之形狀稍異記于左

わのまんぎやう

倭連翹



一按倭連翹枝莖柔垂似蔓而非蔓高者丈余周迴不過七八寸似草而非草也三月開花純黃形似桔梗花形而小繁茂遠望之如葉其花罷生葉似梅葉而微長小兩兩對生六七月葉間結實形似綿桃而小生青熟黃黑色中子生白熟褐色本草謂小連翹出於南方者是



蒴藋

花曰陸英

接骨草

葦草 芡 音急

シヨ 千ヨツ
和名抄云朔濁
二音此間音曹
久止久
今通云曹久豆

本綱蒴藿春抽苗莖有節節間生枝每枝五葉葉大似水
芥其花白其子初青如綠豆顆每象如蠶豆大又平生有
一二百子十月方熟紅其花曰陸英芥及接骨木三物亦
同一類故芥名木英接骨木名木英蒴藿名陸英花葉並
相似

蒴藿酸温或陸英寒

治骨間諸痺四肢拘攣疼酸肌皮

惡痒作浴湯妙

△按蒴藿原野多有之人用浴湯云治折傷小瘡



藍音覽

蓼藍 菰藍

馬藍 吳藍

木藍

右有五品所

圖蓼藍也

和名阿井

本綱蓼藍人家蔬圃作畦種至三四月生苗高三二尺許
葉似大蓼花紅白色實亦若蓼子而黑色五六月采實但

其葉可染碧不堪作澱

菰藍葉如白菰

馬藍葉如苦蕒

亦名大葉冬藍
夜藍者是也

此二藍

花子並如蓼藍

吳藍莖長如蒿而花白

木藍莖長如

决明高者三四尺分枝布葉葉如槐葉七月開淡紅花結

角長寸許累累如小豆角其子亦如馬蹄决明子而微小

迥與諸藍不同而作澱則一也皆性味不遠其藍子則專

用蓼藍

藍實

苦寒

解諸毒殺蟲蛟

蛟音其利

五臟調六腑通關

節益心力明目療毒腫

葉汁

苦甘

殺百藥毒及蜂蛸蛛斑蝥砒霜石等毒藍汁

一盞

入雄黃麝香
二物少許

以點毒蟲咬處仍服其汁神妙

汁以青繅布試以

一蜘蛛投入汁中隨化為水

應聲蟲病

出奇疾方

腹中有物作聲隨人語言名應聲蟲

病用板藍汁一盞分五服效

卒自縊死者

以藍汁

唇邊生瘡連年不瘥者

以生藍汁洗之

不過三度瘥


則青黑色亦可乾收用漆青碧又收藍澱浮沫謂靛花

氣味辛苦

解諸毒傳熱瘡止血殺蟲治噎隔與石灰作



解毒殺蟲之功似勝於藍

唐永徽中有一僧病噎不下食數年臨終命其徒曰吾死後可開吾咽喉視有何物苦我如此及死其徒依命開視胸中得一物形似魚而有兩頭遍體悉似肉鱗安鉢中跳躍不已戲投諸味雖不見食皆化為水又投諸毒物亦皆銷化一僧方作藍澱因以少澱投之即怖懼奔走須臾化成水世傳澱水能治噎疾蓋本于此



漆澆齋

靛花



青代黑

靛花青粉

黛眉色也滅去眉毛以此代之故名之

本綱青代黑以藍為之攪劉藍澱之浮沫掠出陰乾謂之靛

花即青黛黑也

氣味 鹹寒

解諸藥毒治小兒驚癇及疳熱瀉肝散鬱火

消食積吐血下血咯血傳金瘡惡腫陰瘡

△按青黛和薄共有之漢者呼青黛深青倭者呼藍黛淺青

用為畫具最入藥用亦佳



蓼 青料

青蓼

和名多下

リヤウ

本綱蓼其類甚多有青蓼香蓼水蓼馬蓼紫蓼赤蓼木蓼
之七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉亦相侶而俱
薄馬水二蓼葉俱闊大上有黑點木蓼天蓼蔓生葉侶拓
葉凡蓼花皆紅白子皆大如胡麻赤黑而尖扁惟木蓼花

黃白子皮青滑諸蓼並冬死惟香蓼宿根重生木蓼出於灌木類

苗葉濕

食之過多有毒發心痛和生魚食令人脫氣陰

核痛求死二月食蓼傷人胃婦人月事來時食蓼蒜變

為淋古人種蓼為蔬禮記云烹雞豚魚鼈皆實蓼干其

腹中而和羹膾亦須切蓼也後世飲食不用惟造酒麴

者用其汁耳

此乃花以多而名之者又月所生其花之氣香烈而苦
三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

△按青蓼喜濕地二三月生苗四五月繁茂至秋作穗開

細花紅白色播州津由每出穗蓼辛中有穗亦一異也

夏月摘其葉與鮓同食以為必用之物食魚膾用蓼酢

又採穗鹽漬與醢同食亦可也


蓋有和生魚食之令人脫氣之言則不可多食

乾蓼莖煮汁味甘僧侶用代鱉肺蓋造酒麴者用其汁

者未有之古今食品之用不用異同如此也鼈葉蓼戲

捕鼈入蓼於鼈口則出洄苦矣

麋蓼 澤蓼



水蓼

本綱水蓼生_ニ下濕水澤中_ニ葉似_テ馬蓼大_ニ干家蓼而長_ハ五六寸莖赤色水_ニ接食_フ之勝_ハ干蓼子_ニ莖葉_ニ辛_ニ蛇傷傳_フ之知_レ蛇毒入_ル腹心悶者絞_リ汁服_ス之_後多_クの_ニ居_ルを_ハ秋_ニを_ハ好_ムと_ス



馬蓼

大蓼黒記草

九_ノ物大_ニ者_ハ以_テ馬_ノ名_ヲ

本綱馬蓼生_ニ下濕地_ニ高_ハ四_ノ五_ノ尺莖斑_ニ葉大_ニ每葉中_ニ間有_ル黒

跡如墨點記有兩三種其最大者即水荳蔻也



荳蔻

いぬこ

鴻韻

龍古

遊龍

石龍

天蓼

大蓼

ホラシツロウ

和名伊豆多天

本綱荳蔻草生水旁如馬蓼而長大其莖粗如檉指有毛其葉大如商陸葉其花淺紅色成穗秋深子成扁如酸棗仁而小其色赤黑而肉白不甚辛詩大雅云隰有游龍者即此是也

△按荳蔻犬蓼之大者也凡物大者曰馬馬蘭馬藍之類是也而可給其物者以犬為和名犬山椒犬碗豆之類是也犬蓼亦有數種水蓼馬蓼共為犬蓼六月六月製神麴用蓼汁者以水蓼為良犬蓼之莖燒為炭為懷爐之炭佳勝於茄莖之炭能保火

けしご

毛蓼

俗云介太天



ミツ リヤウ

本綱毛蓼生山麓似馬蓼葉上有毛冬根不死蓋此與澤濕之蓼不同

莖葉辛温有毒

治癰疽瘰癧并碎納瘡中引膿血生肌

△按俗有用毛蓼為疝氣藥煎服者恐有毒之草多服則有害蓋水荭花治心氣疝痛及痞積與此相誤傳來乎

くはたんぐら

火炭母草



ホウタン モウツアウ

本綱火炭母草生原野中莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗
 形方夏有白花秋實如椒青黑色味甘可食葉味酸平有毒
 △按蓼類為炭能保爐也蓋此草蓼類而特有火母功乎

かきりろろ

三白草

和名加太之呂又佐

俗云半夏草



本綱三白草生田澤畔八月生苗高二三尺莖如蓼葉如
 商陸及青葙四月其顛三葉面上三次變作白色餘葉仍
 青不變俗云一葉白食小麥二葉白食梅杏三葉白食茶
 子五月開花成穗如蓼花狀而色白微香結細實根長白
 虛軟有節鬚狀如菖蒲根
 氣味甘辛寒有小毒治水腫脚氣利大小便消痰除積聚
 △按本草蘼茶注云三白草葉上有三黑點非白也仍和

名抄亦用其說共非也半夏生時分變自故俗曰半夏早

いどり

苦杖太蟲杖
斑杖酸杖

虎杖

和名伊太止里



フクヤシ

本綱虎杖生田野三月生苗莖如竹筴狀上有赤斑點初生便分枝子亦似荻葉葉圓似杏葉七月開花花狀似菊色似桃花九月結實又有無花者根皮黑色破開即黃似

柳根

虎杖根

甘微温

通月水

懸華治

五淋

最奇

石止

渴解

熱毒

暑月以根和甘草同煎為飲色如琥珀可愛甚甘美瓶置井中令冷徹如冰時人呼為冷飲子啜之且尊於茗極解暑毒其汁染米作糜饌益美

草名

此草之根可治諸般之病其根之皮如虎之皮故曰虎杖

左門

本草綱目卷之四十五 木部 虎杖

△按虎杖根出於金剛山者良小兒折其莖剥去皮吸之
味酸故名酸杖大抵高者不過三四尺然松前之虎杖
高丈餘而如木數冬亦有蜀本草言木高丈餘而宗奭
疑以為非蓋隨土產有不同豈惟虎杖耶

日本紀云反正帝生淡路宮時於是有井汲之洗太子
時多遲花落有井中因為御名號多遲比瑞齒別天
皇多遲花者今虎杖花也

虎杖


いさよりいさの杖を杖とせしむるをいさといふ

治奔怪病 人忽遍身皮底混混如波浪聲痒不可忍抓
乏血出不能解謂之氣奔以虎杖人參青鹽細辛各一
兩作一服水煎細飲盡便愈

蛇蘭草

本細蛇蘭草生平地其葉似虎杖而小節赤高一二尺種
乏辟蛇凡蛇虺毒蟲等螫取根葉搗傳咬處當下黃水

△按蛇蘭草生池隄虎牧之一類二種也



藕 音 尤


馬唐 馬飯
羊麻 羊粟
軒干 蔓干

俗云美曾無父良

本細藕生廢稻田中節節有根着土如結縷草而葉長堪飼馬馬食之如饴如飯羊亦食故名之其氣藕臭故曰藕

藕者朽木臭也

按藕俗云溝葎處處生麥田及溝葉細小而長



扁蓄

扁竹粉節草
扁辨道生草
扁蔓
和名宇之久佐

本綱篇竹春中布地生道旁苗似瞿麥葉細絲如竹及落
帶葉而不尖莖赤如釵股而弱引蔓促節三月節間開細
紅花如蓼藍花結細子根如蒿根爐火家燒灰煉霜用
根苦平

治熱淋瀝痛利小便霍亂黃疸療女子陰蝕及
痔又小兒蚊咬心痛面青沫出臨死者以水一石煎至
一斗去滓煎如饒隔宿勿食空心服一升虫即下也仍常煮汁食
△按篇蓄處處原野路邊多有之



蓋草

黃草鴨脚草
葦竹葦蓐
莢草熟蘆草
王芻

ツインツアウ

本綱蓋草生山谷葉似竹而細薄莖亦圓小煮以染黃色
極鮮好詩云終朝採綠不盈一掬又云葦竹猗猗是此蓋
草也

氣味平苦

治久欬上氣喘逆又洗一切惡瘡效

△按倭名抄云薑草

和名加木太宗


黃草

加伊奈本朝出式云川安草

出二

處以爲二物者非也多出於越前以爲洙家必用之物

薑汁加明礬赤黃則令色不脫也或下染藍上用薑汁再染則成藤懸色



茨梨子

休羽

外推

屈人

止行

茨

旁通

スエツリイツウ

和名波萬比之

本綱茨梨生道上及墻上布地蔓生細葉如初生皂莢葉

整齋可愛開小黃花其子有三角四刺實有仁其刺狀如

菱而小人行多着木履今軍家乃鑄鐵作之以布敵路名

鐵茨梨也蓋茨梨有二種杜茨梨白茨梨

白茨梨一名沙苑茨梨

綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色

本草綱目卷之六 雜草 卷之六 雜草 卷之六 雜草

如豌豆花而小九月結實作莢長寸許內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色

蒺藜子溫苦治惡血積聚癥及婦人帶下コレチ催生久服長肌

肉明目輕身妙黃色去刺用

神仙方云蒺藜子為末每服二錢新汲水調下日三服勿令

間斷服之一年冬不寒夏不熱二年老者復少髮白復

黑齒落重生輕身延年辟穀長生又治三十年失明眼

△按蒺藜生濱邊故稱濱葵出於豫州者良紀州者次之



穀精草

又星草

俗云波世久佐

ろせくさ

戴星草

流星草

コツツイェツノウ

本綱穀精草收穀後荒田中生之一科叢生莖葉俱青似

嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小白花點點如亂星可
饒馬令肥九月採花陰乾可結水銀


一種莖梗長有節根微赤者有之

花辛溫性浮能上行治眼病加而用之甚良明目退翳之

功似在菊花之上穀精草防風等分爲末米飲服之治目中翳膜甚有驗

△按穀精草出於參州今燐叔脹開而白如雪亦如花者

名糴ハミ音祿俗此花似之故名波世草



海金沙

ハキンスア
すくき

竹園莖

俗云頂奈久佐

又云多々収久佐

本綱海金沙生山林下莖細如線引于竹木上高尺許其
葉細如園莖葉而甚薄背面皆青上多皺文皺處有細沙子

狀如蒲黃粉黃赤色不開花細根堅強其沙及草皆入藥
七月收其全科於日中暴之小乾以紙襯裹以杖擊之有
細沙落紙上且暴且擊以盡為度

氣味甘寒 小腸膀胱血分藥也 熱在此二經 血分者宜之 熱淋急痛

者為末煎生甘草湯調服二錢 或加妙

△按海金沙和漢並用之出於江州者良又用江浦草子
偽之試之撚不粘者真也如撚土而粘者偽也



水楊梅

すいやうまい

地椒

スイヤンマイ

本綱水楊梅生水邊田野叢生苗葉似菊莖端開黃花實
如楊梅狀類椒而不赤氣味鮮 毒溫治疥瘡腫毒
△按毒草部所載石龍芮與此形狀相似疑是一物二種

矣其石龍芮葉似和人參葉而有光澤

詳毒草條下

有一種

俗云柳草又云鮑草

生田野其莖圓其葉似菊而長似柳

而有齒莖端開小白花結子似楊梅而青此所謂水楊梅乎然花有黃白之差

しうてくと

蜈蚣草

ウ、コシスウ



本綱蜈蚣草生村落墜野間左蔓延右右蔓延左其葉密而對生如蜈蚣形其穗亦長俗呼過路蜈蚣其延上樹者呼飛天蜈蚣也根苗皆可用氣味苦寒

解諸毒治大便不通癰腫搗塗或末服排膿

蜈蚣傷者入鹽少許搗塗○托裏散一切癰疽及腸癰

已破而膿血不散發熱疼痛能食者並宜排膿用蜈蚣赤芍藥當歸甘草等分為末每服二錢溫酒下



碎米薺

まんげろ

俗云蓮華花

救荒本草云碎米薺三月米葉可作羹

△按雖不謂其形狀而所圖似今云蓮華花也蓋碎米薺之名義未解也蓮華花春生苗其葉似皂莢及槐之嫩葉兩兩對生枝莖布地如蔓節上抽莖頂開花自三月至四月末盛其花淡紫色本間有白處形似蓮華故名結莢三稜黑色長五六分中有細子自撒易生其多處如敷錦於地人以爲野遊之一興

有白花者和列多有之能治湯火傷揉葉傳汁


一種有似碎米薺莖葉而四月開正黃花者其花生莖末形如半邊蓮五月結莢長一寸許似野豌豆

えんえんせん

急解索

半邊蓮

ハシベンレン



本綱半邊蓮生陰濕堦塹邊小草也就地細梗引蔓節節而生細葉秋開小花淡紅紫色止有半邊如蓮花狀故名氣味辛平治蛇傷搗汁飲以滓圍塗之

△按半邊蓮和列河列堤邊有之一莖叢生如蔓葉似碎米薺而秋開淡紫花如刀豆花樣而小似半蓮

あふちてい

獨行虎

羊角子

紫花地下

箭頭草

米布袋

ムハア、イシタ



本綱紫花地丁處處有之其葉似柳而微細夏開紫花結角平地生者起莖溝壑邊生者起蔓

又云和村籬落生者夏秋開小白花如鈴兒倒垂葉微似木香花之葉此與紫花者相戾恐別一種也

氣味寒苦辛

治癰疽發背無名諸腫貼之如神連根用之以白

麩和成鹽醋浸一夜貼之

昔有一尼得此方療癰疽瘡此草根

去粗皮用之

同白蒺藜為末油和塗神効

△按紫花地丁未考倭名凡抽莖梢着花狀頗似荷者得地丁之名蒲公英為黃花地丁則紫花地丁者今云蓮華花而本綱之註亦能當矣然畫圖之形狀不似蓮華花故不決救荒本草碎米薺之圖宛然似蓮華花故重出之

鬼針草

鬼針草



クイナツクサ

本綱鬼針草生池畔方莖葉有稜子作釵脚着人衣如針故名之
氣味苦平
治蜘蛛蛇咬并汁服併傳又蠟薑傷塗之

狼把草

一名郎耶草

本綱狼把草生山澤高三四尺葉作鴈齒如鬼針草苗葉有稜如釵脚狀
氣味苦平
與鼠尾草功用近故本草見鼠尾草下今附于此

本草綱目卷之六 木部 三十一



筠列

見腫消

クニヨシスヤリノ

本綱見腫消生筠列春生苗葉莖紫色高一上二尺葉偶聚而光面青紫赤色

氣味

酸澀有微毒

消癰腫及狗咬搗葉貼之

△按見腫消名義其功可知而倭如此草未見識者但此圖三才圖會所圖也而有二品葉形大異



草綿

古終

久佐和夕

俗云木綿

蠶綿曰真綿故稱之木綿別有木綿昆斑花樹類

本綱有草木二種，俗名古貝（出干澤木類，俗草者名）。古終此種出南番，宋末始入江南。今則徧及江北，與中州
矣。不蠶而綿，不麻而布，利被天下。其益大哉。四月下種，莖
弱如蔓，高者四五尺，葉有三尖如楓葉。入秋開花，黃色如
葵花而小，亦有紅紫色者，結實大如桃，中有白綿。綿中有
子大如梧子，亦有紫綿者。八月采採謂之綿花，並出中枝
初為細纒以為帛，甚軟白。

子油

辛熱微毒

治惡瘡疥癬，燃燈損目。

史炤釋文云：木綿，江南多有之。以春二三月下種，既生須
一月三薹至秋生黃花，結實及熟時其皮四裂，其中綻出
如綿。土人以鐵鋌碾去其核，取如綿者以竹為小弓，長尺
四五寸許，牽弦以彈綿，令其外細卷為筒，就車紡之，自然
抽繅如縲綿狀，織以為布。

（糸）

（糸）

類聚國史云：桓武天皇延曆十八年七月有二人乘小船

卷之三
漢書
卷之三
卷之三

漂着三河國以布覆背有犢鼻不著袴左肩著紺布形似
袈裟羊頭廿身長五丈五寸耳長三寸餘言語不通不知
何國人大唐入等見之僉曰崑崙人後頗習中國語自謂
天竺人常彈一弦琴歌舞哀楚閱其資物有如實者謂之
綿種依其願令往川原寺即賣隨身物立屋焉後遷往近
江國國分寺十九年四月十一日以彼綿種賜紀伊淡路
阿波讚岐伊豫土佐及大宰府等諸國植之其法先簡陽
地沃壤堀之作穴深一寸衆穴相去四尺乃洗種漬之令
經一宿明且植之穴四樹以土掩之以手按之每且灌
水常令潤澤待生芸之

△按相傳昔昔蠶綿之外以穀皮爲衣服謂之木綿訓由

中古草綿始也本朝神武朝先於中華凡可二百羊矣

今聞唐綿灰白色不如倭綿潔白者也下種先漬水一

宿可糝灰否則生出而蟻子害其苗蓋有早晚早者八

十八夜以後於麥苗之際撒之晚者四月芥麥攪株傍

撒之既生待梅雨晴可拔去繁生者稍長後摘去楠葉
至立秋前三日則止其花向日性惡北風喜西風最惡
雨濕從來南方之種也俗呼曰日照草是也如值濕雨
則桃不開口而凋謂之保呂綿為濕熱所蒸則不意葉
凋落此乃綿之病名阿夫急乘朝露

大抵枝葉花似黃蜀葵而花淺黃色其實如桃呼曰綿
桃四裂中吹出白綿以攪車線去中子其子小者精綿
多稠殖生綿為上而品類甚多有白花者有本赤末白
花或曰午前黃色午後赤紫色者名曰半變
多田綿出於攝州花黃而綿甚白稠強最良然不

殖生故今多不種用

蝦手綿

其葉深刻如蝦手樹葉故名之白花而桃

大其綿潔白然桃數少

神樂綿

其花有白有黃杈亦攢生儼似神巫所持

鈴故名種之有大利

利國三才圖會
卷之四
三

佐利綿

出於河州其枝葉帶赤色其花本淡紅末黃色或名赤叔者亦此類也綿之能殖生凡神藥佐利之二品爲最上三十余年以來行于世蓋佐利者棄去之訓也相傳有人變於子種始得此種有聲乞之而不與怨棄去其妻故名但恨不肥圃不能茂

煙草綿

其葉青色而枝極際生小葉形如煙草芽故名之桃小而不佳

凡攝津及備後之產爲最上播磨丹波備中並佳河州紀州次之泉州爲下其他亦出處不枚舉但北國不種凡至白者無如攝州者緒細者無如河州者太顆者無如丹波者

綿子 綿核

一桃中子六七或八九有之小者綿佳

其用甚多也磨末榨盤油謂白油光大明也榨糟爲田糞良其磨殼燒火以代薪其灰以琢銅鐵器鏽垢能脫其灰汁以洗晒布帛汚穢去爲純白造糕屋作賤果子

以綿子灰汁少許和麩糕令果子脹大然有小毒
綿子油
濁不堪用
攝列平野人
加用石上灰
始考澄法今盛用

爛腸草



秋海棠

ツウハイダン

三才圖會云秋海棠近日見人取梗去皮蘸糖霜吃頗清
 香其花艷麗可愛

詳躍鯉草本花詩譜云秋海棠嬌冶柔軟其同美人捲粧
 此品喜陰一見日色則瘁九月收枝上黑子撒於盆內地
 上明春發老根過冬發花更茂

△按秋海棠莖葉畧似款冬而小軟有艷梗帶赤色抽莖
 開花似蕙蘭玉簪花之輩而淡紅可愛其子生枝葉間
 形色似零餘子而大如豌豆種之易生



免兒傘

ふれすげき

俗云蔽菅芒

救荒本草云免兒傘生荒野中苗高二三尺許每科初生一莖莖端生葉一層有七八葉每葉分作四叉排出如傘蓋狀故以爲名後於葉間攢生莖上開淡紅白花根似牛膝而踈短採嫩葉煤熟換水浸淘去苦味油鹽調食

△按免兒傘五月開黃花似菊而如散盤狀



樊噲草

ふんふん草

俗稱未詳

△按樊噲草高，一二尺，一莖一葉，有七切，又似兔兒傘葉而小，莖端開小白花，畧似慈姑花。或名之曰散管莖，兔兒傘名樊噲會草者，亦有



圖萍蓬草

切切切

鐵輪花

共俗稱

△按高一尺許，葉圓，小徑一二寸，畧似萍蓬草葉。三四月抽莖開黃花，似單葉梅花樣。



紫羅襪花

草本花詩譜云：紫羅襪花其草本，色紫翠如鹿葱花，秋深

分本栽種四月發花可愛



翠蝴蝶

ふこし

竹節菜

翠娥眉

簀竹花

倭青草

鴨跖草ナラサ之一類乎

見本草卷一可考合

農政全書云翠蝴蝶南北皆有山野中亦有之葉似竹葉微寬短莖淡紅色就地叢生ミトイイ擢節似初生嫩韋節初葉間開翠碧花狀類蝴蝶其葉味甜採嫩苗葉燂熟油鹽調食

ふさ

王蝴蝶

蝴蝶草



草本花詩譜云蝴蝶草花儼若蝶狀色黃上有赤色細點

潤葉秋時分種

續賢說云雲南臨安之南產靈草狀似蝴蝶名之玉蝴蝶
凡仕宮閤廣者以此草綴於衣領中可以預知蠱毒領中
颼颼作聲其家具齟斷不可食矣無毒則寂然無聲以是
為驗此草雖土人亦罕得之劉紹卿官遊此地得藏于家
△按王蝴蝶翠蝴蝶共是一物乎唯花色黃與翠之異耳
本朝未聞有之其花美而知毒之有無也誠有益草也



鸛子草

不記莖葉之形狀

本綱下有之之鸛子草蔓草也當夏開花形如飛鸛翅羽皆
距皆全是媚草採曝以代面壓蔓上春生雙蟲食葉收入
粉奩以葉飼之老則蛻而為蝶赤黃色女子收而佩之名

媚蝶

△按鶴子草此云鷺草之類者乎然鷺草不蔓鶴子草蔓也當入蔓草部而以花異形列蝴蝶及鷺草類

連路鳥



鷺草

鷺草

鷺草

連路鳥草

豆禮佐岐


共俗稱也本名未詳

△按鷺草奧州處處有之春生苗葉如麥嫩苗高尺許六月抽莖開花正白色如雪形似鷺鳥故名

連路草

與鷺草一類異種性惡濕喜陰處赤土原


非濕草高五七寸葉畧大似万年青嫩葉而淺青色夏開花白色帶微青其形似鷺十有余羣飛故名



いしづりさき
あざゆき
緒手巻
共此俗稱
本名未詳

絲線草

△按絲線草高二三尺葉似胡蘿蔔葉二三月開花白色帶黃形似簍故名之
一種有八重絲線草其花不單無周圍角簍也



善界草

せいさい
俗稱本名未詳

△按善界草高六七寸葉似胡蘿蔔葉三月開花黑赤色形似寶鐸花罷後似白熊毛

草列珠


俗稱



草列珠

樹有列珠木

△按草列珠高二尺許叢生葉似桃葉六月多開小黃花



草蓮花

俗稱

俗稱

△按有草蓮花者高二尺莖韌垂葉如牡丹葉而狹小長

又似淡雪草葉六七月抽莖開白花似蓮花而最小單葉其枝絲垂而花向下甚艷美可愛

△農政全書有蓮子草者此葉形疑鱧腸草矣曰蓮子

草以其花之萼莢狀似小蓮蓬樣故名生_ハ下湿地苗高
一尺餘莖紫赤色對生莖又葉似_ハ小桃紅葉而長稍間
開細辨白花而淡黃心其葉味苦見_ハ鱧腸草_ヲ前

わいゆささる 俗稱本名未詳



淡雪草

△按淡雪草高七八寸葉似草蓮花五月抽莖開花白色
細小似_ハ唐松草之輩



泡盛草

わいりき 俗稱本名未詳

△按泡盛草高一二尺一莖數朶葉似草蓮花而畧圓夏開白花細小似花莖之穗



山萵苣

俗云九輪草

救荒本草云山萵苣生山野間苗葉掘地生葉似萵苣葉而小葉脚花又頗少葉頭微尖邊有細鋸齒葉間攢莖開淡黃花苗葉味微苦

△按山萵苣此云九輪草乎似萵苣葉而扁邊有細鋸齒而葉脚窄葉心莖淡紫三四月抽莖開小花似櫻草花而畧大生於莖圍八極各一樣如車輪至極如此七層或九層宛然似浮屠九輪故名有紅白紫三種結子茶褐色其葉心莖中有紫色脈系凡形狀乃九輪草也唯

山蔞草，花色黃也。九輪草，花未有黃色者，以為異。



櫻草

さくらさき

△按櫻草，生山谷中，即九輪草之一類異種也。葉形相似，微小，邊無齒，刻不甚，光澤，而葉心白。九輪草，三四月抽葉，心紫。莖頂生花，似九輪草花，而單，淡紫色，或白色。又如櫻花，最艷美，故名櫻草。結蒴兒，青色，內結子，初青，後茶褐色。人家移種之。

本草綱目卷之九 雜考 九葉草


くさくさ 俗稱本名



九葉草

△按九葉草高尺許一莖無枝葉而葉似車百合葉而莖圍相列生九枚秋開黃花似旋覆花

さへさへ 俗稱本名



澤桔梗

△按澤桔梗高近二尺葉似山丹草葉而短三四月葉間開花形似桔梗而小紫色頗似水堯花而淺水中亦生多生濕地水草部

らるゝさう 俗稱 本名

丁子草



△按丁子草高尺許葉似澤桔梗而細長又似山椒三月
葉間著花層層其形如丁子而紫色結莢大如綠豆而
一拊二莢向上如角

さんむらじ 俗稱 正字

替波丁子



△按替波丁子高二三尺葉似山漆葉而小其花黃色似
菊而小有單葉有千葉自六月至九月逐日開


吉野 静 俗稱未詳



吉野静

俗稱未詳
静者源義經
之寵妾有於
吉野山歌舞
之事好事者
比其美以名
之


△按吉野静高尺許葉似澤桔梗而大三四月開花白色而紫彩點及赤黃色小點甚巧艷



二人静

俗稱未詳
謠歌云静女
之幽靈爲二
人同遊舞此
花二朵相双
豔美以名之

△按二人静高尺許葉似櫻桃葉而厚二月葉間開白花形如蓼穗而二小朵成枝



千日紅

せんじつこう

△按千日紅高二三尺莖似秋海棠而淡紫色葉似雞頭草而大面有毛茸八九月生花淡紫色千葉圓而形似楊梅形其盛久可百日矣有樹名百日紅者以勝之稱千日紅不實唯收花二月揉碎之蒔種生或插枝亦活凡如菊花無實者近年知蒔花



粉條兒菜

黃菅草
紅菅草
共俗稱

農政全書云粉條兒菜生田野中其葉初生就地叢生長則四散分垂葉似荳草葉而瘦細微短葉間攢葦間開淡黃花葉甜煤熟油鹽調食

△按黃菅草高二三丈葉似荳草而細硬又比菅則少稠六月開花黃色單葉似姬荳草花所謂粉條兒菜是也紅菅草葉與黃菅草同抽莖開花濃紅色似荳草花



藁荷草

俗稱林銘

△按藁荷草高二丈葉似藁荷四月抽莖開花如穗而細白花

ウリナヅク

俗稱本名未詳

綆摺草

古者與州信夫郡出綆名綆摺其文如亂髮而美以此之名乎



△按綆摺草^ハ高^ハ五^ハ六^ハ寸葉如^ハ初生稻苗而細軟三月開花如^ハ穗而色淺赤

らんぎく

俗稱本名未詳

亂菊



△按亂菊高七八寸葉似^ハ櫻而厚狹小其枝桠繁七八月葉間抽^ハ細莖著花淺紫色如^ハ穗一種有^ハ白花者

みづひら

俗稱未詳

水引草

紙然彩色代
絲繩括物名
水引此草穗
莖稍似故名
水引



△按水引草高一二尺葉似楊樞而不皺秋出長穗著小
花紅色其莖圓纖如紙然鬚及水引故名

わづらひら

俗稱未詳


杜鵑草



△按杜鵑草高尺餘葉似百合葉六七月抽莖葉間開小
黃花或白或白入紫蒼子或濃紫入白蒼子
一種白色有淺紫點名之山杜鵑

やろさう 俗稱 本名未詳

螢草



△按螢草高尺許葉似櫻葉而小四五月開小白花有紫理而花多著

ころ力を 俗稱 本名未詳

虎尾草

農政全書有
虎尾草莖葉
形狀似之然
不言開花



又山草有同名各別也

一按虎尾草高二尺許葉長三四寸末窄尖深綠色厚皺有鋸齒六月莖端著花極細白如穗末窄似獸尾故名一種有淺紫色者俗呼曰珊瑚色



和漢三石記
卷之三
三

玉毬花

俗云松虫草



△按玉毬花高七八寸葉畧似蕪菁葉而小四五月抽莖
開花淺紫色細小



雉子竄

此草葉細密
雉子逃隱可
免獵佃故名

俗稱 本名 未詳

△按雉子竄高二尺餘葉似柞菜葉而細密三月葉間著
小白花極細難見隨結子青圓秋熟則赤大如南天
子

多しくく多

俗稱未詳

猩猩袴



△按猩猩袴高六七寸葉似蕙而短五六月開花淺紅色似櫻草花而稍小

くやうくさ 俗稱未詳

熊谷草



△按熊谷草高五六寸葉似款冬而小三月抽莖開花內有細荅子花形似母衣源氏武臣有熊谷直實者一谷合戰有戰功其圖負母衣形勢讚之此草形似母衣故以熊谷名之迂遠之甚者也

農政全書所圖如左而
花似矢頭與本文不合
疑畫工之訛



董董菜

箭頭草

俗云矢筈草

又別有矢筈草

見干後

農政全書云生田野中苗初搗地生葉似鋌箭頭樣而葉
蒂甚長其後葉間攢莖開紫花結三瓣蒴兒中有子如芥
子大茶褐色味甘今人用根葉搗傳諸種毒良
△按矢筈草高尺許葉厚青色類蕎麥葉又似矢羽形開
小白花帶微紫結子如芥子大



風樓草

俗稱

本名

△按風樓草高六七寸葉似毛茛葉而有毛三四月葉間出莖開花單葉紫色形似梅花

俗稱本名

夏雪草



△按夏雪草高二寸許葉似草烏頭葉而小春開小白花單葉似梅花其根似生薑而小

俗稱本名

梅鉢草

今以梅花為衣服之文呼日海鉢故名




△按梅鉢草高四五寸葉畧團厚小而青色帶赤三月開

白花單葉似梅花蓋風樓草夏雪草梅鉢草一輪草之
 花皆似梅三月開單白似梅

しやうめさう

俗稱本名

鹽竈草




△按鹽竈草高六七寸葉似小菊葉無切叉秋開花淺赤

色而小

いりくさ

俗稱本名

碇草



△按碇草高五六寸細莖葉似猴溺木葉三月開小白花

形如舟，碗又有紫花者



華鬘蔓草

ワタナシ

俗稱

△按華鬘草，高尺餘，葉似石龍芮而小，三月莖端開花，淡紅色，作房，其花排畧長，似鈎，華鬘狀，故名。



曼陀羅花

マンダラ

俗稱林詔

毒草類有同名不同


△按此云曼陀羅花，高六七寸，葉似華鬘草，葉三月抽莖開花，黃色，帶微赤，而小，蓋法華經曰：雨曼陀羅華者，即

朝鮮朝顏也

詩見于毒草類

ちやうそく

俗稱本名



潮風草

△按潮風草高一二尺葉似紫苑而短小三四月開花黃色作房又有赤者

ちやうそく



有馬草

撮列有馬名
有之故名

△按有馬草高尺許葉似初生椶櫚葉而小二三月抽莖開黃花形畧似蘭花而不香

俗稱木詳

逢坂草

しづろ



△按逢坂草高七八寸葉似眼皮草葉五六月開花亦似
眼皮草花形而有白紅淺紅之數品但莖莖弱長
于前莖節帶黑故又名節黑遠列新坂多有之

俗稱木詳

日向堪



△按日向堪高三四尺葉似牛蒡葉而小六七月著花似
楊梅形而圓大硬

ふらぐくよ 俗稱本名

藤袴




△按藤袴高二三尺葉似女オミナ即花葉而無切又六七月開

細白花似繡線花此與礬邊草一類二種乎

蘭和名曰藤袴和歌亦然而以此草呼同名何

いそぐくよ 俗稱本名

礬邊草



△按礬邊草高尺有余葉似藤袴葉四五月開花細白如

繡線菊花而數朶美又淡紅色者有之

下...
...

...



白絲草

雪筆

俗稱 本名 未詳

△按白糸草高五六寸葉似猩猩袴葉而細三月白花似穗又如筆頭



野鸛草


のびき

俗稱 本名 未詳

△按野鸛草生原野中莖勁如蔓非蔓一節三葉大如槐葉三月開花於葉杈小黃色後結子小毬五顆攢生

鹽蓬

鹽蓬




農政全書云：鹽蓬生水傍下濕地，莖有線楞，葉似蓬而肥壯。此蓬葉亦稀疎，莖葉間結青子，極細小，其葉微鹹。


花名茶花兒

望江南

俗云：鮑虹豆



農政全書云：望江南人家園圃中多種，苗高二尺許，莖微淡赤，色葉似槐葉而肥大微尖，開五瓣金黃花，結角長三寸許，葉味微苦。



風花菜

フナサ

全云風花菜生田野中苗高二尺餘葉似芥菜葉而瘦長
又多稍間開黃花如芥菜花辛微採嫩苗葉燂熟水浸去
苦味油鹽調食



白屈菜

ハクキ

農政全書云白屈菜生田野中苗高一二尺初作莖生莖

葉皆青白色莖有毛刺稍頭分叉又上開四瓣黃花葉頗似
 山芥菜葉而花又極大又似漏蘆葉而色淡



雨點兒菜

全云雨點兒菜生田野中就地叢生其莖脚紫稍青葉如
 細柳葉而窄小^{スナク}抽莖^{テヲ}而生又似石竹葉而頗硬稍間開小
 尖五瓣白花結角比蘿蔔角又大其葉味甘



星宿菜

えんぐさ

俗云三國草

全云星宿菜生田野中作小科葉似石竹葉而細小稍上
 開五瓣小尖白花苗葉味甜
 △按三國草高尺許葉似石竹葉三月開花細小白似唐
 松草花花罷有細子所謂星宿菜是乎



毛連菜

常十八

全云毛連菜生田野中苗初搗地生後攢莖又高二尺許
 葉似刺薊葉而長大稍尖其葉邊襠曲皺上有澁毛稍間
 開銀褐花微苦採葉燂熟油鹽調食

△按毛連菜處處有之葉緣微曲所謂襠音襠俗云倍里

せんくろふ

千屈菜



全云千屈菜生田野中苗高二尺許莖四楞葉似山楝菜葉而不尖又似柳葉菜葉亦短小葉頭頗齋葉皆相對生梢間開紅紫花葉甜採嫩苗葉燂熟水浸油鹽調食

くさのいっしやう 荒香

草零陵香



真零陵香見
于芳草下

全云草零陵香菜人家園圃中多種之葉似苜蓿葉而長大微尖莖葉間開小淡粉紫花作小短穗其子如粟粒苗

葉味苦今人遇零陵香缺多以此物代用治病

いっさうさい

翻白菜



委陵菜

農政全書云委陵菜生田野中苗初搗地生後分莖又莖節稠密上有白毛葉彷彿類栢葉而極闊大邊如鋸齒形面青背白莖葉稍間開五瓣黃花葉若微採苗葉煤油鹽調食

せんそうさう

其發芽



剪刀股

農政全書云剪刀股生田野中處處有之掘地作科苗葉似嫩苦苣菜而細小色頗似藍亦有白汁莖又稍間開淡黃花葉味苦採苗葉煤熟去苦味油鹽調食



蠅子花菜

野菠菜

全云蠅子花菜生田野中苗初掘地生葉似初生菠菜葉而瘦細葉間攏生莖又高一尺餘莖有線楞稍間開小白花其葉苦採嫩葉煤熟油鹽調食

わい まかんさ

婆婆指甲菜



農政全書云婆婆指甲菜生田野中場地攤科生莖細弱
葉像^{カタル}女人指甲又似初生棗葉微薄細莖稍間結小花蒴
苗葉^{味甘}採嫩苗葉燂熟油鹽調食

のういさき

野茴香



真茴香見干
葷草下

農政全書云野茴香生田野中苗初搗地生葉似掃娘蒿
葉微細小後干葉間攪葶分生莖又稍頭開^キ黃花結細角

本草綱目卷之四十五 菜部 香菜 有黑子葉味苦

有黑子葉味苦



香菜

かきん

農政全書云人家園圃種之苗高一尺許莖方寬面四稜莖色紫稔葉似薄荷葉微小邊有細鋸齒亦有細毛稍頭開花作穗花淡藕褐色味辛香



牻牛兒

けんのちやうこ

鬩牛兒

全云牻牛兒生田野中就地拖秧而生莖蔓細弱其莖紅

紫色葉似荳蔻葉而瘦細而稀疎開五瓣小紫花結青膏
 葵兒上有一嘴其尖銳如細錐子狀小兒取以為鬪戲其
 葉微苦



火燄菜

農政全書云火燄菜人家園圃多種苗葉俱似菠菜但葉
 稍微紅形如火焰結子亦如菠菜子苗葉味甜性寒冷



遏藍菜

全云過藍菜生田野下濕地苗初揭地生葉似初生菠菜葉而小其頭頗團葉間攢莖分叉上結莢兒似榆錢狀而小其葉味辛香微酸性微温



胡枝花

和名波不

隨軍茶 救荒

天竺花 花史

鹿鳴草 以下出和名抄

茅子花

芳宜草

萩 音蕭宵

救荒本草云胡枝花生平澤中有二種葉形有大小而大葉者類黑豆葉小葉者莖類著草葉似苜蓿葉而長大花色有紫白結子如粟粒大氣味與槐相類救飢採子微青昂成米先用冷水淘淨復以滾水湯三五次去水下鍋或作粥或作炊飯皆可食採嫩葉蒸曬為茶煮飲亦可
花史云天竺花自五月開至七月花頭細小其色純紫而枝葉如嫩柳其幹之長與入等

△按胡枝花叢生枝長垂蔽地狀似絲垂櫻而一極三葉其葉似棗葉又似南天燭秧而不光柔軟秋著小花淡紫色新撰萬葉集曉露鹿鳴花始發者是也俗專用萩字奧州宮城野方二里許萩生茂

秋の萩 萩の秋は芽みさく夕陽はさくらさく

有山萩有白花者有白紫開分者北國山中有大木可為柱者四國山中有南天燭大木俱叢內人不信

山萩又名真萩葉大團有大木雄萩葉大亞山萩花淺紫雌萩城野葉花小共結實褐色大可豌豆扁中有細子



かゝらひまゐ

横目草

結縷草

鼓筆草

傳隋

かろまゐ

俗云高麗菜

救荒本草云師古漢書注曰結縷蔓生著地之處皆生細根如絨相結故名之今俗呼鼓筆草兩幼童對御之手鼓中央則聲如筆也

△按萊

和名一名波

一名類草田廢生草曰萊今俗用芝字芝之

瑞草也凡荒野堤岸雜草自生牛鹿常齧之故夏野萊

不過數寸頗如青種然

結縷草此一種萊似絲莖秧而無枝極其根細似蔓而相延結秋抽細莖出穗似雀麥細冬枯春生栽假山稍長時均蒨之則最美也又其老莖以鼓筆也如上說



莖

音勤

和名須美禮
俗云相撲草

苦莖

苦莖

本綱蘼荬曰蘼菜野生非人所種葉似蕺菜花紫色劉
錫曰說文云蘼根如薺葉如細柳子如木蒸為食之甘滑
也而云苦蘼古人語倒猶甘草謂大苦也

△按蘼字未詳本作蘼

黃土乃黏者今人謂木中泥黏者為蘼

從草从土會

黏土字義又謂為頭苗為蘼草

音謹

又木蘼

作蘼蓋為

頭苗僅共有黏汁也然蘼荬所

三品者即須美禮也田野

草也葉似蕺菜及旋花葉而小其根有畧缺三四月

抽莖梢開小紫花其莖曲垂作鉤小兒戲採二莖鉤與

鉤對引則以莖切落方為負因名角力草鉤子內有細

子其子綻脫殼三開

李時珍以蘼為異者不出又似柳葉者非也故省其說

小者亦有

施河石

苦力


此草水邊多生

凡小兒取為鬪戲者犢牛兒蘼力草之二種中蘼名高

本草綱目卷之六 草部 弟切草

正字未詳

弟切草



△按弟切草初生似地膚子秋而兩兩對生有枝極而莖葉極之有汁源更變紫色六七月開小黃花單五瓣有細葉結莢有三稜中有細子黑色

味香美

莖葉傳金瘡折

傷及一切無名腫物有神効相傳花山院朝有鷹飼名晴賴精其業也入神有鷹被陽按草傳之則愈人之問草名秘之不言然有家弟密露洩之晴賴大怒又傷之自此知鷹之良藥名弟切草一種莖弱不起如蔓而葉花子不異葉畧小其味

矢筈草



△按矢筈草出野堤小草也小葉似槐及奴柘而長抱莖
 生高二尺許枝條希而如著萩之葦秋葉更結小花穗
 微似帚草穗其葉及晚景則如萎如睡朝乃如故也
 董董菜 出千前 眞矢筈草矣此草名矢筈之謂未審

雌



雄



角觥草

カササギ

力草

本名未詳

本呼董名角觥
 草花與花相引
 爲勝負其趣一
 也

△按角觥草原野湿地有之葉布地叢生似忍藜微扁似石莖而色淺秋起莖墳作穗青白色可有細子而不見其莖扁強健長六七寸小兒取莖縮穗結如線而用二箇一揷其穗兩人持莖相引而切方為輸以戲因俗名相撲取草自茂盛為農圃之妨引根強難拔因名力草丁種相似而莖葉穗俱瘦者俗以為角觥草之雌



菅

音

和名須介

不載本綱蓋是前
三稜之屬而根異
如香附與蚊帳鉤
若之異三稜草亦

△按字彙曰菅葉似茅而滑澤莖有白粉柔韌可為索今云須介葉有劍脊而硬不熟莖本白別抽一莖如荻莖而出穗似車前穗而短為枝六月前葉乾光白色縫莖美也如列金澤攝列深江勢列齋官多作出菅莖根能治積聚

やろろ

矢苦草



△按矢苦草出野堤小草也小葉似槐及奴柘而長抱莖生高二尺許枝條希而如著荻之葦秋葉交結小花穗微似帚草穗其葉及晚景則如萎如睡朝乃如故也
董董菜 出干前 眞矢苦草矣此草名矢苦之謂未審

雌



雄



角觥草

ろろろろ

ろろろろ

力草


本名未詳

本呼董名角觥草花與花相引爲勝負其趣也

△按角觥草原野湿地有之葉布地叢生似忍凌微弱似石莧而色淺秋起莖墳作穗青白色可有細子而不見其莖扁強健長六七寸小兒取莖締穗結如繩而用二箇一挿其脅兩人持莖相引而切方為輸以戲因俗名相撲取草自茂盛為農圃之妨引根強難拔因名力草丁種相似而莖葉穗俱瘦者俗以為角觥草之雌

丁

和名須介



菅

音

不載本綱蓋是前
三稜之屬而根異
如香附與蚊帳鉤
其之異三稜草亦

△按字彙曰菅葉似茅而滑澤莖有白粉柔韌可為索今云須介葉有劍脊而硬不韌莖本白別抽一莖如薹而
出穗似中前穗而短為枝六月新葉乾光白色縫莖美也如列金
澤攝列深江勢列齋官多作出菅莖根黑能沱積聚



本

總

八一
六九



李處總

八一
六九

五 十 九

毒草類

地
倭漢三才圖會



本
總

八一
六九

AE
4
T4
1824
V.95

和漢三才圖會卷第九十五目錄

毒草類

大黃

防葵

大戟

續隨子

蓖麻子

木藜蘆

商陸

狼牙

澤漆

葭蓉

常山

萬年青

狼毒

藺如

甘遂

雲實

藜蘆

附子

烏頭

之

草鳥頭

歡喜草

半夏

射干
ひめまが
小射干

玉簪

曼陀羅花

平戸躑躅

映山紅

白附子

芍藥

蚤休

烏扇

小玉簪

羊躑躅
其躑躅

永來部躑躅

芫花

天南星

菩薩草

鬼臼

鳶尾

鳳仙花

稿躑躅
岩躑躅

山躑躅

堇花

醉魚草

石龍芮

葶麻

鉤吻

莽草

毛茛

海芋

茵芋

牛扁

透山根

風建草

金英草

薔薇

薔薇

薔薇

薔薇

薔薇

薔薇

薔薇

薔薇

薔薇

薔薇

薔薇


和漢三才圖會卷第九十五

攝陽 城醫法橋寺島良安 尚順 編

毒草類

殺大黃

殺大黃



大黃

唐音

ダア、ハア

だいよう
おやー

黃良 將軍

膚如 火參

和名於保之

本綱大黃蜀川河東陝西皆有之而蜀川錦文者佳二月
卷生黃赤其葉子莖並偁半蹄莖高三尺許脆其葉四四
相當粗長而厚三月花黃五月實黑八月采根其根有黃
汁大者如盤長二尺切片陰乾然性溫潤而易蛀壞火乾
乃佳作時燒石使熟橫寸截著石上燂之一日微燥以繩


穿狼乾

一種出於秦隴者名土番大黃正月內生青葉俗名莧麻大
者如扇根如芋大者如盤長一二尺其細根如牛蒡小者
亦如芋四月開黃花亦有青紅俗名蕎麥花者莖青紫色形
如竹株根去黑皮切作橫片火乾但蜀大黃乃作緊片此
一種有羊蹄大黃雖似大黃實非羊蹄根之物功用等
大黃味苦寒氣沉而降陰也頂峻下者生用若邪氣在上
非酒不至必用酒浸驅熱而下若用生者則遺至高之
邪熱也下瘀血破癥瘕積聚蕩滌腸胃推陳致新如數
定禍亂以致太平所以有將軍之號血分之藥也凡病
在氣分及胃寒血虛并姙娠產後勿輕用
黃芩為之使

冷水

△按大黃豎或橫殺片者名殺大黃通穴繩繫者名繫大
黃雖謂如錦文者佳今藥肆錦文者無之蓋歷月日故
錦文消失乎今多出倭大黃皆羊蹄根及喉橫根太

也凡通利之劑可用唐大黃傳疥癬諸瘡宜用倭大黃



商陸

あきくろく

蓬葛

當陸

章柳

白昌

馬尾

夜呼

和名伊保須木

俗云山牛蒡

ニシロツ

本綱商陸生園圃中春生苗高二四尺青葉大如牛舌而厚長脆莖青赤至柔脆夏秋開花作朶根如蘿蔔而長八九月來根日乾花赤者根赤花白者根亦白其白者入藥赤與黃色者有毒不可食昔人種之為蔬根苗莖並可洗蒸食或用灰汁煮過亦良其形類人者入藥

根酸辛有毒

陽中之陰能療水腫

又治生根雜鯉魚煮作湯服

赤根者搗爛入麝香二分貼於臍心以帛束之得小便利即腫消

△按商陸處處有之葉如煙草嫩葉其花房如旋覆花而大其根如牛蒡因俗稱山牛蒡出於藝州及攝州者良

或云水腫者食之無功刺瀉利蓋疑不撰赤白用赤者
 被中毒矣但粘臍藥用赤可也



狼毒

スニトツ

本綱狼毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以
 實重者為良陳而沉水者良輕者力劣矣此六陳之一也

六陳者麻黃橘皮半夏
 狼毒枳實吳茱萸是也防葵及草蘭茹能似狼毒誤混用

最宜詳審

根辛平有治九種心痛一蟲二姓三風四悸五食六飲

七冷入熱九氣又治連年積冷流注心胸及落馬墮車

瘀血中惡等證名九痛丸狼毒炙香吳茱萸湯泡巴豆

去心乾薑炮人參各一附子去皮各為末煉蜜丸梧

大每空服溫酒下一丸



防葵

やまごゝひ

房苑

梨蓋

利茹

和名夜未奈須比

パンクイ

本綱防葵莖葉似葵每莖三葉一木十數莖中發一幹其
端開花如葱花景天輩而色白六月開花即結實根似防
風香味亦如之今乃用枯朽狼毒當之緣真相似也勿誤
用狼毒
根辛寒無毒
治疝痕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆癰癩驚邪



狼牙

牙子 狼齒
木牙 抱牙
支蘭

ラシヤア、

和名古末豆奈木

本綱狼牙齒似蛇莓而厚大深綠色根黑若獸之牙齒七月華八月實黑色其根三個月來暴乾若中濕腐爛生衣者殺人色白者善

根有毒 治邪氣熱氣疥癬惡瘡

△按狼牙山野處處有之高一二尺莖枝葉花並似萩而小七月開花作莢如小豆莢中子黑色其根甚強故葛人可繫牛馬俗呼名駒繫

本草 卷之五 狼牙 俗名駒繫

絲のさみ

離婁

根据

白者名草

蘭如

和名絲阿佐美
又云仁比萬草

蘭如

リエイジイ



本細蘭如春初生苗高二三尺莖葉如大戟而葉長微闊不甚尖折之有白汁抱莖有短葉相對團而出尖葉中出莖莖中分二三小枝二三月開細紫花結實如豆大一顆三粒相合生青熟黑中有白仁如續隨子之狀其根長大如蘿蔔蔓菁狀或有岐出者皮黃赤肉白色破之有黃漿汁初斷時汁出凝黑如漆往往用其根充狼毒誤也根無漿汁以

為異

根辛寒有毒

治惡肉敗瘡又治甲疽

生干脚趾蘭如二三兩

黃芪

二兩苦酒

以猪脂五合合煎取膏三合日三塗之

即消又能治馬疥

△按蘭如古本朝有之今無識者

皮黃肉白者更峻利



紅芽大戟紫色



大いげき

功鉅一下馬仙

大戟

和名波夜
此止久佐

タア、キツ

本綱大戟生平澤春生紅芽漸長叢高一尺以來莖中空折之有白漿葉長狹似柳葉而不團其稍葉密攢而上三四月開黃紫花團圓似杏花杭州紫太戟為上江南生者葉似芍藥為次又北方綿太戟色白其根皮柔韌如綿甚峻利能傷人弱者服之或至吐血

根苦寒有小毒

利太小便治十二水腹滿急痛不問年月淺

深大戟當歸橘皮

兩各一

切以水二升煮取七合頓服利

下水二

三升勿怪至重者不過再服便瘥禁毒食一季

永不復作

凡大戟得棗即不損脾反甘草用之使惡薯蕷

△按大戟和州金剛山之產良名小大戟丹波伊豫次之
其葉圓葉間開細花有白赤紫數品結實以茅麻根低



澤漆

五鳳草 漆莖
貓兒眼睛草
綠葉綠花草

俗云燈臺草

ツエツ ツイツ

本細澤漆原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢柔莖
如馬齒莧綠葉如甘藷葉葉圓而黃綠頗似貓睛莖頭凡
五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青綠色復有小葉
承之齋整如一插莖有白汁粘入根白色有硬骨

莖葉

苦微寒
有小毒

利水治


浮腫功類大戟而其莖有白汁亦

同故誤以為大戟然大戟根苗皆有毒澤漆根硬不可

用苗亦無毒可作菜食使惡薯蕷

△按此草形狀似燭臺俗呼名燈臺草其莖汁能治疣黑

子且牛馬亦不食此草乃有毒明矣



甘遂

かんすい

甘藁 陵藁

重澤 甘澤

白澤 苦澤

豊醜 丰田

カンスイ

豊醜

本綱甘遂苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉白作連

珠大如指頭實良

根苦寒有毒


能瀉十二種水腫木結胸中非此不能除故仲

景太陷胃湯用之但有毒不可輕用瓜蒂為之使惡令


人多以麝煨熟用以去其毒

△按甘遂一名途波曾本朝古有之今無

殼



子



續隨子

千金子 拒冬
菩薩豆 聯步

ソックスイッソ

本綱續隨子苗如大戟初生一莖莖端生葉葉中復出葉
 花亦類大戟自葉中抽幹而生實青有殼秋種冬長春秀
 秋實莖中亦有白汁可結水銀人家園亭中多種以為飾
 子辛溫有毒下水最速然不可多服此與大戟澤漆甘遂莖
 葉相似主療亦相似其功皆長干利水又治疣黑子以
 續隨子熟時塗之自落

△按續隨子其殼青子如小豆大而黃色紀州之產良



葭苕

らんどう
おわらうくさ

橫唐 行唐
天仙子

和名於保
美留久佐

ランタン

本細葭苕生海濱川谷今處處有之苗莖高二三尺葉似
地黃王不留行紅藍等而濶如三指莖葉皆有細毛四月
開花紫色白色五月結實有殼作罌子狀如小石榴房中
子至扁細青白色如粟米粒其子不可生服傷人見鬼狂
亂煮之下二日而芽方生其毒為物可知矣葭苕雲實方
藥赤商陸皆能令人在惑見鬼者
子苦溫有毒 人療顛狂方然不可過劑 犀角並解其毒
△按葭苕海濱有之其葉形畧似野菊而莖葉皆有白細
毛四五月開花有白有赤結實如罌子俗稱之河原艾
非也河原蓬別有下種今人不知葭苕和名
而漫稱之而已或以葭苕訓煙草甚誤



雲實

からすの多き草雲母鼻草

粘刺草子名

員實 雲英

天豆 羊石子

馬豆 和名濱佐々介

イニニツ

本綱雲實平澤處處山原多赤莖中空有刺高者如蔓其葉如槐三月開黃花纍然滿枝莢長三寸許狀如肥皂莢有子五六粒正如鵲豆兩頭微尖有黃黑班紋厚殼白仁咬之極堅重有腥氣其花有毒能令人見鬼發狂實辛溫無毒治泄痢腸澼去邪惡結氣除寒熱治瘡

△按雲實原野池堤有之俗謂之鴉乃豌豆

一種有野豌豆者其花淡紫色其葉似胡豆葉而結莢

一種有野胡豆者其花紫白色其葉似槐芽而結莢

共出柔滑菜部而人食其葉雲實相似而有開黃花之

異耳不可不知是毒草之屬也

子

仁



苳比麻

和名如良加之波

一云如良衣

ビイマ、

本綱苳比麻夏生苗葉其莖有赤有白中空其葉似大麻葉而甚大每葉凡五尖夏秋間極裏抽出花穗纍纍黃色高丈餘每枝結實數十顆上有刺攢簇如蠟毛而軟凡三四子合成一顆枯時劈開狀如巴豆殼內有子大如豆殼有斑點狀如牛蠅再去斑殼中有仁嬌白如續隨子仁有油可作印色及油紙子無刺者良子有刺者毒

子甘辛有毒外用屢奏奇効但不可輕內服搗膏點六畜舌根下即不能食點肚內即下血死其毒可知矣如服者下生不得食炒治口眼喎斜搗膏左貼右貼左即正又催生下胞取七粒去殼研膏塗脚心若胎及衣下

便速洗去不爾則子腸出如子腸出即以此膏塗頂則腸自入也
油追膿乃外科要藥鵝鵝油能引藥氣入內蓖麻油能拔病氣出外故諸膏多用之

△按蓖麻和名唐櫛言其葉唐荏言其油今俗稱唐胡麻出於和州者良紀州藝州之產次之近頃煉成用代蠟燭又取油法蓖麻仁去殼五外用水一斗煎之沫出盡取一點入水不散為度

朱印色

其方有數品一乃蓖麻子五十錢去皮川棟子五十個
取肉黃蠟銀朱錢二艾葉綿者用二錢如先用川棟子肉黃蠟煉和冷定蓖麻油及艾膏合成絹裏用又黑印用油煙灰和蓖麻子油用之


一種有博落迴者生江南山谷莖葉如蓖麻莖中空穴之作聲如博落迴折之有黃汁不可用入口有大毒人立死

△按博落迴本朝未知有之

真



假



恒山鷄屎草

互草鴨屎草

常山

根名常山
葉名蜀漆

ヤンサン

和名久世木
一云山字豆木

本綱常山生山谷間莖圓有節高者不過三四尺葉似茗而狹長兩兩相當二月生白花青萼五月結實青圓二子為房其草暴燥色青白堪用若陰乾便黑爛鬱壞矣根似荊根黃色而破細實黃者為雞骨常山用之最勝五月采葉陰乾一種出於海州者葉似楸葉八月有花紅白色子碧色似山楝子而小

常山苦寒有毒蜀漆辛平有毒

共為治瘧之最要不可多進令人

吐逆老人久病切忌之生用則上行必吐酒蒸熟用則氣稍緩少用亦不致吐也得甘草則土瘧得大黃則利枯梗為之使

△按常山處處有之出於丹波者為良其葉甚臭高丈許木之屬故稱臭木葉似梓楸葉而團大畧皺不澤六月開細花白紅雜攢亦似梓楸花蓋蘋頌所謂海州之常山是乎然本草不言葉臭者未審人以其葉為治瘡藥屢有效但本經常山葉如茗葉者本邦未有之

常山蟲 在此木株中蟻也蝕木心六七月破株取之用入疳藥或炙食小兒凡取蟻法有蟲木株必有小孔用管吹水於中蟲首出於孔輒剪木縛兩端探得之



倭蒜藜蘆

藜蘆

葱蒜

山葱 葱蒜

豐蘆 葱葵

葱葵 鹿葱

葱葵

リイロ

和名山宇波良
云之乃久乃木

本綱藜蘆山各處處有冬凋春生苗葉似初出樓心又似車前草莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裹莖似樓

皮有花肉紅色其根似馬腸根長四五寸許黃白色鬚三
二寸許二三月采根陰乾生高山者為佳

根

辛寒或云吐上膈風涎癰病凡吐藥不一常山吐瘧瓜

下吐熱烏附火痰濕萊菔子痰藜蘆則吐風痰者也

黃連為之使入芍藥細辛人參沙服之吐不止飲葱湯

即止

△

按藜蘆今多植庭園愛其花形狀全如上說而根少異

耳性宜陰處冬亦不凋葉似車前草而厚長布地生三

四月抽莖開花肉紅色或淡黃或綠色或外褐內白或

外紫內黃或華色或外青內白者名五須手或淡紫者


名出船根圓似皂莢而中根多如髭故名蝦根恐此藜

蘆也然自古以萬年青為和藜蘆甚非也

倭方有桑山小粒丸能治小兒諸蟲驚癇方中有苦參

藜蘆此相友之物何得宜乎但如倭方藜蘆即用萬年

青佳也故藥肆和藜蘆萬年青根也見千後



木藜蘆

黃藜蘆
鹿驪

俗云懷木綿
又云濱芭蕉

モツリイロ

本細木藜蘆生近水溪澗石上小樹也莖葉與藜蘆大同
葉狹而長多皺文四月開細黃花五月結小長子如小豆
大根鬚百餘莖有苦辛溫不入藥用

△按木藜蘆南紀海濱溪澗有之高二尺許莖葉微似芭
蕉而狹長又似蜀黍苗有淺黑皮裹蘆數片層層夏抽
莖開黃花不如藜蘆花之艷性畏寒移植之於京大抵
多難茂又以不甚美人不為珍自古以藜蘆稱於毛止
故是亦呼曰濱於毛止各誤而已

倭



漢



萬年青

千年藍萬年春


今云於毛止

本草新編云氣味苦
微寒入腎經及膽
胃通任督之脈

三才圖會云萬年青葉似芭蕉隆冬不衰以其多壽故名
△按萬年青性好陰濕石間葉布地生似玉蜀黍葉而小
厚勁深青四時不凋夏根傍抽莖生花無蕊瓣其莖一
寸許淡青色花房黃白色而亦一二寸大叩指形如
橫槌結子初青後正赤累累攢生大如櫻桃


一種有葉縱文白者呼名筋萬年青以為珍三才圖會所
畫有縱理
致富全書云其於春秋二分時分
俗誤藜蘆為萬年青之訓
葉畧似而終以萬年青根為
倭藜蘆沽之豐前中津之產良遠列朝比奈藝列廣島
亦佳挿葉及實於花瓶稱萬年青前置以為極秘傳

附子



天雄

烏喙



烏頭



側子



附子

別有草烏頭
白附子故呼
之為黑附子
川烏頭

フクツツ

本綱烏頭乃附子之母綿州彰明縣多種之故稱川烏頭
最為上江南來者不堪用每年以上田熟耕作壟十一月
播種春月生苗其莖類野艾而澤其葉類地麻而厚其花
紫瓣黃蕊長苞而圓其品凡七本同而未異其初種之小
者為烏頭附烏頭而旁生者為附子又左右附而偪生者
為漏子附而生出或變出形長而不生子者為天雄附而
尖者為天雄附而上出小者為側子附而散生者為漏藍
子皆脈絡連貫如子附母凡種一而子六七以上則皆小
種一而子二三則稍大種一而子特生則特大
附子辛溫有大毒陰證要藥凡傷寒傳變三陰及中寒夾陰

雖身太熱而脉沉者必用之或厥冷腹痛脉沉細甚則
唇青囊縮者急須用之有退陰回陽之力起死回生之
功陽中陰浮中沉無所不至為諸經引用之藥

凡附子

無乾薑不熟得甘草則性緩得桂則補命門得生薑則能發散以熱攻熱又導虛熱下行以除冷厥

畏防風黑豆綠豆甘草人參黃耆犀角忌敗汁得蜀椒食鹽下連命門

者為上其色以花白者為上有節如鼠乳色亦鐵色者

次之形不正而傷缺風皺者色亦青綠者為下

本草必讀云市肆售者有以鹽水浸之取其潤濕體重買者當以體乾堅實項圓正底平者為良

烏頭

別有草烏頭故呼之川烏頭乃附子之母也能治諸風

附子性重滯溫解逐寒若寒疾即用附子風疾即用

川烏頭

天雄

一名白幕種附子，生出長者至三四寸許，或種附子而盡，寔成長者，即如種芋形狀不一之類也。但不生子，故曰天雄。其長而尖者，謂之天錐，象形也。須重一兩半，有象眼者乃佳。

天雄辛溫有大毒治大風寒，濕痺骨節痛，凡虛寒，須用附子。風家多用，天雄烏頭附子共是補下焦命門陽虛之藥。

側子

一名煎子，蓋附子之側粘連小者，名側子。辛大熱有大毒，畏惡與附子同治。癰腫風痺，又治遍身風癢，神妙也。烏頭乃原生，不得移居乎中者，也。側子散生旁側，體無定在其氣輕揚，宜其發散四肢，充達皮毛，為治風之藥。天雄長而尖，其氣親上，宜其補上焦之陽虛。漏藍子則餘氣所結，其形催殘，宜其不入湯服，令人喪目也。

漏藍子

一名木鼈子，又名虎掌。天南星之小者，亦名此。乃附子

之瑣細未成者小而漏籃故名之有苦辭此不堪服餌止
宜入瘡科也服之令人喪目

△按附子有毒藥而虛寒厥冷症必用之良藥也凡體重
實一個十錢有余為上七八錢者為下浸鹽水漉之故
至夏月如不曝乾則濕爛不堪用

延喜式有貢附子則昔本朝出附子乎今止有草烏頭
耳中華亦四川外多無之



草烏頭

烏喙兩頭
土附子最毒
耿子毒公

金鴉苗名良

ツクウ、エウ 及音董音獨音白音草

又名鴛鴦菊汁煎名射罔本綱云草烏頭根苗花實並與
川烏頭同但此係野生又無釀造之法其根外黑內白皺
而枯燥為異爾然毒則甚焉烏喙則偶生兩岐俗曰兩頭

尖者也

附子天雄之偶生兩岐者亦謂鳥喙

正月始生葉厚莖方中空葉四

四相當與蒿相似

氣味辛溫有大毒

治中風惡風洗洗出汗破積聚寒熱遠志為使

反半夏括樓貝母白芨畏節糖黑豆冷水能解其毒

射罔

世名

苦有大毒此即草烏頭生去皮搗芋莖汁瀝汁澄清旋

漆晒乾取膏為射罔以傅箭射禽獸十步即倒中人亦

死人中其毒以甘草藍汁小豆葉浮萍冷水蘼茺皆可

一味藥之

△按草烏頭

俗呼名止利加布止

葉似菊葉而厚八九月開花淺紫

色形似伶人所着烏冠故名之又有白花者其根乃草

烏頭也用殺頭蠱瘡外科用之和州金剛山之產良若

州江州次之今人家種之賞花

此與蝦夷射罔一物別種也

蝦夷人每用射罔毒塗箭其鏃圓木也名燕以射禽獸

本草綱目卷之六

毒草

卷之六

彼土無兵器用之禦入中者斃焉如今能知其解毒藥
 不強怖矣羽州有之村房野葉形尋常草烏頭無異其
 毒甚烈誤食一葉即死土人名蕪射問蝦夷人所用
射問是也



白附子

ペツフウツウ

本綱白附子本出高麗新羅生砂磧下濕地獨莖似鼠尾
 草細葉周匝生於穗間根正如草烏頭之小者長寸許乾
 者皺文有節蓋因與附子相似故名白附子彼稱黑附子
 實非附子類也

氣味辛甘溫
有小毒

一切冷風

陽明經藥純陽引藥勢上行治中風失音

天南星



虎掌

天南星

てんなんしやう

虎掌

鬼菟藟

虎膏

和名於保々曾美

テンナンスイ

本綱虎掌

河北多有之三四月生苗高尺餘獨莖上有

葉如爪五六出分布尖而圓一窠生七八莖時出一莖作

穗直上如鼠尾中生一葉如匙累莖作房旁開一口上下

尖中有花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布地

一子生一窠其根初如豆大漸長大似半夏而扁半久者

根圓大者如雞卵周匝生圓芽三四枚或五六十枚

天南星冀州菜圃中種之二月生苗似荷梗其莖高一

尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月

結子作穗似石榴子紅色其根似芋而圓扁與蒟蒻相類

但蒟蒻莖斑花紫此是根小柔膩肌細炮之易裂為可辨

爾蓋天南星即本經虎掌也小者名古方多用虎掌不言

天南星始於唐時之名虎掌因葉形似之非根也南星因根

圓白形如老人星狀故名南星

天南星有苦辛乃手足太陰脾肺之藥味辛而麻得風

故能治風散血氣溫而燥得牛膽故能勝濕除涎性緊

而毒則不毒故能攻積拔腫而治口喎舌糜長附子乾

欲其下行以黃蘗引之

△按虎掌本名也倭名抄亦有虎掌無天南星蓋天南星

之名始出於唐時也明焉今却虎掌無識者疑此從虎

掌子種所出異品名天南星一物異品近頃亦出異品

歡喜草或藏鐘之類是也既虎掌與天南星相似而各別也又

天南星有二種花房淺青色而末如鼠尾者高一尺許是自一類二

惟如是及佛後光也無鼠尾者高二尺許是自一類二

種也三才圖會及本草必讀出虎掌與天南星之二圖

為二物明焉天南星日向薩摩之產最良豐前中津藝

州廣島之產次之



武藏鎧

草珊瑚珠

實

△按此出於虎掌子種高尺許葉大似虎掌三四月開花
外青內亦黑色形似馬鎧故俗名武藏鎧其梢秋結實
似天南星及万牟青子而小橫生為一團正紅色至冬
葉落而唯見子耳故側植石臺而假用其葉



歡喜草

雪節草

皆俗稱也

くかんさう

歡喜草

ゆきふし

△按歡喜草，即天南星變生於子種者也。近頃始出豫州，移栽攝陽，人以爲奇異好事者，附異名也。二月生，一莖作花房，其本一二寸如筒，帶微褐色而爲半片如匙，白色亦似佛後光，末尖曲覆于花上，其花生筒中圓白如餅，故名雪餅草。四五月花落結實，形如玉蜀黍而細小，青色熟乃紅色，莖葉如莧荊。



莧荊

若 舉

莧頭 鬼頭 鬼辛

和名古邇 夜久

キユー レヨン

本細莧荊本出蜀中宜樹陰下掘坑積糞春時生苗至五月移之長一二尺與天南星苗相似但莖多節點其花紫色宿根亦自生苗經二年者根大如碗及芋魁其外理白秋後采根須淨擦或搗或片段以臘灰汁煮十餘沸以水

淘洗換水更煮五六遍即成凍子切片以苦酒五味淹食
不以灰汁則不成也切作細絲沸湯灼過五味調食狀如
水母絲

根辛寒有毒

生則斂人喉出血延壽書云有人患瘵百物不

忌見隣家修蒟蒻求食之美遂多食而瘵愈又有病腮
癰者數人多食之亦皆愈

△蒟蒻紀州粉河總州鍋山之產為上備煎丹波次之

讚州又次之七八月采根曬乾掛檐間煮之為餅詳干造釀

下類又為紙衣糊煮熟以裨心透通取出搗為糊又瘡疾
人食之發

苦薩草

本綱生江浙州郡凌冬不凋秋冬有花直出赤子如蒟蒻頭

冬月采根用味苦無毒主中諸毒酒毒研服之又諸蟲傷

搗汁飲并傳之

按菩薩草即今云歡喜草之類乎然歡喜草冬枯春生
 苗此物凌冬不凋以為異故重出



半夏

守田 水玉
 地丈 和姑
 和名保曹久美
 俗云烏豆

ハアンヒヤク

本綱半夏以青州齊州者為佳二月始生苗一莖莖端三
 葉淺綠色頗似竹葉白花圓上也月令五月半夏生蓋當
 夏之半故名之八月采根實大生江南者似芍藥葉根下
 相重上天下小皮黃肉白

根辛生微寒肉白者佳不厭陳久凡用生者戟人咽喉

方中有半夏必須用生薑者以制其毒也惡皂莢畏生薑乾薑反烏

頭柴胡為之使忌海藻飴糖佐以陳治熱痰佐以黃芩風痰佐以寒痰佐以乾薑痰佐以皮白木口渴者禁用為其燥津液也孕婦忌之則無害

○修治 洗去皮垢以湯泡浸七日逐日換湯令滑盡眼

乾切片薑汁拌焙入藥

半夏餅 用半夏研末以薑汁和作餅子日乾用

半夏麴 用半夏研末以薑汁白礬湯和作餅楮葉包

置籃中待生黃衣日乾用

經云腎主五液自入為唾入肝為泣入心為汗入脾為痰

入肺為涕有痰曰嗽無痰曰欬痰者因嗽而動脾之濕也

半夏治痰之標不能治痰之本治本者泄腎也俗以半夏

為肺藥非也

俗以半夏有毒用貝母代之夫貝母手太陰肺經藥半夏足太陰脾經藥

明經何可以代若勞虛咳嗽吐血咯血肺痿肺癰婦人乳

癰及腫疽惡毒乃禁用半夏故皆以貝母為向導猶可代

也至於脾胃濕熱涎化為痰久則生火痰火上攻昏憤僵

仆蹇澁等症生死且夕亦豈貝母可代者耶

△按半夏 出於豫州者最良豐州中津藝州廣島雲州

島根郡江州之產皆次之毛大粒而色白無皮者為良
 小粒而色不白及有皮者不可用也藥肆所造翻半夏
 多用小者其薑製亦不精也特有為之藥修製不可輕
 忽宜自製詳審也

治五絕急病自益。陶壁木。石壓。以丸半夏細末用冷水
 和丸如大豆納鼻孔中心頭溫者雖經一日可治



蚤休

蚤休 三層草
 七葉一枝花
 草甘遂 蚤休
 紫河車 重臺

ツブウヒウ

白甘遂

本綱又名金線重樓或云金線生深山陰濕之地一莖獨上
 莖當葉心葉綠色似芍藥又云葉似王孫莖麻凡一二三層
 每一層七葉莖頭夏月開花一花七瓣有金線蕊長三四
 寸又有至五七層者根如鬼臼蒼朮狀外紫中白有粉

和或云無毒微寒有毒

摩醋傳癰腫蛇毒甚有效俗諺云七葉

一枝花深山是我家癰疽如遇者一似手粘弩是也



鬼臼

九叶 天白 鬼藥

醫犀 解毒 早荷

害母草 羞主人花

木律草 八角盤

唐婆鏡 獨勝蓮

獨荷草。山荷葉。馬目。毒公。瑤田草。有數本綱有二種根皆

似天南星。赤莖直上。莖端生葉。一種葉凡七瓣。一種葉作

數層。葉似蓖麻。面青背紫。而有細毛。葉下附莖開一花狀

如鈴鐸。倒垂青白色。黃蕊中空。結黃子。風吹不動。無風自

搖。又曰。此草一年生。一莖既枯則生一白。及入九年八九

白矣。然一年一白生。而一白腐。蓋陳新相易也。

根有草溫解百毒。治子死腹中胞破不生者。此方累效救

鬼臼不拘多少。黃色者去毛為細末。不用諸藥只熬每

服一錢酒一盞同煎八分通口服立生如神名一字散



射干

野萱花 草薑 黃遠 仙人掌 紫金牛

本綱射干有數說今取春生苗高一二尺葉大類蠻薑而狹長橫張疎如鳥翅及扇之狀中抽莖似萱草莖而強硬六月開花大如萱花黃紅色瓣上有細文秋結實作房中子黑色

根苦寒有毒多服瀉人能降火故治咽喉腫痛射干根山豆

根陰乾為末吹之如神

△按本草綱目射干與烏扇為一物因倭名抄亦云射干

一名烏扇和名加良類安布木並未詳審其二物莖葉花形狀各別也藕頰所謂莖梗疎長正如射之長竿之狀者射干

也莖短葉側相比而如扇者烏扇也

射干葉似鳶尾而闊段段抱莖上生中心抽一莖高三

四尺七月開花似萱草花而六瓣黃赤俗呼紅有細點

畧如山丹花結實作房如胡麻房而三稜一房六隔有

中子二三十粒大如豌豆而生青熟紫黑色而硬

一種小射干一名姬葉小而長六七寸如石菖葦花亦

小淺紫畧似菖蒲花而小美可愛



烏扇

ひのうき

烏妻 烏吹

烏蒲 鳳翼

鬼扇

和名加良須

阿布岐

俗云檜扇

△按本綱烏扇射干以爲一物今別之異名亦分附于此

凡物某與某以相似者謂之烏此似官家所持檜扇故

名烏扇又名檜扇乎其葉似鳶尾而狹勁色亦深潤比

此區平相雙頗如扇抽莖不過一二尺四月開花狀似
鸛尾花而小灰白色有黃文而不結實其根蘆微紫色
俗相傳修驗者呪咀調伏以此花為佛供故尋常忌之
未知然否

又世俗所謂烏扇乃射于射于乃烏扇也共以形狀辨
之則自明焉蓋一物培柴灰於根則葉生皺以為奇珍
射干之名有三佛經射干貂棧此是惡獸似青黃狗食人
能緣木阮公云射干臨層城者是樹殊有高大者本草射
于是草鳥今人所種者也

射字神夜切音蛇為犬獸名則寅射切音夜



鸛尾

鳥園

根名鸛尾頭

和名古夜須久佐
俗云伊知及豆

イユニウイ

本綱鸛尾其苗低下於射于葉布地生狀如鸛之尾其葉

似射干而潤短不抽長莖夏開花紫碧色根似高良薑節
大數箇相連皮黃肉白

根有苦平

嚼之戟人咽喉但治邪氣鬼疰諸毒

四物鴛頭散

治鬼魅邪氣鴛頭黃牙

即金黃若子防

葵為末

方酒服欲令病人見鬼增防葵一分欲令知鬼

又增一分立驗不可多服

△

按鴛尾莖矮形狀似鳥扇而艷色似射干但鳥扇射干
翻可覓三四月抽短莖開花形似燕字花而紫色花之
底微白



玉簪

じやうしやう

白鶴山

俗云岐保字之

ヨツツラツロ

本綱人家栽為花草二月生苗成叢高尺許柔莖如白菰

和... 卷之五

其葉大如掌圓而有尖葉上紋如車前葉青白色頗嬌
六七月抽莖莖上有細葉中出花朵十數枚長二三寸本
小末大未開時正如白玉搔頭簪形又如羊肚蘑菇之狀
開時微綻四出中吐黃蕊頗香不結子其根連生如鬼白
射干生薑薑有鬚毛舊莖死則根有一白新根生則舊根
腐

根甘辛寒

治癰腫搗酒服以渣傳之

古今醫統云嚴冬用稻草覆其根則來春易發
畫譜云春初移種肥土中則茂其花辨入少糖霜煎食香
清味淡可入清供

△按玉簪葉潤圓末尖似橋欄干之形故俗呼名岐保宇
之五月開花也如上說六七月結實作莢長寸許一莖
十余莢垂下生青熟枯黃邑內有細子正黑色也然本
草謂不結子者非也又蘑菇之茹當作菰疑傳寫之誤
矣而羊肚菜俗云井蘑菇俗云徐詳于芝栢類


こびやうし

小玉簪



本綱玉簪之紫花者葉微狹○晝龍云玉簪紫者花小葉上黃綠間道喜水分種盆右栽之可玩

△按俗云小玉簪葉狹長抽莖也二三尺長於白鶴仙其花微紫或純白也又有葉上黃綠間理者謂之筋玉簪花以爲異近年出之晝龍所言者是也



鳳仙花

やうせん

急性子旱珍珠
金鳳花小桃紅
深指甲草菊婢
夾竹桃海蔘

フシスエハク

本綱鳳仙花極易生二月下子五月可再種苗高二三尺
莖有紅白二色其大如指中空而脆葉長而尖似桃柳葉
而有鋸齒極間開花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦
自變易狀如飛禽頭翹尾足具如鳳狀女人采其花及葉
包漆指甲自夏初至秋盡開謝相續結實累然大如櫻桃
其狀微長色如毛桃生青熟黃犯之即自裂皮卷如拳苞
中有子似蘿蔔子而小褐色

子微苦溫

能治骨哽

以欲死者研用木筒灌之良

但此草不生蟲蠹

蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也其子性急速故能透骨
軟堅危人烹魚肉硬者投數粒即易軟爛是其驗也凡
服之者不可着齒也最損齒與玉簪根同多用亦戟人
咽

盡譜云金鳳花六種有重瓣單瓣紅白粉紅紫色淺紫如
藍有白者上生紅點疑血俗名洒金六色花開一落即去
其蒂則花茂與月季同

△按鳳仙花蜂蝶亦不近之說非也特蝶喜吸其花也然
 爲人則可有小毒能解物骨故亦不可不損人齒



曼陀羅花

風茄兒
 山茄子

ミトウロハマ

本綱曼陀羅花生北土人家亦栽之春生苗夏長獨莖直
 上高四五尺生不旁引綠莖碧葉葉如茄葉八月開山花
 凡六瓣狀如牽牛花而大攢花中折駢葉外包而朝開夜
 合結實圓而有下撈中有小子九月采實
 法華經言佛說法時天雨曼陀羅花又道家北斗有陀羅
 星使者手執此花故後人因以名之

花子鮮溫
 治面上生瘡曼陀羅花晒乾研末少許貼之
 時珍曰相傳此花笑米釀酒飲令人笑舞采釀酒飲令

和漢三才圖會 卷之五 雜考

入舞予常試之飲酒半酣更令一人或笑或舞引之乃
 驗此與火麻子花陰乾等分爲末熱酒調服三錢少頃
 昏昏如醉割瘡灸火宜先服此則不覺苦

△按近頃來於朝鮮今人家多栽之花似大牽牛花及博
 多百合花故俗曰朝鮮牽牛花其實似檳榔子而有細
 礪文又別有名曼陀花者同名異種 見溫草部



羊躑躅

黄躑躅 老虎花
 黄杜鵑 鷓鴣花
 玉枝 羊不食草
 開羊花 開當作
 ヤチツ チョツ
 俗云蓮華豆之

本綱近道諸山皆有之小樹高二尺葉似桃葉三四月開
 花黃色似凌霄花而五出蕊辨皆黃而氣味皆惡
 花辛溫有大毒
 羊食其葉躑躅而死
 △按羊躑躅一名以波豆之槌本草之諸說則今云

華躑躅也丹波及和州吉野山多有之其木二二三尺高者五六尺葉似楊梅葉而薄有微白毛三月開花五出似凌霄花一莖八九萼遠望之如蓮華故名之又有赤蓮華者換頌云嶺南有深紅凡躑躅之品類雖多黃花者惟蓮華躑躅豆其躑躅之二種也而摘躑躅岩躑躅等亦一類而花色不黃

豆其躑躅

俗云未女如良豆豆之

△按豆其躑躅溪山巖石間有之三四月開花似美客柳花而黃色其葉四時不凋端卷反似豆其躑躅之丹波永上郡之山中有之



摘躑躅

俗云毛知豆之

俗稱

△按藕躑躅葉淺綠色有細毛枝少花繁三四月開花淺紅似桃花色而一枝數萼其花及萼觸手即黏如藕故名之花形色不美今人四月八日灌佛用之或插竹竿供之未知其梗但當此時甚多故取其簡易耳

一種有躑躅名江戶萬葉似藕躑躅其花千葉而色濃不黏為異

一種有岩躑躅豆之豆葉花共小花色深赤



平戸躑躅

ひらいつと 琉球躑躅

△按平戸九州之地名本出於琉球四月開花草辨白最易繁茂其大者至一二丈

一種有朝鮮躑躅高五六尺葉似樺葉三四月開花大如平戶躑躅花而淡鼠白色潤澤最爲珍

多ふけし

永來部躑躅



△永來部薩摩之南島也出於彼土甚暖故如雖移種于畿内怕寒難茂盛其花赤大徑五六寸許甚奇凡躑躅之種類最不下三百種不能悉記之

さつと

山石榴

杜鵑花

山躑躅

和名阿伊豆之今云左豆木



サニチツチヨツ

本綱山躑躅處處山谷有之高者四五尺低者一二尺春
生苗葉淺綠色枝少而花繁一枝數萼二月始開花如羊
躑躅而蒂如石榴花有紅者紫者五出者千葉者小兒食
其花味酸無毒

草本畫譜云杜鵑花喜陰惡肥天蚤以河水澆之樹陰下
放置則茂葉色青翠可觀有黃白二色

一種有藤牽牛花者葉似躑躅而花似山石榴而大淡紫
色蓋藤者言色牽牛花者言形

△按山躑躅高者五六尺其花有白有赤有紫有桃紅有
赤白襍開者至三百余種四月始開五月爲盛入呼五
月稱佐豆幾故名之凡紀列遠列等山中躑躅山鵲花
共大木多有高一二丈周二尺許者

攝列須磨一谷二谷至權現山凡三四里許遠列秋葉
山麓乾川兩邊亦三四里許躑躅山鵲花甚多夏月滿
山頗如錦凡正月折枝挿地則活攝列多田鄉圃人常

栽之敗市又木株最堅燒炭以為園炭

園者余易字也

紅躑躅

紅躑躅

映山紅

俗云映山紅之末



草本叢譜云映山紅生滿山頂其年豐總人競之

△按本草綱目山躑躅杜鵑花柳映山紅躑躅以為一物今

別為二種凡躑躅葉形類桃及柳葉映山紅葉畧帶圓

形杜鵑花葉形比映山紅狹長三種大異也

映山紅花類杜鵑花而小深赤色單葉三月開花能映

滿山故名之有大小二種小映山紅開花最繁蔽枝條

堪愛今又有白花者有單葉八葉千葉之數品大抵二

三尺高者一二丈以為珍薩摩日向山谷多有之移種

于諸國彼地有霧島嶽每嶺燒起且此花映山故各之

朝鮮載晉山世稿云太明成化年中當本朝後土御門時得日本躑躅數盆
 及其花開葉單而花瓣甚大色類石榴重跗疊萼久而不
 衰其與我國色紫而千葉者妍蚩不啻若嬪母與西施也
 上嘉賞之命下上林園分植外人秘莫能得後一以種盆
 一以種地以試之種地者凍死而盆者無恙數年之間枝
 條方盛按此杜鵑花或大映山紅之類也



いふじ
 荒花

杜荒敗華赤荒
 毒魚兒草去水
 頭痛花其根名
 黃太乾 蜀桑
 俗云以波布知

本綱荒花近道處處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入
 土深二五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉
 二月開紫花頗似紫荆而作穗又似藤花而細三月采花

五月采葉八九月采根陰乾小人爭鬪者取此葉按擦皮
層輒作赤腫如被傷以証人其花有紫赤白者絳州出者
花黃謂之黃芫花凡因其氣惡呼為頭痛花
芫花大苦溫治欬逆上氣喉鳴喘咽腫療水腫用當微熬不可近眼
取留陳久者良反甘草張仲景治傷寒太陽證表已解有時頭痛
出汗惡寒心下有水氣乾嘔痛引兩脇或喘或欬者用
十棗湯治之中有芫花

△按芫花俗云葉花並似藤而小三月開花紫色或白色
乃如有紫藤白藤二種然未見赤黃者
別有谷藤出干蔓草類又有華鬘草出干濕草類共似芫花而異



芫花
音饒

和名波末仁禮

本綱荒花即荒花黃色者也小株花成簇生其花生時色黃乾則如白或言無荒花以桃花代之取其利耳氣味苦寒治傷寒溫瘧下十二木破積聚癥瘕

△按荒花有和名則古者有之乎今無之



醉魚草

開魚花櫛木
魚尾草

ツイ イユイ ツアウ

本綱醉魚草在塹岸邊作小株生高者三四尺根狀如枸杞莖似黃荊有微稜外有薄黃皮枝易繁衍葉似水楊對節而生經冬不凋七八月開花成穗紅紫色儼如荒花一樣結細子漁人采花及葉以毒魚盡圍圍而死池沼邊不可種之此花色狀氣味並如荒花毒魚亦同但花開不同時為異爾

又有狀如蕓而赤華名曰葶藶者可以毒魚

トウモロコシ

茵草 芒草

莽草

音

罔或入木部

鼠莽 莽俗作莽



シツブウ

本綱莽草木若石南而葉稀無花實揉之其臭如椒搗以和陳粟米粉納水中魚吞則死浮出人取食之無妨又山人以毒鼠周禮煎氏掌除毒物以茵草熏之則死氣味_{有毒}治喉痺及牙痛取葉煎湯熱含冷則吐之誤食之害人惟黑豆煮汁服可解豆汁澆其根即爛性相制也

△按莽草俗以為_{トウモロコシ}者非也_{トウモロコシ}有花實是亦入水中魚死故相誤乎_{檀見干香木下}



茵苳

いんじ

茵苳 苳草

卑共

和名仁豆之
云乎加豆之

イニイ

本綱茵苳、雍州、絳州、華州、杭州、有之。春生，苗高三四尺，莖赤，葉似石榴而短厚，又似石南，葉四月開，細白花，五月結實。

莖葉有毒

茵苳、莽草，皆古人

治風藥，為妙品。近世，字知

△按茵苳和名有躑躅之號，詳今躑躅類中，無結實者。

にがりし

ふろみ

石龍芮



地堪、天豆、石能

魯果能、水莖

胡椒菜、莖葉

彭根、苦苳

シロシイ

和名不即豆美
俗云田芥

本綱石龍芮生近水下濕地高者尺許其根如薤二月生
 苗叢生圓莖分枝一枝三葉葉青而光滑有三尖多細缺
 四五月開細黃花結小實大如豆狀如初生桑椹青綠色
 槎散則子甚細如葶藶子宜半老時采之入藥有二種
 水生葉光末團者石龍芮也
 陸生葉毛末銳者毛茛也
 子根無苦平治風寒濕痺心腹邪氣利關節補陰氣久服
 輕身明目不老治蛇咬傷瘡及血痢乃平補之藥古方
 多用之其功與枸杞覆盆子相持而世人不知用何哉
 △按石龍芮葉如人參葉而花實與毛茛同截瘡按葉貼
 寸口一夜作泡功亦與毛茛同然則是不無毒者也



毛茛

毛建草水茛

毛茛 天灸

自灸 猴蒜

俗云鬼田芥子
 今云金寶花

本網毛茛下濕處即多蓋茛乃草烏頭之苗此草形狀
 及毒皆似之故名之春生苗高者尺餘一枝三葉葉有三
 尖及細缺與石龍芮莖葉一樣但有細毛為別四五月開
 小黃花五出甚光艷結實狀如欲綻青桑椹而有尖峭與
 石龍芮子不同

葉及子辛溫有毒

惡瘡癰腫疼痛未潰者搗葉傳之勿入口

截瘡采葉接貼寸口男左女右一夜作泡如火燎今肉爛

△按毛茛形狀如上說今千葉花亦有花罷莖枝則更
 生苗一莖一葉無枝極無毛畧似小款冬而冬亦不枯
 至春別抽莖枝葉形變生毛黧青色不似石龍芮光澤



牛扁

倭名太知未知佐

ニウベン 扁特 扁毒

本綱牛扁生平澤下地似葦草石龍芮葦根如秦艽而根苗苦微寒無毒治身皮瘡熱氣可作浴湯殺半虱又能治

牛病

虱建草

スエツケン ツアウ

本綱生山足濕地發葉似山丹微赤高一二尺味苦無毒接汁沐頭虱蟣盡死



葶苈

いんくさ 毛蒺藜葶苈字

ツインニア

本綱葶苈山野諸處多其莖有刺高二三尺葉似花葉或青或紫背紫有毛芒可畏觸人如蜂螫螫蟲以人溺灌之則解有花無實冒冬不凋接投水中能毒魚

氣味辛苦寒

有大毒

治蛇毒搗塗之人食之吐利不止投水

中能毒魚杜子美有除蘩草詩是也



海芋

ハア イイ

かい

觀音蓮 羞羞草

獨河仙 天荷

本綱海芋生蜀中今處處有之春生苗高四五尺大葉如芋葉而有幹其大者可以禦雨葉背紫色夏秋間抽莖開花如一瓣蓮華碧色花中有蕊長作穗如觀音像在圓光之狀其根如芋魁大者如外筵長六七寸蓋野芋之類也以可變金味辛有大毒

透山根

本綱生蜀中山谷其草類薜蘿昔有人採藥誤研此草刀

忽黃軟成金也取汁可以點鐵成金有大毒人誤食之化

為紫水

見岫嶠神書及庚辛玉冊

一種有金英草亦生蜀中狀如馬齒莧而色紅模鐵成金亦有

大毒入口殺人須臾為紫水也
△按蜀中者今之四川地出諸藥名草透山根金英草亦有之矣但變鐵成黃金者變色耳



鉤吻

野葛斷腸草

毒根胡蔓草

黃藤火把花

俗云奈倍和利

ケウホツ

本綱鉤吻南方桂州益州等村墟間巷間皆有蔓生莖大如箭而方其葉如柿圓面光春夏嫩苗毒甚秋冬枯老稍緩五六月開花似檉柳花而色紅又有黃花者數十朵作穗其根新采者皮白骨黃宿根似地骨與白花藤相類人

亦惑之新者折之無塵氣經年以後則有塵起從骨之細孔中出今又折枸杞根亦然人誤食其葉者半日則黑爛死無復生少入口則鉤入喉吻也故名鉤吻然羊食其苗大肥物有相伏如此或云葉如茶然謂如梯葉者多也昔岐伯對黃帝言黃精益壽鉤吻殺人生乃是二草善惡死反比對而言如食鉤吻葉而飲冷水即死急也冷水發其毒也薤菜能解其毒取薤菜汁滴鉤吻苗即萎死如中鉤吻毒口不可開者取大竹筒洞節以頭柱其兩脇及臍中灌冷水入筒中數易水須臾口開乃可下藥解之惟多飲甘草汁人尿汁或取雞卵抱未成雛者研爛和麻油灌之吐出毒物乃生稍遲即死

△按駿列遠列及備列有鐮破者延蔓生莖有刺葉似山茶葉而不尖有縱理六月開小花秋結實熟則外皮開裂內子赤其葉有毒舐亦唇舌裂故名舐破訛曰如此鉤吻草之類也然本草鉤吻不言子有無



李
總

八一
六九

